



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

วันที่ 26 เมษายน 2567 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยทั่วไปก็มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานไว้ด้วย ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน และการระบายอากาศในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 25 เม.ย. 67 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 26 เม.ย. 67



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	สตูล	18.3	ฝนตกปานกลาง
2	อ.เหนือคลอง	กระบี่	7.2	ฝนตกเล็กน้อย
3	อ.เสเดา	สงขลา	4.4	ฝนตกเล็กน้อย
4	อ.เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	4.1	ฝนตกเล็กน้อย
5	อ.เมือง	เชียงราย	2.1	ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 67)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 42,522 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 18,582 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (44,704 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 2,182 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 10.85 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 135.02 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 33,814 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 39,918 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 16,380 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (41,958 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 2,039 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 7.75 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 122.50 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 31,008 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณภ.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณภ.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณภ.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณภ.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณภ.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณภ.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	11,765	47	5,020	28	80	1,083	603	56	513	52	88	25,908	12,368	48	5,533	29	13,540
ตอน.	12	8,368	3,822	46	2,170	32	226	2,061	1,073	52	907	48	238	10,429	4,895	47	3,077	36	5,534
กลาง	3	1,419	307	22	247	18	27	419	142	34	117	30	30	1,838	449	24	364	21	1,389
ตะวันตก	2	26,605	18,273	69	4,996	37	8	164	60	37	49	32	10	26,769	18,333	68	5,045	37	8,435
ตะวันออก	6	1,515	487	32	392	28	52	1,006	376	37	320	34	58	2,520	863	34	712	30	1,658
ใต้	4	8,194	5,265	64	3,554	55	42	679	350	52	296	47	46	8,874	5,615	63	3,851	54	3,259
รวม	35	70,926	39,918	56	16,380	35	435	5,411	2,604	48	2,202	44	470	76,337	42,522	56	18,582	35	33,814

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 11,504 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 4,808 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 1.95 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 45.52 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 13,367 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	6,845	51	3,045	32	0.00	0.00	28.00	28.00	6,617
สิริกิตี	4,174	44	1,324	20	1.95	1.89	11.04	11.01	5,336
ภูมิพล+สิริกิตี	11,019	48	4,369	27	1.95	1.89	39.04	39.01	11,953
แควน้อยฯ	303	32	260	29	0.00	0.00	3.46	3.46	636
ป่าสักชลสิทธิ์	182	19	179	19	0.00	0.00	3.03	3.02	778
รวมทั้งหมด	11,504	46	4,808	26	1.95	1.89	45.52	45.49	13,367

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 13 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ สิริกิตี (20%) อ่างฯ กัวคองมา (29%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (29%) อ่างฯ แม่มอก (21%) อ่างฯ จุฬารัตน์ (13%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (24%) อ่างฯ ลำตะคอง (30%) อ่างฯ สิรินคร (25%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (19%) อ่างฯ กระเสียว (7%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (20%) อ่างฯ คลองสิียด (4%) และอ่างฯ ปรานบุรี (21%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโกลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 305 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 309 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ + 17.36 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.34 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.65 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.67 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.41 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.41 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 104 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 104 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 90 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 13 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 1 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 6 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 6 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 65 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 73 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลย์) 13 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 34 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 93 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 93 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) - ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่า-กระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว - ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 35 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 50 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 8 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 143 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 20 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		20 เม.ย. 67	21 เม.ย. 67	22 เม.ย. 67	23 เม.ย. 67	24 เม.ย. 67	25 เม.ย. 67	26 เม.ย. 67		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแล จ.ปทุมธานี	1.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.18	0.20	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าบ้านทพบุรี จ.นนทบุรี	1.13	1.03	1.10	1.33	1.23	1.45	1.56	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าข้ามกรมชลประทานสามเสน กทม.	2.37	2.15	2.38	2.95	2.61	3.05	3.21	สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 26 เม.ย. 67	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.28	-10.52
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	3.10	-12.90
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	0.80	-11.40
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.55	-10.45
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.91	-10.59
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.25	-12.25

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (วันที่ 1 พ.ย.66 ถึง 30 เม.ย.67) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 40,387 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ จำนวน 24,985 ล้าน ลบ.ม. สำหรับในเขตลุ่มเจ้าพระยา ได้วางแผนจัดสรรน้ำ จำนวน 8,700 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 23,294 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 93 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ) วันนี้ใช้น้ำไป 45.45 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 8,387 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 96 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	3,050	7,760	13,555	620	24,985	23,294	93
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	2,722	4,693	135	8,700	8,387	96



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

ทั่วประเทศ จำนวน 11.54 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.13 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.53 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 4.90 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.20 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.70 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2567)

ทั่วประเทศ จำนวน 13.36 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.78 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.58 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 125.33 ของแผน

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 7.83 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.47 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.36 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 159.80 ของแผน

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2566/67			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2566/67						ข้าวรอบที่ 2	
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	รวมข้าว	%รวมข้าว	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวมทั้งหมด	%รวมทั้งหมด	พื้นที่เก็บเกี่ยว	พื้นที่รอเก็บเกี่ยว
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	5.80	0.57	6.37	9.30	160.34	0.52	91.23	9.82	154.16	7.02	2.28
	นอกเขตชลประทาน	2.33	1.96	4.29	2.48	106.44	1.06	54.08	3.54	82.52	1.89	0.59
	รวม	8.13	2.53	10.66	11.78	144.90	1.58	62.45	13.36	125.33	8.91	2.87
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	3.03	0.13	3.16	5.91	195.05	0.09	69.23	6.00	189.87	5.34	0.57
	นอกเขตชลประทาน	1.17	0.57	1.74	1.56	133.33	0.27	47.37	1.83	105.17	1.44	0.12
	รวม	4.20	0.70	4.90	7.47	177.86	0.36	51.43	7.83	159.80	6.78	0.69

พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน รวม 55 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 4.31 ล้านไร่ ได้แก่

- ในเขตชลประทาน 50 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 3.83 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุดรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนครหนองคายหนองบัวลำภูอำนาจเจริญอุดรธานีอุบลราชธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมระยองสระแก้วกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและจังหวัดกระบี่

- นอกเขตชลประทาน 23 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.48 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก น่าน นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง สุโขทัย อุดรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม หนองบัวลำภูอำนาจเจริญชัยนาทตราดนครนายกสุพรรณบุรีและจังหวัดตรัง

5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 16 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 25 เมษายน 2567

ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง 7 หน่วย 21 เที่ยวบิน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการฯ เชียงใหม่ พิษณุโลก กาญจนบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และศูนย์ปฏิบัติการฯ สุราษฎร์ธานี

- การกักการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช และ จ.สุราษฎร์ธานี ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.เชียงใหม่(ไชยปราการ เชียงดาว) จ.เชียงราย(เมืองเชียงราย พาน) เพชรบูรณ์(บึงสามพัน หล่มเก่า วิเชียรบุรี) ชัยภูมิ(ภักดีชุมพล) บุรีรัมย์(เมืองบุรีรัมย์ ประโคนชัย พลับพลาชัย) สุรินทร์(ปราสาท) จันทบุรี(โป่งน้ำร้อน สอยดาว) สระแก้ว(คลองหาด วังสมบูรณ์) เพชรบุรี(แก่งกระจาน) ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) นครศรีธรรมราช(บางขัน ท่งสง ท่งใหญ่ นาบอน ช้างกลาง) กระบี่(เมืองกระบี่ อ่าวลึก เขาพนม คลองท่อม ลำทับ เนินคลอง) ตรัง(ย่านตาขาว เมืองตรัง กันตัง นาโยง สิกะหวี เวียงสระ) ห้วยยอด รัชฎา) และ จ.สุราษฎร์ธานี(เคียนซา บ้านนาสาร เวียงสระ)

- การกักการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ที่เกินค่ามาตรฐาน มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบริเวณพื้นที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง และ จ.พะเยา หลังการปฏิบัติการได้มีการติดตามปริมาณค่าฝุ่นละออง (PM_{2.5}) พบว่าในเขต พื้นที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง และ จ.พะเยา มีแนวโน้มลดลง

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2567)

- การปฏิบัติการฝนหลวง 83 วัน จำนวน 2,599 เที่ยวบิน (4,182:55 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำมันฝนหลวง 970.675 ตัน และปริมาณการใช้น้ำ 283,800 ลิตร พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 626 นัด รายงานพื้นที่ฝนตก รวม 49 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก อุทัยธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ราชบุรี ชลบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี ชุมพร พังงา กระบี่ พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา สตูล นราธิวาส ภูเก็ต สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- การปฏิบัติการการกักดับไฟป่า จำนวน 11 วัน จำนวน 150 เที่ยวบิน (28:05 ชั่วโมงบิน) ปริมาณน้ำ 81,500 ลิตร พื้นที่ปฏิบัติการ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกระบี่

6. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- **เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่** เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบล-บรี-บรี โขง และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 จำนวน 2,289 เครื่อง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ประจำสัปดาห์วันที่ 16 - 21 เมษายน 2567 งานขาดแคลนน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

- **เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ** รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

7. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 67)

7.1 อุทกภัย ช่วงภัย 25 ม.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชร เกษตรกร 13 ราย รวมพื้นที่ (ข้าว) 90 ไร่ คิดเป็นเงิน 120,935 บาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง เกษตรกร 7 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 2 ไร่ กระชัง 256 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 103,572 บาท

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.2 วาตภัย ช่วงภัย 13 ม.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี เลย และ จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 134 ราย รวมพื้นที่ 508 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 707 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 477 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 26 ไร่ คิดเป็นเงิน 1.06 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 87 ราย (คิดเป็นร้อยละ 65.41 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 342 ไร่ วงเงิน 725,736 บาท (คิดเป็นร้อยละ 69.22 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.3 อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัย 22 - 28 ธ.ค. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 1,179 ราย พื้นที่ 2,142 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 366 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 205 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 1,571 ไร่ คิดเป็นเงิน 7.25 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 939 ราย (คิดเป็นร้อยละ 79.85 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 1,749 ไร่ วงเงิน 6.30 บาท (คิดเป็นร้อยละ 87.31 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา เกษตรกร 716 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 278 ไร่ กระชัง 13,283 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 6.20 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 467 ราย (คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 157 ไร่ กระชัง 3,019 ตร.ม. วงเงิน 2.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 33.96 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี เกษตรกร 219 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย รวม 1,389 ตัว แบ่งเป็น โค 245 ตัว กระบือ 6 ตัว สุกร 18 ตัว แพะ/แกะ 107 ตัว และสัตว์ปีก 1,013 ตัว คิดเป็นเงิน 8.70 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

7.4 อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัย 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง พัทลุง ปัตตานี นครศรีธรรมราช ยะลา สุราษฎร์ธานี และ จังหวัดสงขลา เกษตรกร 3,001 ราย พื้นที่ 14,991 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10,577 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 2,910 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 1,505 ไร่ คิดเป็นเงิน 26.02 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 2,353 ราย (คิดเป็นร้อยละ 79.15 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 13,652 ไร่ วงเงิน 23.31 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 93.49 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 7,342 ราย พื้นที่ (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 20,067 ไร่ กระชัง 20,319 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 153.58 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 235 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3.20 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 261 ไร่ กระชัง 1,245 ตร.ม. วงเงิน 2.18 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี สงขลา และจังหวัดยะลา เกษตรกร 371 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 6,063 ตัว แบ่งเป็น โค 200 ตัว กระบือ 29 ตัว สุกร 38 ตัว แพะ/แกะ 236 ตัว และสัตว์ปีก 5,560 ตัว คิดเป็นเงิน 7.77 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

7.5 อุทกภัย ช่วงภัย 10 ก.ย. - 6 พ.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตรัง สระแก้ว นครศรีธรรมราช และจังหวัดยะลา เกษตรกร 155,188 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 1,310,189 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 990,971 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 316,499 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 2,718 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,965.58 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 144,988 ราย (คิดเป็นร้อยละ 94.80 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 1,226,721 ไร่ วงเงิน 1,838.71 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 94.95 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 43 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พิจิตร พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ตรัง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ยะลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 8,424 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 10,365 ไร่ กระชัง 2,316 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 53.96 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 6,912 ราย (คิดเป็นร้อยละ 82.05 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 9,203 ไร่ กระชัง 412 ตร.ม. วงเงิน 47.82 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 88.62 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ เพชรบูรณ์ ลำพูน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ขอนแก่น ชัยภูมิ และจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกร 464 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 7,250 ตัว แบ่งเป็น โค 26 ตัว กระบือ 3 ตัว สุกร 12 ตัว และสัตว์ปีก 7,209 ตัว แปลงหญ้า 1,347 ไร่ คิดเป็นเงิน 3.85 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

7.6 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 22 พ.ค. 66 - 18 ก.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยนาท สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 31,980 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 361,024 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 241,575 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 119,356 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 93 ไร่ คิดเป็นเงิน 560.41 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 25,926 ราย (คิดเป็นร้อยละ 81.16 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 282,042 ไร่ วงเงิน 115.01 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 80.51 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

8. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 67)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สกลนคร สุรินทร์ และ กรุงเทพมหานคร) จำนวน 39 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ให้ความรู้ระดับน้ำในนาข้าว แบบเปียกสลับแห้ง เมื่อตรวจพบ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยหรือตัวอ่อน เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง
	2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ น่าน กาญจนบุรี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 126 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่</u>	- ให้ใช้พันธุ์ต้านทานโดยปลูกสลับกันอย่างน้อย 2 พันธุ์ เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัวต่อต้น
	3. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (เพชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท จันทบุรี และสงขลา) จำนวน 99 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- เมื่อพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ พ่นเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก
	4. หนอนกอข้าว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร ร้อยเอ็ด และสงขลา) จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร - ให้กำจัดวัชพืชก่อนหว่านข้าวเพื่อทำลายพืชอาศัย ไม่ควร ปลูกข้าวโดยวิธีหว่านหรือปักดำ
	5. โรคใบจุดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สกลนคร และสงขลา) จำนวน 35 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ให้เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดิน เพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง
มะพร้าว	1. ไรสีขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรัง สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร ชุมพร ตรัง และพัทลุง) จำนวน 500 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่</u>	- หนอนหัวดำ ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน อัตราไร่ละ 200 ตัว โดยปลอ่ย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ปลอ่ยแตนเบียน ไข่ไตรโคแกรมมา อัตราไร่ละ 10 แผ่น ๆ ละ 2,000 ตัว โดยปลอ่ย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน และใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซเอท โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 14,477 ไร่ การระบาดลดลง 368 ไร่	- ดัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย และเก็บเศษซากพืชนำไปเผานอกแปลงทันที และหมั่นสำรวจสวนมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอ
	3. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 28 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 16,467 ไร่ การระบาดลดลง 33 ไร่	- แนะนำตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและแมลงดำหนามกัดกินไปเผาทำลาย ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเตส 3-5 ครั้ง เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว ปลอ่ยแตนเบียนเตตระสติคัส (โดยปลอ่ยทุก 7 วัน ต่อเนื่อง 1 เดือน)
	4. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ศรีสะเกษ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงครามสมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,836 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 17 ไร่	- ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงและด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาตราเรียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้
	5. ดั้วงวง	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,411 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	
ปาล์ม น้ำมัน	1. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,702 ไร่ การระบาดลดลง 54 ไร่	- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาตราเรียม เพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน
	2. ดั้วกู่หลาบ	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 673 ไร่ การระบาดลดลง 18 ไร่	- หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอกปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซิลแฟน
	3. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (นครราชสีมา ระยอง กระบี่ ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,432 ไร่ การระบาดลดลง 91 ไร่	- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน
	4. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,066 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
	5. โรคทะลายเน่า	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 183 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดใบย่อยที่มีหนอนหน้าแมว หรือเก็บดักแด้ตามใบ และชอกโคนมาทำลาย พ่นแบคทีเรีย Bt อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นสารฆ่าแมลงบริเวณผิวใบ เฉลี่ย 20 ตัวต่อทางใบ
	6. หนอนหน้าแมว	พื้นที่ปลูก 4 จังหวัด (ระยอง พัทลุง สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 423 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบเป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง ให้ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน
	7. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ยะลา นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 111 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่	- ดัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมี คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ 85% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่แผ่นใบ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	8. โรคใบจุดสาหร่าย 9. ก้านทางใบเน่า	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 780 ไร่ การระบาดลดลง 35 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กระบี่ นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 467 ไร่ การระบาดคงที่	- ดัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคกันทางใบเน่า นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ของสปอร์ไปยังต้นอื่น ๆ หากทางใบปาล์มน้ำมันเน่ามากไป พยายามตัดแต่งทางใบแห้งออก เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในทรงพุ่ม
ยางพารา	1. โรคราขาว 2. โรคราแป้ง 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา 5. โรคหนำียงแห้ง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,811 ไร่ การระบาดลดลง 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครศรีธรรมราช) จำนวน 100 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ปัตตานี นครศรีธรรมราช พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,001 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (น่าน แพร่ สุโขทัย นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา และสงขลา) จำนวน 1,118,559 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ยโสธร สกลนคร จันทบุรี ตรัง และสงขลา) จำนวน 5,437 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่	- คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคราขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนาตคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารารุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรงศ์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยางควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบกรีดการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งในรูปปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยพืชสด
กาแฟ	1. โรคราสนิม 2. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง) จำนวน 594 ไร่ การระบาดคงที่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและป่นต่อเก่าสับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี ยะลา สงขลา และสตูล) จำนวน 259 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาว 3. ด่างหนวดยาว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา และกาญจนบุรี) จำนวน 178 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) จำนวน 53 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน ปลอยแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมา อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ปลอยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ปลอยแมลงหางหนี้อัตรา 500 ตัวต่อไร่ - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เพื่อลดแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรคและแมลงพาหะ ในแปลงที่พบการระบาดของโรครุนแรง ควรไถทำลายต่ออ้อย
มันสำปะหลัง	1. โรแดงมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 22,087 ไร่ การระบาดลดลง 1,451 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ขอนแก่น สกลนคร สระแก้ว อุบลราชธานี จันทบุรี ชลบุรี และกาญจนบุรี) จำนวน 263 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่างด้วย 3 วิธี - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. โรคโคนเน่าหัวเน่า 4. โรคพุ่มแจ้ 5. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา อุบลราชธานี และชลบุรี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 260 ไร่ การระบาดลดลง 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 29 จังหวัด (กำแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี ชัยนาท ตพบุรี สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 207,504 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 84 ไร่	- ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี้ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - ควรกรร่งแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ท่อนพันธุ์ด้วยยาฆ่าเชื้อรา หรือฟอสฟิออร์-อะลูมิเนียม
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 17 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 108 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 32 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ขอนแก่น) จำนวน 1 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์ไฮดรอกไซด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ให้สังเกตดูใบอ่อน และใบแก่ - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง 4. ไรแดง 5. โรครากเน่าโคนเน่า 6. โรคใบติดหรือใบไหม้ 7. โรคใบจุดสาหร่าย 8. เพลี้ยหอยเกล็ด	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,257 ไร่ การระบาดลดลง 45 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 484 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 440 ไร่ การระบาดลดลง 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 944 ไร่ การระบาดลดลง 302 ไร่ พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,072 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ นราธิวาส ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 256 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 553 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 30 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และสงขลา) จำนวน 306 ไร่ การระบาดลดลง 33 ไร่	- หากพบเพลี้ยไฟ ไรแดง แอพรากจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยไก่แจ้ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง - โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคใบติดหรือใบไหม้ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่นนำไป - เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรยยังระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช - หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวต์ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ - เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง - ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง กำจัดวัชพืชในแปลง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกลดความชื้นสะสม เมื่อพบคราบราสีดำนพ่นด้วยน้ำเปล่า - กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อเป็นการลดความชื้นสะสม หากพบอาการของโรคที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง หรือเื้อนเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก และใช้สารคอปเปอร์-ออกไซด์ไฮดรอกไซด์ ผสมน้ำทาบริเวณแผลที่ตัด

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	9. เพลี้ยจักจั่นฝอย 10. โรคราดำ 11. โรคราสีชมพู	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 445 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 93 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ยะลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 186 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 143 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ 4. โรคใบจุด 5. โรคแอนแทรคโนส 6. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง และ ชุมพร) จำนวน 365 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 314 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 147 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 56 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 85 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง และนราธิวาส) จำนวน 217 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หมั่นทำความสะอาดแปลงปลูก และทำลายส่วนที่เป็นโรค เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรคให้ตัดใบหรือส่วนที่เป็นโรค นำไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดของโรคให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอน จะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน - กำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งสะสมโรค พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 18 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทยอน 83% W/V EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ไพรีทรอยด์ (อัตราส่วนตามฉลาก) พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้งห่างกัน 10 วัน
	2. โรคราดำ 3. โรคพุ่มไม้กวาด	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา อุบลราชธานี และจันทบุรี) จำนวน 246 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 106 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- พ่นสารเคมีเช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกไซด์ 85% WP อัตรา 40-50 กรัม เบตาไซฟลูทริน 2.5 % EC อัตรา 40-50 กรัม โดยเลือกใช้ผสมน้ำ 20 ลิตร - ป้องกันแมลงพาหะ โดยใช้สารเคมี ได้แก่ คาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร ไอโซไพโรคาร์บ 50% WP อัตรา 40 กรัม โดยเลือกใช้ผสมน้ำ 20 ลิตร

9. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 67)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 24 เมษายน 2567 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 10 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 157 จุด ในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ นครนายก อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา เลย มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์ อุดรธานี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้