



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

วันที่ 2 กันยายน 2569 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ


1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 4 - 7 กันยายน 2569) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 2 กันยายน 2569

ในช่วงวันที่ 4 - 7 ก.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้

อนึ่ง พายุโซนร้อน “โซเดล” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะใต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 1 ก.ย. 69 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 2 ก.ย. 69



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.ท่าวังผา	น่าน	75.2	ฝนตกหนัก
2	อ.เมือง	อุดรธานี	37.6	ฝนตกหนัก
3	อ.เมือง	นครพนม	25.2	ฝนตกปานกลาง
4	อ.เมือง	มุกดาหาร	23.6	ฝนตกปานกลาง
5	อ.เมือง	ระนอง	20.4	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 69)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 51,745 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 27,775 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2568 (54,064 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71) น้อยกว่าปี 2568 จำนวน 2,319 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 471.98 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 103.18 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 24,920 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 48,486 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 24,936 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2568 (50,573 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71) น้อยกว่า ปี 2568 จำนวน 2,084 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 428.99 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 69.38 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 22,352 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก ล้าน (ม.)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รบก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รบก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รบก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รบก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รบก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รบก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	15,633	63	8,888	49	92	1,184	721	61	630	58	100	26,009	16,354	63	9,519	49	9,655
ตอน	12	8,368	4,161	50	2,509	37	234	2,209	1,272	58	1,100	54	246	10,577	5,433	51	3,608	41	5,144
กลาง	3	1,331	518	39	446	35	28	419	218	52	187	48	31	1,750	735	42	634	38	1,015
ตะวันตก	2	26,605	22,215	83	8,938	67	9	170	70	41	59	37	11	26,775	22,285	83	8,997	67	4,490
ตะวันออก	6	1,515	764	50	669	47	54	1,118	718	64	655	61	60	2,633	1,481	56	1,324	53	1,152
ใต้	4	8,194	5,196	63	3,486	54	44	727	260	36	207	31	48	8,922	5,456	61	3,693	52	3,465
รวม	35	70,838	48,486	68	24,936	53	461	5,828	3,259	56	2,839	53	496	76,666	51,745	67	27,775	53	24,920

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แคว้น้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 15,430 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 8,723 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 95.94 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 25.57 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 9,352 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	7,682	57	3,882	40	39.54	29.21	10.01	10.00	5,780
สิริกิตี	6,952	73	4,102	62	37.4	30.64	9.94	9.93	2,558
ภูมิพล+สิริกิตี	14,634	64	7,984	49	76.94	59.85	19.95	19.93	8,338
แคว้น้อยฯ	400	43	357	40	7.56	5.51	4.32	1.73	539
ป่าสักชลสิทธิ์	396	45	382	45	11.44	14.74	1.30	1.30	475
รวมทั้งหมด	15,430	62	8,723	48	95.94	80.10	25.57	22.96	9,352

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 5 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ แม่มอก (24%) อ่างฯ ลำพระเพลิง (27%) อ่างฯ ลำนางรอง (27%) อ่างฯ กระเสี้ยว (23%) และอ่างฯ คลองสีียด (24%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จำนวน 3 อ่าง ได้แก่ อ่างฯ ศรีนครินทร์ (84%) อ่างฯ วชิราลงกรณ์ (82%) อ่างฯ ชุนด่านปราการชล (82%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำวัง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำยม แม่น้ำพระสทิธิ แม่น้ำบางปะกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 805 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 838 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +19.10 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.60 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 400 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 400 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.05 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.04 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +7.98 ม.รทก. (เมื่อวาน +7.98 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 206 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 209 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 161 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 39 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 6 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 123 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 132 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 86 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 120 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 28 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 48 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 225 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 225 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 27 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสี้ยว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสี้ยว) 9 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 60 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 80 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 49 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำเจ้าพระยา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สถานี C.29B ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 649 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 674 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		27 ส.ค. 69	28 ส.ค. 69	29 ส.ค. 69	30 ส.ค. 69	31 ส.ค. 69	2 ก.ย. 69	2 ก.ย. 69		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร - เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 2 ส.ค. 69	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	6.34	-6.46
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	12.62	-3.38
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	10.58	-1.62
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	9.49	-2.51
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	9.50	-3.00
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	11.74	-2.76

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. ผลกระทบด้านการเกษตร

3.1 ฝนแล้ง ช่วงภัย 8 ก.ค. 69 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร และเพชรบูรณ์ เกษตรกร 1,069 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 24,126 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11,767 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 12,351 ไร่ และไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 8 ไร่ **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 105 ราย พื้นที่ (พืชไร่ และพืชผัก) 774 ไร่ วงเงิน 2,569,680 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 69)

ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

3.2 ภัยแล้ง ช่วงภัย 1 เม.ย. 69 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และนครศรีธรรมราช เกษตรกร 4,453 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 8,646 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,112 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 362 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 7,173 ไร่ **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 1,051 ราย พื้นที่ 2,646 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 879 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 1,766 ไร่ วงเงิน 8,328,649 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 216 ราย พื้นที่ 1,186 ไร่ วงเงิน 2,417,972 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 69)

ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

3.3 อุทกภัย ช่วงภัย 20 ก.พ. 69 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองคาย อุบลราชธานี ตราด ชัยนาท และสระบุรี เกษตรกร 42,998 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 248,732 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 230,451 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 15,575 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 2,707 ไร่ **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 4,801 ราย พื้นที่ 35,750 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 33,687 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,947 ไร่ และไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 116 ไร่ วงเงิน 49,463,643 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 399 ราย พื้นที่ 2,098 ไร่ วงเงิน 3,001,336 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 69)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำพูน นครพนม สกลนคร และอุบลราชธานี เกษตรกร 2,061 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 1,615 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 1,520 ไร่ บ่อกุ้ง 95 ไร่ และกระชัง 135 ตอม. **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 2,061 ราย พื้นที่ 1,615 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 1,520 ไร่ บ่อกุ้ง 95 ไร่ และกระชัง 135 ตอม. วงเงิน 8,163,797 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 2 ราย พื้นที่ 1 ไร่ วงเงิน 4,027 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 69)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา นครพนม ลำปาง และหนองคาย เกษตรกร 27,216 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 908,859 ตัว แบ่งเป็น โค 23,696 ตัว กระบือ 5,809 ตัว สุกร 25,803 ตัว แพะ/แกะ 630 ตัว และสัตว์ปีก 852,921 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1,081.25 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** สัตว์ตาย/สูญหายรวม 976 ตัว แบ่งเป็น โค 11 ตัว กระบือ 1 ตัว สุกร 11 ตัว และสัตว์ปีก 953 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 68)

3.4 วาตภัย ช่วงภัย 20 ก.พ. 69 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 45 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระบี่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระยอง ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี เกษตรกร 6,501 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 19,174 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,576 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 12,544 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 4,054 ไร่ **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 1,857 ราย พื้นที่ 6,941 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 102 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 6,010 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 829 ไร่ วงเงิน 15,392,005 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,640 ราย พื้นที่ 6,533 ไร่ วงเงิน 14,147,707 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 69)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เกษตรกร 4 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับผลกระทบ (กระชัง) 122 ตรม. **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 4 ราย พื้นที่ (กระชัง) 122 ตรม. วงเงิน 44,896 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3 ราย พื้นที่ 104 ตรม. วงเงิน 38,272 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 69)

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- **เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่** เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบโศก-บริโศก พืชไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2569 จำนวน 1,914 เครื่อง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ประจำสัปดาห์ วันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2569 งานระบายน้ำหลาก จำนวน 9 เครื่อง ในเขตจังหวัดสุโขทัย ตาก และอุดรธานี งานขาดแคลนน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ในจังหวัดนครราชสีมา
- **เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ** รวมทั้งหมด 203 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 54 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 49 คัน ภาคกลาง และภาคตะวันตก 37 คัน ภาคตะวันออก 25 คัน และภาคใต้ 38 คัน
- **กรมประมง** ดำเนินการช่วยเหลือ ได้แก่ จัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 48 นาย รถยนต์ รวม 10 คัน เรือท้องแบน รวม 10 ลำ ช่วยนำส่งเสบียงอาหาร และน้ำดื่ม พร้อมทั้งอพยพประชาชน ผู้ป่วย เด็กและคนชรา ในพื้นที่ประสบภัยสู่พื้นที่ปลอดภัย
- **กรมปศุสัตว์** ดำเนินการช่วยเหลือ โดย อพยพสัตว์ รวม 542 ตัว ให้อาหารสัตว์พระราชทาน รวม 59,660 กิโลกรัม ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ (แร่ธาตุ/ยาปฏิชีวนะ วิตามิน) รวม 1,333 ชุด รักษาสัตว์ รวม 96 ตัว ฝังยั้งชีพสัตว์ รวม 86 ตัว

5. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 69)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี ปราจีนบุรี และสงขลา) จำนวน 1,695 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 831 ไร่	- โรคไหม้ข้าว การใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม อัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ การใช้ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร การใช้พันธุ์ต้านทาน เช่น ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 1,2 กข 41
	2. หนอนด่างกินราก	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เพชรบูรณ์) จำนวน 105 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หนอนด่างกินราก ไถพรวนดินหลายครั้งก่อนปลูก และตากดิน 7-14 วัน เพื่อพลิกไช้หนอนและดักด้ขี้สุไผ่ดิน
	3. โรคขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (บุรีรัมย์ สกลนคร และสงขลา) จำนวน 211 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 76 ไร่	ใช้เชื้อราเมตาโรเซียม อัตราเชื้อสด 10 กิโลกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นหรือราดบริเวณโคนต้นและหน้าดินเพื่อควบคุมหนอนใต้ดิน ใช้สารเคมีกำจัดแมลง เนื่องจากหนอนด่างอาศัยและกัดกินรากอยู่ใต้ดิน ให้ราดหรือพ่นสารลงบริเวณโคนต้นให้ตรงแนวราก เพื่อให้สารซึมลงสู่ดินและสัมผัสกับหนอนได้โดยตรง
	4. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) จำนวน 1,272 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1,210 ไร่	- โรคขอบใบแห้ง ใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทาน ไม่ควรระบายน้ำจากแปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอื่น ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			- เพลี้ยกระโดดหลังขาว แนะนำปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน เมื่อตรวจพบมากกว่า 1 ตัวต่อต้น ให้ใช้น้ำออกจากแปลงนา เพื่อควบคุมระดับน้ำในนาข้าว อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เพื่อใช้ควบคุมการระบาด ไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่มากเกินไป เพราะจะทำให้ต้นข้าวอวบเหมาะแก่การเข้าทำลาย และควบคุมระดับน้ำในนาข้าว โดยการระบายน้ำออกเป็นครั้งคราวแบบเปียกสลับแห้ง
มะพร้าว	1. ดัวงงวง 2. หนอนหัวดำ 3. แมลงดำหนาม 4. ไรสีขามะพร้าว 5. ดัวงแรด	พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 733 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 14 ไร่ พื้นที่ระบาด 35 จังหวัด (เพชรบูรณ์ สุโขทัย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ชัยนาท จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 24,713 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 364 ไร่ พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (เพชรบูรณ์ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ชัยนาท กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,208 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 35 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร ชัยนาท จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร นครศรีธรรมราช และสงขลา) จำนวน 1,077 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 31 ไร่ พื้นที่ระบาด 30 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,322 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 64 ไร่	- ดัวงงวง ใช้ตาข่ายดักจับดัวงงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดดัวงงวงในระยะหนอนและดักแด้ ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ หรือชันผสมกับน้ำมันยาง ทาบริเวณแผลโคนต้นหรือลำต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่ของดัวงงวงมะพร้าว - หนอนหัวดำ ปล่อยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำปล่อยแตนเบียน ไชทริโครแกรมมา (<i>Trichogramma</i> sp.) เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ และแนะนำการใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซเอท (<i>emamectin benzoate</i>) 1.92% EC ในการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำ - แมลงดำหนาม ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hipinarum</i>) เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าวปล่อยแตนเบียนเตตระสติดัส (<i>Tetrastichus brontispae</i>) เพื่อควบคุมดักแด้แมลงดำหนามมะพร้าว และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ - ไรสีขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในขั้วผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไร ไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้น การป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่น จนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร - ดัวงแรด ใช้ เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) ผสมกับปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับ ในการกำจัดดัวงแรดในระยะหนอนและดักแด้ ใช้กับดักไฟโรโมนเพื่อล่อดัวงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และแนะนำการใช้สารเคมีกำจัดเมื่อพบการระบาดรุนแรง
ปาล์ม น้ำมัน	1. หนอนปลอกเล็ก 2. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ชลบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช และพังงา) จำนวน 576 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (มุกดาหาร สกลนคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 246 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 19 ไร่	- หนอนปลอกเล็ก ตัดทางใบที่ถูกหนอนปลอกเล็กกัดกิน มาเผาทำลายทิ้งนอกแปลง แนะนำพ่นเชื้อบีที (<i>Bacillus thuringiensis</i>) อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 5 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วบริเวณได้ - หนอนหัวดำ ตัดทางใบและเก็บซากพืชที่ถูกทำลาย แล้วนำไปเผาทันที เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ และปล่อย

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. ดั้วแรด 4. ดั้วกุหลาบ 5. โรคลำต้นเน่า 6. โรคทะลายเน่า 7. โรคใบจุด 8. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,195 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 74 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 449 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 19 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 11,207 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 22 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด สระแก้ว ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,108 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 123 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ตรัง นราธิวาส นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 3,900 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่	แตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมระยะ หนอนของหนอนหัวดำ - ดั้วแรด ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัย มาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) อัตรา 800 กรัมต่อกองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับ เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะ หนอนและดักแด้ - ดั้วกุหลาบ ทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และ บริเวณโคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ และแนะนำเกษตรกร ให้ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน (Sevin) 85% WP หรือคาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 20% EC ในการกำจัดด้วงกุหลาบ - โรคลำต้นเน่า ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาหรือฉีดพ่นบริเวณ รอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ผสมกับเชื้อไตรโคเดอร์มาเพื่อบำรุงดินปาล์มน้ำมันให้แข็งแรง - โรคทะลายเน่า ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่อดอกที่ผุ และ ทะลายที่พบเป็นโรคนำออกไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง และ ทำความสะอาดสวนกำจัดวัชพืช เพื่อให้มีอากาศถ่ายเท - โรคใบจุดสาหร่าย ตัดทางใบที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไป เผาทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ของสปอร์ ไปยังต้นอื่น และแนะนำให้สารเคมีคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (copper oxychloride) 85% WP เมื่อพบการระบาดรุนแรง - โรคใบจุด กำจัดวัชพืชบริเวณรอบสวนปาล์มน้ำมัน ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเมื่อพบ การแพร่ระบาดของโรคใบจุด และแยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุด ออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลาย
ยางพารา	1. โรคครากขาว 2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคหน้ำยางแห้ง 5. โรคใบจุดนูน 6. โรคคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,359 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (น่าน สุโขทัย นครพนม บึงกาฬ เลย หนองคาย อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 989,138 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5,945 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (สุโขทัย หนองคาย ตราด ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,464 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 101 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (สกลนคร ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,059 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 35 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (หนองคาย) จำนวน 1,791 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สกลนคร ตรัง สตูล และ สงขลา) จำนวน 86 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่	- แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคครากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีต 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่ง น้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ - เมื่อพบอาการโรคเป็นรอยปุ่มเพียงเล็กน้อย ใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดเชื้อราทาบริเวณที่ถูกทำลาย เพื่อรักษาโรค - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง เช่น ต้นยางไหลนานผิดปกติและน้ำยางจางลง หรือน้ำยาง หยุดไหลเร็ว หรือน้ำยางหยุดไหลเป็นช่วง ๆ บนหน้ากรีต ควรหยุดกรีต 3 - 6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง - ใส่ปุ๋ยเคมีในช่วงปลายฤดูฝนตามคำแนะนำ เพื่อให้ใบที่ผลิ ออกมาใหม่สมบูรณ์และแก่เร็ว พ้นระยะอ่อนแอต่อการเข้า ทำลายของเชื้อ
กาแฟ	1. โรคใบจุดตากบ 2. หนอนเจาะกิ่ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และเพชรบูรณ์) จำนวน 135 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก) จำนวน 161 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 4 ไร่	- หากพบการเข้าทำลายของหนอนกาแฟสีแดง/หนอนเจาะกิ่ง ให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลง และฉีดพ่น สารฆ่าแมลงเพนิโตรธอน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. มอดเจาะผลกาแฟ	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ตาก น่าน และแม่ฮ่องสอน) จำนวน 919 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 166 ไร่	- วางกับดักสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ (เมทิลแอลกอฮอล์ : เอทิลแอลกอฮอล์ อัตรา 1 : 1) เติมน้ำล่อทุก ๆ 2 สัปดาห์ ใช้เชื้อราชีวเวเรีย DOA B18 ผสมสารจับใบฉีดพ่นอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
มันสำปะหลัง	1. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 37 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 778,238 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 6,675 ไร่	- โรคใบด่างมันสำปะหลัง ปลุกมันสำปะหลังที่เป็นพันธุ์ทนทาน โรคและสะอาด ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 และ ห้วยบง 60 และพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง ได้แก่ อธิ 1 อธิ 2 อธิ 3 หรือพันธุ์อื่น ๆ ที่หน่วยงานวิชาการรับรอง กำจัดแมลงหริ้วขาวยาสูบพาหนะนำโรค โดยการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของ แมลงหริ้วขาวยาสูบ ได้แก่ แมลงช้างปีกใส ตัวงูตัวหัว หรือ พ่นสารกำจัดแมลง imidacloprid 70% WG และเฝ้าระวัง การระบาดของไวรัสใบด่างในพืชอาศัยอื่นๆ
	2. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สกลนคร หนองคาย อุบลราชธานี สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี สระแก้ว และกาญจนบุรี) จำนวน 3,581 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 441 ไร่	- เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ไกลและพรวนดิน เพื่อลดปริมาณ ของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังที่อยู่ในดิน และควบคุมโดยใช้ศัตรู ธรรมชาติ ได้แก่ แมลงช้างปีกใส และแตนเบียนเพลี้ยแป้งมัน สำปะหลังสีชมพู และแนะนำการใช้สารฆ่าแมลงเฉพาะจุด เมื่อพบเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
	3. โรคพุ่มแจ้	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (กำแพงเพชร อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี จันทบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 5,723 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 776 ไร่	- โรคพุ่มแจ้ แนะนำให้ใช้ท่อนพันธุ์หรือต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ที่ปลอดโรค กำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งพักเชื้อหรือเป็นที่อาศัย ของแมลงพาหนะนำโรคในแปลง เช่น ต้นสาบม่วง หลีกเลี้ยง การขนย้ายท่อนพันธุ์
	4. โรแดงมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี อุดรดิตถ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย ชลบุรี และกาญจนบุรี) จำนวน 12,894 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3,544 ไร่	- โรแดง แก้ไขโดยการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของโรแดง เช่น ตัวงูตัวหัว ตัวงูตัวหัว และไรตัวหัว หลีกเลี้ยงการปลูก มันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน เมื่อพบการเข้าทำลายของโรแดงควรเก็บทิ้งหรือทำลาย เพื่อ ลดการเพิ่มปริมาณของโรแดง ในสภาพที่เหมาะสมอาจเกิด การระบาดขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งแนะนำการใช้สารฆ่าแมลง เมื่อพบอาการ
	5. เพลี้ยหอยเกล็ด	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ยโสธร สกลนคร จันทบุรี และ ชลบุรี)	- เพลี้ยหอยเกล็ด หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ เมื่อพบการระบาด ให้ถอนและเก็บต้นมันสำปะหลังนำไปทำลายทิ้งนอกแปลงปลูก จากนั้นให้ฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง ให้ฉีดพ่นเฉพาะในจุดที่พบ เพลี้ยหอยเกล็ดเข้าทำลาย
	6. โรคโคนเน่าหัวเน่า	จำนวน 523 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (มุกดาหาร และสระแก้ว) จำนวน 840 ไร่ <u>พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น</u> 299 ไร่	- โรคโคนเน่าหัวเน่า หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรคให้ถอนและนำไปทำลาย นอกแปลงปลูก แล้วโรยปูนขาวหรือราดด้วยสารเมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 20-50 กรัม หรือฟอสฟิอัสลูมิเนียม 80% WP อัตรา 50 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณที่ถอนและโดยรอบห่างออกไปประมาณ 1 เมตร
	7. หนู	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตาก) จำนวน 623 ไร่ <u>พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น</u> 623 ไร่	
	8. หนอนแมลงวัน	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์) จำนวน 102 ไร่ <u>พื้นที่ระบาดคงที่</u>	
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ อุดรดิตถ์ ขอนแก่น นครราชสีมา จันทบุรี ชลบุรี ยะลา และสตูล) จำนวน 2,555 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 59 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่ม ไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
	2. หนู	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตาก) จำนวน 20,038 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 13,367 ไร่	- หนอดังกินราก ไถพรวนดินหลายครั้งก่อนปลูก และ ตากดิน 7-14 วัน เพื่อพลิกไข่หนอนและดักด้งขึ้นสู่ผิวดิน ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม อัตราเชื้อสด 10 กิโลกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นหรือราดบริเวณโคนต้นและหน้าดินเพื่อควบคุม หนอนใต้ดิน ใช้สารเคมีกำจัดแมลง เนื่องจากหนอดัง อาศัยและกัดกินรากอยู่ใต้ดิน ให้ราดหรือพ่นสารลงบริเวณ โคนต้นให้ตรงแนวราก เพื่อให้สารซึมลงสู่ดินและสัมผัส กับหนอนได้โดยตรง
	3. หนอดังกินราก	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เพชรบูรณ์) จำนวน 518 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง และราชบุรี) จำนวน 206 ไร่ การระบาดลดลง 13 ไร่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและปั่นตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาวอ้อย 3. โรคเส้ดำ 4. แมลงหี้ยขาว 5. หนอนแมลงวัน	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุดรธานี และชลบุรี) จำนวน 1,187 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา มหาสารคาม อำนาจเจริญ และชลบุรี) จำนวน 15,037 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 251 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุโขทัย และอุทัยธานี) จำนวน 566 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์) จำนวน 43,607 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เพชรบูรณ์) จำนวน 230 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก - โรคเส้ดำ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบและฉีดพ่นในเวลายืน - แมลงหี้ยขาว หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบตัว เต็มวัยจำนวนมาก ใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย เพื่อ ช่วยลดการระบาด อนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เมื่อเริ่มพบการ ระบาด ให้พ่นเชื้อราบีวเวอเรีย อัตรา 250 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นในช่วงอากาศเย็นหรือความชื้นสัมพัทธ์สูง - หนอนแมลงวัน ไถพรวนดินหลายๆ ครั้งในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ถึงมีนาคมก่อนเริ่มปลูกพืช เพื่อทำลายไข่ ตัวหนอน และดักแด้ที่อยู่ในดิน การปลูกพืชหมุนเวียน ให้พักแปลง และปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน
ทุเรียน	1. เพลี้ยแป้ง 2. เพลี้ยไฟ 3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. หนอนเจาะผล 5. เพลี้ยหอยเกล็ด 6. ไรแดง 7. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ตาก จันทบุรี ตรัง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ยะลา สตูล และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 529 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา สตูล และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 876 ไร่ การระบาดลดลง 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,258 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร ตรัง นราธิวาส พัทลุง ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 133 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ยะลา สุราษฎร์ธานี และสงขลา) จำนวน 511 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 917 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (ตาก นนทบุรี จันทบุรี ตรัง ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,955 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	- เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการ ควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย - เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโพรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สาร ผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอะมีโทกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอะมีโทกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน - เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ โพรพาร์โกด์ อัตรา 30 กรัม อะมิพรอส อัตรา 30 มล. หรือเฮกซีไทอะซอกซ์อัตรา 40 มล. - โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - เมื่อพบการระบาดของโรคใบติดหรือใบไหม้มากควรพ่นสาร ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบ - เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือ ส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรครุนแรงควรพ่นด้วยสาร ป้องกันกำจัดโรคพืช - หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสม ไวต์ออยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาด รุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ - เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล. หรือ ไซเพอร์เมทริน/ไพฟาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	8. โรคใบติดหรือใบไหม้	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ตาก นครราชสีมา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 936 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 54 ไร่	สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน - เมื่อพบคราบราสีดำ พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดำ และสารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง
	9. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (ตาก นครราชสีมา จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,373 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่	- ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ ผสมน้ำซันๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด
	10. เพลี้ยจักจั่นฝอย	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (นครราชสีมา จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,407 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	- ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมป์ดา-ไซยาโลทริน
	11. โรคคราดำ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร พังงา ยะลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 403 ไร่ การระบาดลดลง 68 ไร่	- มอดเจาะลำต้น ควรตัดและเผาทิ้ง สำหรับส่วนของต้นทุเรียนที่ไม่สามารถตัดทิ้งได้
	12. โรคราสีชมพู	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ตราด ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 186 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	- หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อน ให้เขย่ากิ่ง ตั๊กแตนคืบจะทิ้งตัวลงที่พื้นดิน สามารถจับทำลายได้ หรือใช้กับดักแสง ไฟล่อตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืน
	13. มอดเจาะลำต้นทุเรียน	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ชุมพร นราธิวาส ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 278 ไร่ การระบาดคงที่	- หมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุก ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ไม่ให้รกทึบ และกำจัดวัชพืชในสวนเพื่อลดความชื้น หากพบการระบาดเพียงเล็กน้อย ควรตัดส่วนที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกสวน
	14. หนอนกินใบทุเรียน	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สุรินทร์ จันทบุรี ระยอง ชุมพร และตราด) จำนวน 282 ไร่ การระบาดคงที่	- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรืออิมโปรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร
	15. โรคกิ่งแห้งทุเรียน	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (สกลนคร จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง ชุมพร นราธิวาส พังงา ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 591 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	- หมั่นตรวจตราผลทุเรียนในแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงผลใกล้แก่ หากพบอาการผลเป็นจุดเน่า ควรทำการฉีดพ่นสารเคมี เช่น เมตาแลกซิล 25% WP หรือ เมตาแลกซิลผสมแมนโคแซป หรือ ฟอสเอทธิล อะลูมิเนียม 80% WP ให้ทั่วทั้งต้น ประมาณ 1-2 ครั้ง
	16. โรคแอนแทรกคโนส	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง และยะลา) จำนวน 555 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	
	17. หนอนเจาะเมล็ด	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (สุโขทัย สระบุรี กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส และยะลา) จำนวน 124 ไร่ การระบาดลดลง 32 ไร่	
	18. โรคผลเน่าทุเรียน	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชุมพร ยะลา นราธิวาส และจันทบุรี) จำนวน 188 ไร่ การระบาดคงที่	
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ตาก จันทบุรี นครศรีธรรมราช และระยอง) จำนวน 223 ไร่ การระบาดลดลง 112 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง
	2. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตาก จันทบุรี และนราธิวาส) จำนวน 240 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์
	3. หนอนคืบกินใบ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 170 ไร่ การระบาดคงที่	- หมั่นสำรวจและสังเกตถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
	4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตาก และจันทบุรี) จำนวน 114 ไร่ การระบาดคงที่	- โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
	5. หนอนกินช่อดอก	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 32 ไร่ การระบาดคงที่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนซอนใบ 4. โรคโน้จุด 5. โรคโน้จุดสาหร่าย 6. โรคโน้แอนแทรคโนส 7. โรคโน้ใบแห้งและขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช นราธิวาส และยะลา) จำนวน 241 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระยอง ยะลา พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 626 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร และระยอง) จำนวน 336 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช พังงา และชุมพร) จำนวน 245 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 524 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 56 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 19 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2 ไร่	- ช่วงฤดูแล้งขณะที่มังคุดอยู่ในระยะออกดอก ติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง คือ ระยะก่อนดอกบาน 7 วัน ขณะดอกบาน และหลังบานแล้ว 7 วัน หากเป็นการระบาดนอกฤดูการออกดอกติดผล ควรพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟ เฉลี่ยเกิน 1 ตัวต่อยอด - เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วย สารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบ การระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคโน้จุด ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 30-80 กรัม - เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรคโน้จุด ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคโน้ นำไปทำลาย หรือฝังดินนอกแปลง ไม่ทิ้งไว้ในบริเวณแปลง หรือข้างแปลง ช่วงการตัดแต่งกิ่ง ดูแลการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม ไม่ให้ต้นมีทรงพุ่มแน่นทึบ เพื่อให้มังคุดได้รับ แสงแดด และอากาศถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้น ทำให้ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคโน้ หากโรคโน้ ยังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคโน้พืช - เมื่อเริ่มพบอาการของโรคโน้ ให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคโน้พืช โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่ฉลากระบุ - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคโน้แอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สาร ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - หลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่โล่งแจ้งที่แสงแดดจัดเกินไป ตัดแต่งกิ่งและใบที่แน่นทึบออก เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ สะดวก และในช่วงฤดูแล้ง ควรให้น้ำอย่างเพียงพอ
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคโน้คราดำ 3. โรคโน้พุ่มไม้กวาด 4. หนอนคืบกินใบ 5. โรคโน้โรก้ามะหยี่ 6. หนอนม้วนใบ 7. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ แพร่ จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 257 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา แพร่ จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 522 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 24 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 365 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 28 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 31 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 45 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี) จำนวน 10 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วย สารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบนตาโซฟูทรีน อัตรา 40-50 กรัม - หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคโน้พุ่มไม้กวาด ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคโน้มาเผาทำลายนอกแปลง - เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักด้งไปทำลาย หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมปีดาไซฮาโลทรีน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบมีการระบาด ให้ตัดแต่งกิ่ง และยอดที่ถูกโรคโน้ทำลายนำไปเผาทิ้งนอกแปลงปลูก - หมั่นตรวจ ถ้าพบให้เก็บทำลาย หากระบาดรุนแรงมาก ควรฉีดพ่นด้วยยาโมโนโครโทพอส ในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือพ่นด้วยไพรีทรอยด์อัตรา 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร - ตัดส่วนที่ถูกทำลายที่มีตัวหนอนแล้วเผาไฟเสียและจับตัวแก่ที่มาเล่นไฟกลางคืนไปทำลาย - จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย หากพบระบาดมาก ใช้ยาฆ่าแมลงพวง โมโนโครโทพอส ฉีดพ่นในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือยาฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

6. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ข้อมูลวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2569

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค ทั้งหมด 15 จังหวัด 38 จุด ได้แก่ จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร ชลบุรี นครราชสีมา กาฬสินธุ์ สระแก้ว ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร และหนองคาย ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัด ควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้ ทั้งนี้ พบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 7 ตัว ในพื้นที่จังหวัด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม นครราชสีมา ระยอง ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

พื้นที่เฝ้าระวังการเกิดโรค 181 จุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ระยอง สระแก้ว ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองคาย และอุดรธานี