



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 27 มิถุนายน 2562

1. สภาพอากาศ

1.1 ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

"ฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2562)" ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ในช่วงวันที่ 26-27 มิ.ย. 2562 ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม โดยจะมีผลกระทบตามภาคต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562

ภาคเหนือ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย และเพชรบูรณ์

ภาคกลาง : จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี นครปฐม สุพรรณบุรี และสระบุรี


ภาคตะวันออก : จังหวัดจันทบุรี และตราด

ภาคใต้ : จังหวัดระนอง และพังงา

ทั้งนี้ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง

สำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 62

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 26 มิ.ย. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 27 มิ.ย. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.เขาค้อ	เพชรบูรณ์	84.0	ฝนตกหนัก
2.	อ.เนินมะปราง	พิษณุโลก	76.5	ฝนตกหนัก
3.	อ.เสาไห้	สระบุรี	67.5	ฝนตกหนัก
4.	อ.เมือง	บึงกาฬ	45.5	ฝนตกหนัก
5.	อ.ยะรัง	ปัตตานี	42.4	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.) (ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 37,775 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 13,850 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (45,886 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 8,111 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 42.03 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 110.84 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 38,293 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 35,833 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 12,291 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (42,981 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 7,148 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 30.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 97.73 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 35,093 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	9,462	38	2,717	15	75	1,001	410	41	312	35	83	25,825	9,872	38	3,029	16	15,953
ตอน.	12	8,368	2,808	34	1,157	17	218	1,998	635	32	489	26	230	10,367	3,443	33	1,646	19	6,924
กลาง	3	1,419	183	13	123	9	22	369	108	29	84	24	25	1,788	291	16	207	12	1,497
ตะวันตก	2	26,605	17,980	68	4,703	35	7	142	71	50	62	47	9	26,747	18,051	67	4,765	35	8,696
ตะวันออก	6	1,515	398	26	298	21	51	964	373	39	321	35	57	2,479	771	31	619	27	1,708
ใต้	4	8,194	5,003	61	3,293	51	39	668	345	52	293	48	43	8,863	5,348	60	3,585	51	3,514
รวม	35	70,926	35,833	51	12,291	26	412	5,142	1,942	38	1,559	33	447	76,069	37,775	50	13,850	27	38,293

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,226 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 37 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 2,530 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 14) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 5.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 45.37 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 15,645 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,260	39	1,460	15	0.00	2.81	25.00	23.00	8,202
สิริกิตี	3,727	39	877	13	4.90	1.90	18.03	18.16	5,783
ภูมิพล+สิริกิตี	8,987	39	2,337	14	4.90	4.71	43.03	41.16	13,985
แควน้อยฯ	165	18	122	14	0.10	0.00	1.30	1.30	774
ป่าสักชลสิทธิ์	74	8	71	7	0.00	0.00	1.04	1.04	886
รวมทั้งหมด	9,226	37	2,530	14	5.00	4.71	45.37	43.50	15,645

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 15 อ่างฯ ได้แก่ อ่างแม่กวัง อุดมธรา (23%) อ่างแควน้อยบำรุงแดน (18%) อ่างห้วยหลวง (24%) อ่างน้ำพุ (28%) อ่างอุบลรัตน์ (25%) อ่างลำปาว (30%) อ่างลำพระเพลิง (14%) อ่างมูลบน (30%) อ่างลำนางรอง (27%) อ่างป่าสักชลสิทธิ์ (8%) อ่างทับเสลา (24%) อ่างกระเสียว (23%) อ่างขุนด่านฯ (12%) อ่างคลองสียัด (13%) อ่างนฤปดินทรจินดา (20%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำมูล ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 349 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 388 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.22 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.98 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน + 15.20 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.28 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.51 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.51 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 157 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 155 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 120 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 30 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 7 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 6 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 6 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 62 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 12 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 19 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 170 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 171 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 18 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 60 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 70 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 22 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 78 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 75 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)								เกณฑ์	หมายเหตุ
		20 มิ.ย.	21 มิ.ย.	22 มิ.ย.	23 มิ.ย.	24 มิ.ย.	25 มิ.ย.	26 มิ.ย.	27 มิ.ย.		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแล จ.ปทุมธานี	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนายนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนากกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

3. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62

ทั้งประเทศ จำนวน 16.08 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.21 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 4.87 ล้านไร่

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 8.74 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.18 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 1.56 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562)

ทั้งประเทศ จำนวน 13.95 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.78 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 2.17 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.78 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 10.83 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 0.95 ล้านไร่) ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 8.25 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.71 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 0.54 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.39 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 7.58 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 0.13 ล้านไร่)

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2561/62			* สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2561/62						ข้าวรอบที่ 2		
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าว	% ข้าว	พืชไร่ พืชผัก	% พืชไร่ พืชผัก	รวม	% รวมทั้งหมด	พื้นที่ เก็บเกี่ยว	พื้นที่ เสียหาย	พื้นที่ รอ เก็บเกี่ยว
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	8.03	2.43	10.46	9.08	113.11	0.59	24.28	9.67	92.48	8.14	-	0.94
	นอกเขตชลประทาน	3.18	2.44	5.62	2.70	84.94	1.58	64.75	4.28	76.17	2.69	-	0.01
	รวม	11.21	4.87	16.08	11.78	105.12	2.17	44.56	13.95	86.78	10.83	-	0.95
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	5.30	0.77	6.07	6.03	113.77	0.08	10.39	6.11	100.66	5.90	-	0.13
	นอกเขตชลประทาน	1.88	0.79	2.67	1.68	89.36	0.46	58.23	2.14	80.15	1.68	-	-
	รวม	7.18	1.56	8.74	7.71	107.38	0.54	34.62	8.25	94.39	7.58	-	0.13

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 11 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ สระแก้ว สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16-26 มิถุนายน 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	น่าน (4) พะเยา (6) พิจิตร (5) ลำปาง (2) ลำพูน (1) สุโขทัย (4) อุตรดิตถ์ (2) เชียงราย (13) เชียงใหม่ (4) เพชรบูรณ์ (7) แพร่ (2) กำแพงเพชร (1) พิษณุโลก (2)
กลาง	ชัยนาท (1) นครสวรรค์ (7) ลพบุรี (7) สุพรรณบุรี (1) อ่างทอง (1) สระบุรี (3) อุทัยธานี (1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา (16) บุรีรัมย์ (3) ศรีสะเกษ (2) ขอนแก่น (15) มหาสารคาม (11) กาฬสินธุ์ (11) ชัยภูมิ (16) มุกดาหาร (2) ยโสธร (3) ร้อยเอ็ด (8) อำนาจเจริญ (3) สุรินทร์ (2) นครพนม (1) อุบลราชธานี (1)
ตะวันออก	จันทบุรี (2) ฉะเชิงเทรา (4) สระแก้ว (1) ชลบุรี (1) ปราจีนบุรี (1) ระยอง (1)
ใต้	ชุมพร (2) นครศรีธรรมราช (6) พัทลุง (8) สงขลา (4) สุราษฎร์ธานี (1) ราชบุรี (2)
รวม	รวม 44 จังหวัด (198 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย จำนวน 34 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	1	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ จ.พะเยา (เมืองพะเยา ดอกคำใต้ ปง)
2. ตาก	4	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.เพชรบูรณ์ (ชนแดน บึงสามพัน)
3. ลพบุรี	6	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี บ้านไร่ หนองขาหย่าง ห้วยคต สว่างอารมณ์ ท้าพัน หนองฉาง ลานสัก) จ.สระบุรี (ดอนพุด หนองโดน พระพุทธบาท เฉลิมพระเกียรติ แก่งคอย วังม่วง) จ.ชัยนาท (มโนรมย์ หนองมะโมง) จ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์ พยุหะคีรี โกรกพระ ท่าตะโก ไผ่ศาลี) จ.ลพบุรี (ท่าวัง เมืองลพบุรี พัฒนานิคม) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว
4. ราชบุรี	6	มีฝนตกเล็กน้อย บางแห่งบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ราชบุรี (เมือง สวนผึ้ง บ้านคา จอมบึง ปากท่อ โพธาราม บ้านโป่ง) จ.กาญจนบุรี (ท่ามะกา) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสำนังไม้เต็ง อ่างเก็บน้ำบ้านลานคา อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี
5. นครราชสีมา	2	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
6. ขอนแก่น	2	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
7. อุบลราชธานี	1	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
8. สุรินทร์	6	มีฝนตกเล็กน้อย เป็นบางแห่งบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์ (พลับพลาชัย เมือง) จ.สุรินทร์ (ปราสาท เมือง)
9. สระแก้ว	6	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา (ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต)
10. สุราษฎร์ธานี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้าสนามบินติดภารกิจซ่อม Hi Jack และช่วงบ่ายเมฆชั้นกลาง ขึ้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้า ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
11. สงขลา	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้าสนามบินติดภารกิจซ่อม Hi Jack และช่วงบ่ายเมฆชั้นกลาง ขึ้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้า ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 26 มิถุนายน 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 112 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 89.82 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 3,058 เที่ยวบิน (4,372:43 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม ยโสธร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตรัง ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส พัทลุง และสงขลา

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 98 เครื่อง ในพื้นที่ 19 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 50 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ อุดรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(16) น่าน(6) พะเยา(2) นครราชสีมา(2) สกลนคร(1) กาญจนบุรี(2) นครนายก(4) ปราจีนบุรี(8) ฉะเชิงเทรา(4) ระยอง(2)

- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 48 เครื่อง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย(2) นครราชสีมา(13) บุรีรัมย์(1) เลย(3) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(9) กาญจนบุรี(3)

6. ผลกระทบด้านการเกษตร

6.1 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งฯ แล้ว 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตรวดี ชลบุรี อุดรดิตถ์ พิจิตร เชียงราย สุโขทัย และจังหวัดน่าน จำนวน 40 อำเภอ 157 ตำบล 1,232 หมู่บ้าน เนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ได้ประกาศยุติสถานการณ์แล้วในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด 3 อ. (เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ เมืองสรวง) 3 ต. 14 ม. จ.นครราชสีมา 3 อ. (เฉลิมพระเกียรติ สูงเนิน พระทองคำ) 4 ต. 35 ม. จ.พิจิตร 1 อ. (สากเหล็ก) 4 ต. 17 ม. จ.สุโขทัย 3 อ. (สวรรคโลก ศรีนคร ศรีสนาลัย) 18 ต. 142 ม. จ.พิษณุโลก 3 อ. (วัดโบสถ์ ชาติตระการ เมืองฯ) 11 ต. 80 ม. จ.น่าน 1 อ. (เวียงสา) 1 ต. 2 ม. และ จ.อุดรดิตถ์ 1 อ. (ท่าปลา) 2 ต. 15 ม. และปิดสถานการณ์บางพื้นที่ จ.ตรวดี 2 อ. (เขาสมิง บ่อไร่) 21 ต. 141 ม. ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) จำนวน 5 จังหวัด 23 อำเภอ 93 ตำบล 786 หมู่บ้าน ดังนี้

จังหวัด	จำนวน			รายชื่ออำเภอที่ประกาศเขตฯ
	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	
1. เชียงราย	13	63	561	เมืองฯ (5ต. 40ม.) ป่าแดด (5ต. 58ม.) เชียงแสน (6ต. 70ม.) พญาเม็งราย (2ต. 2ม.) แม่สาย (5ต. 14ม.) พาน (13ต. 123ม.) เทิง (7ต. 124ม.) แม่จัน (9ต. 58ม.) เชียงของ (3ต. 14ม.) เวียงชัย (2ต. 20ม.) เวียงแก่น (1ต. 1ม.) ขุนตาล (3ต. 32ม.) ดอยหลวง (2ต. 5ม.)
2. ศรีสะเกษ	6	16	126	เมืองจันทร์ (1ต. 7ม.) ขุขันธ์ (4ต. 36ม.) ไพรบึง (1ต. 15ม.) ศรีรัตน (3ต. 29ม.) ขุนหาญ (4ต. 27ม.) โพธิ์ศรีสุวรรณ (3ต. 12ม.)
3. มหาสารคาม	2	11	79	วาปีปทุม (10ต. 69ม.) พยัคภูมิพิสัย (1ต. 10ม.)
4. ตรวดี	1	2	13	เมืองฯ (2ต. 13ม.)
5. ชลบุรี	1	1	7	เกาะสีชัง (1ต. 7ม.)
รวม 5 จังหวัด	23	93	786	
จากทั้งหมด 76 จังหวัด	878	7,255	75,032	
คิดเป็นร้อยละของประเทศ	2.62	1.28	1.05	

ผลกระทบด้านการเกษตร

ด้านพืช 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุดรดิตถ์ ตาก และน่าน เกษตรกร 24,089 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 139,060 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 41,401 ไร่ พืชไร่ 46,960 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 50,699 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 6 จังหวัด (พิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร ตาก และน่าน) เกษตรกร 6,661 ราย พื้นที่ 39,498 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 45.74 ล้านบาท (ผ่าน ก.ช.ภ.อ. แล้ว 12.73 ล้านบาท) ช่วยเหลือแล้ว 15.05 ล้านบาท

6.2 วาดภัย ช่วงภัย วันที่ 8 ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 34 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี แพร่ ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก เชียงใหม่ นครสวรรค์ ลำพูน เชียงราย น่าน ขอนแก่น หนองคาย เลย บึงกาฬ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ชัยนาท ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี และสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 12,093 ราย พื้นที่ 28,132 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,651 ไร่ พืชไร่ 15,150 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 11,330 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 29 จังหวัด เกษตรกร 4,127 ราย พื้นที่ 10,107 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 14.00 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 9.34 ล้านบาท

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.3 อุทกภัย ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา เกษตรกร 44 ราย พื้นที่ 475 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ 1 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 474 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.4 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) พะเยา (โรคราบอดหอมแดง) อุตรดิตถ์ (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) และเชียงราย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) เกษตรกร 1,356 ราย พื้นที่ 8,498 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,610 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 888 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 3 จังหวัด เกษตรกร 791 ราย พื้นที่ 1,678 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 2.38 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 1.45 ล้านบาท

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนกระทู้กล้าข้าว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สุรินทร์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ) จำนวน 13,024 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9,658 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนกระทู้กล้า เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีวเวอเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำเกษตรกรสำรวจแปลง และแนะนำใช้การตัดใบข้าว เก็บทำลาย และแนะนำให้ตัดหญ้าที่คันนาเพื่อป้องกันกำจัดเพื่อลดปริมาณของหนอนกระทู้กล้าข้าว
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไรแดง 3. แมลงนูนหลวง 4. เพลี้ยหอย 5. โรคโคนเน่าหัวเน่า 6. โรคพุ่มแจ้	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ลพบุรี ระยอง ชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี และนครราชสีมา) จำนวน 582 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กาญจนบุรี จันทบุรี สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และนครราชสีมา) จำนวน 10,594 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 250 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 145 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา จันทบุรี สระแก้ว และชลบุรี) จำนวน 577 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 7 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 519 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาด และหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ผลิตขยายแตนเบียน (<i>Anagrus lopheus</i>) แลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน หว่านปูนขาวหรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มา บริเวณรอบโคนต้นที่แสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าที่ขุดออกหรือกรณีระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีฟอสฟิธิล อลูมิเนียม - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกกลลงในพื้นดิน - นำแมลงช้างปีกใสปล่อยในพื้นที่ระบาด เพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงที่พบการระบาดของไรแดงอย่างสม่ำเสมอ และให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลัง ในช่วงที่ต้นอ่อนจะกระทบแล้งนาน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	7. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พบอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สระแก้ว นครราชสีมา สุรินทร์ ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ ชลบุรี) จำนวน 9,983.5 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7,354.50 ไร่	- ให้เกษตรกรสำรวจติดตามการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เมื่อพบต้นที่แสดงอาการให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจในห้องปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งดำเนินการทำลายต้นที่แสดงอาการอื่นๆ ทั้งจากแปลงปลูกตามมาตรการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ดั้วหนวดยาว 3. แมลงนูนหลวง 4. จักจั่น 5. หนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด 6. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) จำนวน 50 ไร่ การระบาดลดลง 400 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 60 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 160 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 1,453 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 420 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 70 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และดั้วหนวดยาว และใช้เชื้อราบีเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุมโดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ราชบุรี และพะเยา) จำนวน 25 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่ พบการระบาดในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 291,356 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 136,267 ไร่	- แจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทุ้ง fall armyworm ให้เกษตรกรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง - จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และภูเก็ต) จำนวน 448 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและซุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จำนวน 5,268 ไร่ การระบาดลดลง 311 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด จำนวน 40,950 ไร่ การระบาดลดลง 14,819 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด จำนวน 10,281 ไร่ การระบาดลดลง 264 ไร่	- ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ ตัดทางใบหรือยอดที่ถูกศัตรูพืชทำลายมาเผาทิ้ง เก็บไข่หนอน และตัวเต็มวัยไปทำลาย เพื่อไม่ให้แหล่งแพร่พันธุ์ของศัตรูมะพร้าว - ปลอยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับดั้วแรดและดั้วงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>)
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก 3. หนอนหน้าแมว 4. ดั้วแรด 5. ดั้วกุหลาบ 6. หนู 7. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 57 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จำนวน 844 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 77 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 140 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กระบี่) จำนวน 45 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันโดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดำ หนอนปลอกเล็ก และหนอนหน้าแมวทำลายมาเผาทิ้ง กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้แหล่งแพร่พันธุ์ - ปลอยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำและหนอนปลอกเล็กในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับดั้วแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) และใช้กับดักแสงไฟล่อหนอนหน้าแมวในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกทำลายระดับรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซพวิน 85% ดับบลิวพี) พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			- ให้เกษตรกรใช้กับดักล่อหนูตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง และใช้เหยื่อโปรโตซัวกำจัดหนู - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาในบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรครากขาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จำนวน 1,119 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ให้เกษตรกรขุดล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา - ให้เกษตรกรนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมกับปุ๋ยหมัก ใช้ในสวนยางพาราและทาในบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีฟิโพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น ไร่บริเวณที่เป็นโรครากขาวยางพารา
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนเจาะผล 3. เพลี้ยแป้ง 4. เพลี้ยไก่แจ้ 5. โรครากเน่าโคนเน่า 6. โรคราดำ 7. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 2 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 1 ไร่ ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และตราด) จำนวน 10,371 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 6 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่</u>	- ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ สังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการทำลายของหนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะผล เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด - กำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่อง ในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตักถี่พันหลวมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง - แหล่งที่มีการระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึมให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้งห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน - ตัดแต่งผลทุเรียนไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกัน และใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย และควรเริ่มห่อผลทุเรียนตั้งแต่มีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปด้วยถุงมุ้งไนลอน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่เจาะรูบริเวณขอบล่าง เพื่อให้ให้น้ำระบายออกมาได้ - หากระบาดรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทำลายของหนอนเจาะผลสำหรับในแหล่งที่มีการระบาด ให้พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน โดยพ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ขุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลายแล้วทาผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำและโรคใบไหม้ทุกๆ 3-7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลาม
เงาะ	1. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนเงาะอย่างสม่ำเสมอ ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อลดความชื้นภายในทรงพุ่ม ตัดส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลาย และเก็บรวบรวมใบที่เป็นโรคและร่วงหล่นในบริเวณสวนไปเผาทำลาย - เมื่อพบใบแก่ถูกทำลายมากกว่าร้อยละ 30 ตัดต้นแนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 85% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้น หรือใช้พ่นป้องกันเป็นระยะๆ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 - 23 มิ.ย. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 23 มิ.ย. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 47 จังหวัด 316 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 31 จุด ในพื้นที่ 16 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว นครราชสีมา ยโสธร สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เพชรบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 76,377 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 4,449 ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 8 - 14 มิ.ย. 62) เกิดโรคในสุนัข 14 ครั้ง ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง นครราชสีมา ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

8.2 โรคแท้งติดต่อ (ช่วงวันที่ 8 - 14 มิ.ย. 62) เกิดโรค 2 ครั้ง ในโคเนื้อและแกะ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 จังหวัดสระแก้ว และในโคเนื้อ ในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.3 โรคอหิวาต์สุกร (ช่วงวันที่ 8 - 14 มิ.ย. 62) เกิดในสุกร 1 ครั้ง ในพื้นที่เขตปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงราย

8.4 มีรายงานโรคระบาดสัตว์อื่นๆ คือ โรคโลหิตจางติดเชื้อ เกิดในม้า 1 ครั้ง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดลำพูน

8.5 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

8.6 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 8 - 14 มิ.ย. 62) พบการระบาด 3 โรค ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 26 ครั้ง
 - ในหมูป่า 1 ครั้ง ที่ประเทศเบลเยียม
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศจีน
 - ในหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศฮังการี
 - ในหมูป่า 1 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย
 - ในสุกรและหมูป่า 5 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์
 - ในสุกรและหมูป่า 11 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
 - ในสุกร 2 ครั้ง ที่ประเทศแอฟริกาใต้
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศเวียดนาม
- โรค Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis ในกิ้งขาว 1 ครั้ง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- โรค Leishmaniosis ในสุนัข 1 ครั้ง ที่ประเทศสิงคโปร์