



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 14 มิถุนายน 2562


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนน้อยในระยะนี้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก เลย หนองคาย อุดรธานี จันทบุรี และตราด สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเล อันดามัน ตอนบน และประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้ มีฝนน้อยในระยะนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 13 มิ.ย. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 14 มิ.ย. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	56.5	ฝนตกหนัก
2.	อ.โซ่พิสัย	บึงกาฬ	54.5	ฝนตกหนัก
3.	อ.เกาะช้าง	ตราด	46.5	ฝนตกหนัก
4.	อ.ศรีวิไล	บึงกาฬ	45.5	ฝนตกหนัก
5.	อ.ไม้แก่น	ปัตตานี	45.2	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 38,743 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 14,817 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (45,489 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 6,746 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 39.05 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 93.92 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 37,326 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 36,774 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 13,232 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (42,549 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 5,775 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 45.23 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 103.78 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 34,152 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	10,035	40	3,290	18	75	1,001	415	41	317	35	83	25,825	10,450	40	3,607	19	15,376
ตอน.	12	8,368	2,838	34	1,188	18	218	1,998	654	33	507	27	230	10,367	3,492	34	1,695	20	6,874
กลาง	3	1,419	199	14	139	10	22	369	109	30	85	25	25	1,788	308	17	224	13	1,480
ตะวันตก	2	26,605	18,210	68	4,933	37	7	142	73	51	64	48	9	26,747	18,283	68	4,997	37	8,465
ตะวันออก	6	1,515	406	27	307	22	51	964	362	38	310	34	57	2,479	768	31	616	26	1,711
ใต้	4	8,194	5,086	62	3,376	52	39	668	356	53	303	49	43	8,863	5,442	61	3,679	52	3,421
รวม	35	70,926	36,774	52	13,232	28	412	5,142	1,969	38	1,585	33	447	76,069	38,743	51	14,817	28	37,326

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แคว้นน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,805 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 3,109 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 17) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 4.94 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 42.21 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 15,066 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,567	41	1,767	18	0.00	3.32	20.00	18.00	7,895
สิริกิตี	3,964	42	1,114	17	4.44	6.31	19.87	16.91	5,546
ภูมิพล+สิริกิตี	9,531	41	2,881	18	4.44	9.63	39.87	34.91	13,441
แคว้นน้อยฯ	183	19	140	16	0.50	0.00	1.30	1.30	756
ป่าสักชลสิทธิ์	91	9	88	9	0.00	0.00	1.04	1.04	869
รวมทั้งหมด	9,805	39	3,109	17	4.94	9.63	42.21	37.25	15,066

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 12 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯแม่กวังอุดมธารา (22%) อ่างฯแคว้นน้อยบำรุงแดน (19%) อ่างฯห้วยหลวง (23%) อ่างฯอุบลรัตน์ (25%) อ่างฯลำปาว (30%) อ่างฯลำพระเพลิง (14%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (9%) อ่างฯทับเสลา (24%) อ่างฯกระเสียว (23%) อ่างฯขุนด่านฯ (12%) อ่างฯคลองสิียด (14%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (19%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำมูล ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ
แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 304 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 346 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.03 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.17 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.18 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.42 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.64 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.64 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 132 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 141 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 95 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 30 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 7 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 10 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 10 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 52 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 53 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลา) 8 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 30 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 178 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 197 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 19 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 55 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 85 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 19 ลบ.ม./วินาที

อบางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 83 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 82 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)								เกณฑ์	หมายเหตุ
		7 มิ.ย.	8 มิ.ย.	9 มิ.ย.	10 มิ.ย.	11 มิ.ย.	12 มิ.ย.	13 มิ.ย.	14 มิ.ย.		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนายนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.23	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนากกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.26	0.24	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

3. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62

ทั้งประเทศ จำนวน 16.08 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.21 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 4.87 ล้านไร่

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 8.74 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.18 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 1.56 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562)

ทั้งประเทศ จำนวน 13.89 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.72 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 2.17 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.40 ของแผน (ข้าว เกือบเกี่ยวแล้ว 10.74 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 0.98 ล้านไร่) ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 8.25 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.71 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 0.54 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.39 ของแผน (ข้าว เกือบเกี่ยวแล้ว 7.58 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 0.13 ล้านไร่)

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2561/62			* สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2561/62						ข้าวรอบที่ 2		
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าว	% ข้าว	พืชไร่ พืชผัก	% พืชไร่ พืชผัก	รวม	% รวมทั้งหมด	พื้นที่ เก็บเกี่ยว	พื้นที่ เสียหาย	พื้นที่รอ เก็บเกี่ยว
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	8.03	2.43	10.46	9.02	112.37	0.59	24.28	9.61	91.90	8.06	-	0.96
	นอกเขตชลประทาน	3.18	2.44	5.62	2.70	84.91	1.58	64.75	4.28	76.16	2.68	-	0.02
	รวม	11.21	4.87	16.08	11.72	104.58	2.17	44.56	13.89	86.40	10.74	-	0.98
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	5.30	0.77	6.07	6.03	113.77	0.08	10.39	6.11	100.66	5.90	-	0.13
	นอกเขตชลประทาน	1.88	0.79	2.67	1.68	89.36	0.46	58.23	2.14	80.15	1.68	-	-
	รวม	7.18	1.56	8.74	7.71	107.38	0.54	34.62	8.25	94.39	7.58	-	0.13

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 10 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สระแก้ว อำเภอดำรงวิทยารอสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1-13 มิถุนายน 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ตาก (4) น่าน (3) พิจิตร (4) ลำปาง (4) ลำพูน (1) สุโขทัย (9) อุตรดิตถ์ (3) เชียงราย (14) เชียงใหม่ (3) เพชรบูรณ์ (4) แพร่ (1) พะเยา (1)
กลาง	นครสวรรค์ (2) ลพบุรี (4) สระบุรี (1) สุพรรณบุรี (1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา (3) สุรินทร์ (3) ขอนแก่น (1) บุรีรัมย์ (2) มหาสารคาม (1) ร้อยเอ็ด (20) หนองบัวลำภู (1) ชัยภูมิ (1) กาฬสินธุ์ (1) ศรีสะเกษ (2) อุบลราชธานี (3) สกลนคร (1) อุดรธานี (1)
ตะวันออก	จันทบุรี (2) ฉะเชิงเทรา (1) สระแก้ว (2) ปราจีนบุรี (1)
ใต้	ชุมพร (2) นครศรีธรรมราช (6) สงขลา (3) สุราษฎร์ธานี (1)
รวม	รวม 37 จังหวัด (117 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 10 หน่วย จำนวน 13 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมในระดับปฏิบัติการมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับมีเมฆแผ่ปกคลุม โดยทั่วไปตลอดวันและมีฝนตกเป็นระยะในพื้นที่เป้าหมายและบริเวณสนามบิน
2. ตาก	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมในระดับปฏิบัติการมีกำลังแรงและมีเมฆชั้นกลาง-สูงปกคลุม เป็นส่วนมาก ทำให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายมีการพัฒนาตัวเล็กน้อยและสลายตัวอย่างรวดเร็ว
3. ลพบุรี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมชั้นบนที่ระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง (23 kts) และมีเมฆชั้นกลาง ปกคลุมทั่วไป ส่งผลให้กลุ่มเมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
4. ราชบุรี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมชั้นบนมีกำลังแรงและมีฝนตกเป็นระยะๆ บริเวณสนามบิน
5. นครราชสีมา	5	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (วังน้ำเขียว ทรายมูล) พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา (วังน้ำเขียว) เขื่อนลำนูนบอน เขื่อนลำแชะ จ.นครราชสีมา (ทรายมูล)
6. ขอนแก่น	2	มีฝนเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และพื้นที่การเกษตร จ.ชัยภูมิ (เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว แก้งคร้อ บ้านแท่น) จ.ขอนแก่น (หนองเรือ ภูผาคีรี บ้านฝาง พระยืน)
7. สระแก้ว	6	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา (ท่าตะเกียบ) จ.สระแก้ว (ตาพระยา โคกสูง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน
8. หัวหิน	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมชั้นบนมีกำลังแรงและมีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ ตลอดทั้งวัน ส่งผลให้กลุ่มเมฆมีความชื้นในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
9. สุราษฎร์ธานี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมชั้นบนมีกำลังแรง ประกอบกับอากาศทรงตัว ส่งผลให้เมฆมีความชื้น ในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
10. สงขลา	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสนามบินติดภารกิจ VIP

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 13 มิถุนายน 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 99 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 90.31 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 2,721 เที่ยวบิน (3,899:54 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม ยโสธร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส พัทลุง และสงขลา

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/62 จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 83 เครื่อง ในพื้นที่ 16 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 30 เครื่อง ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(16) น่าน(6) พะเยา(2) นครราชสีมา(2) สกลนคร(1)

- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 53 เครื่อง ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย(1) เชียงราย(2) นครราชสีมา(13) บุรีรัมย์(1) เลย(3) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(9) กาญจนบุรี(3) ราชบุรี(4)

6. ผลกระทบด้านการเกษตร

6.1 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งฯ แล้ว 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตรวดี อุตรดิตถ์ พิจิตร เชียงราย และจังหวัดสุโขทัย จำนวน 39 อำเภอ 156 ตำบล 1,230 หมู่บ้าน เนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ได้ประกาศยุติสถานการณ์แล้วในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด 3 อ. (เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ เมืองสรวง) 3 ต. 14 ม. จ.นครราชสีมา 3 อ. (เฉลิมพระเกียรติ สูงเนิน พระทองคำ) 4 ต. 35 ม. และ จ.พิจิตร 1 อ. (สากเหล็ก) 4 ต. 17 ม. ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) จำนวน 8 จังหวัด 30 อำเภอ 124 ตำบล 1,023 หมู่บ้าน ดังนี้

จังหวัด	จำนวน			รายชื่ออำเภอที่ประกาศเขตฯ
	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	
1. พิษณุโลก	3	11	80	วัดโบสถ์ (4ต. 37ม.) ขาดิระการ (5ต. 38ม.) เมืองฯ (2ต. 5ม.)
2. อุตรดิตถ์	1	2	15	ท่าปลา (2ต. 15ม.)
3. เชียงราย	13	63	561	เมืองฯ (5ต. 40ม.) ป่าแดด (5ต. 58ม.) เชียงแสน (6ต. 70ม.) พญาเม็งราย (2ต. 2ม.) แม่สาย (5ต. 14ม.) พาน (13ต. 123ม.) เทิง (7ต. 124ม.) แม่จัน (9ต. 58ม.) เชียงของ (3ต. 14ม.) เวียงชัย (2ต. 20ม.) เวียงแก่น (1ต. 1ม.) ขุนตาล (3ต. 32ม.) ดอยหลวง (2ต. 5ม.)
4. สุโขทัย	3	18	142	สวรรคโลก (12ต. 102ม.) ศรีนคร (5ต. 31ม.) ศรีสนาลัย (1ต. 9ม.)
5. ศรีสะเกษ	6	16	126	เมืองจันทร์ (1ต. 7ม.) ขุขันธ์ (4ต. 36ม.) ไพรบึง (1ต. 15ม.) ศรีรัตน (3ต. 29ม.) ขุนหาญ (4ต. 27ม.) โพธิ์ศรีสุวรรณ (3ต. 12ม.)
6. มหาสารคาม	2	11	79	วาปีปทุม (10ต. 69ม.) พัทธภูมิพิสัย (1ต. 10ม.)
7. ตรวดี	3	23	154	เขาสมิง (8ต. 66ม.) บ่อไร่ (5ต. 27ม.) เมืองฯ (10ต. 61ม.)
8. ชลบุรี	1	1	7	เกาะสีชัง (1ต. 7ม.)
รวม 8 จังหวัด	30	124	1,023	
จากทั้งหมด 76 จังหวัด	878	7,255	75,032	
คิดเป็นร้อยละของประเทศ	3.42	1.71	1.36	

ผลกระทบด้านการเกษตร

ด้านพืช 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และเชียงราย เกษตรกร 24,018 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 138,963 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 41,401 ไร่ พืชไร่ 46,960 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 50,602 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 5 จังหวัด (พิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร และตาก) เกษตรกร 6,082 ราย พื้นที่ 39,071 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 45.13 ล้านบาท (ผ่าน ก.ช.ภ.อ. แล้ว 11.97 ล้านบาท)

6.2 วาตภัย ช่วงภัย วันที่ 8 ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 34 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี แพร่ ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก เชียงใหม่ นครสวรรค์ ลำพูน เชียงราย น่าน ขอนแก่น หนองคาย เลย บึงกาฬ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี ตรวดี ปราจีนบุรี ชัยนาท ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี และสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 11,957 ราย พื้นที่ 28,040 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,651 ไร่ พืชไร่ 15,146 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 11,243 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 28 จังหวัด เกษตรกร 3,780 ราย พื้นที่ 9,897 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 13.62 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 7.85 ล้านบาท

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.3 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) พะเยา (โรคราบาดหอมแดง) อุตรดิตถ์ (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) และเชียงราย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) เกษตรกร 1,196 ราย พื้นที่ 7,940 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,052 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 888 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 3 จังหวัด เกษตรกร 743 ราย พื้นที่ 1,406 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 2.08 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 1.45 ล้านบาท

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิ.ย. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	ไม่พบการระบาดของศัตรูข้าว	ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไธแดง 3. แมลงนูนหลวง 4. เพลี้ยหอย 5. โรคโคนเน่าหัวเน่า 6. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ระยอง ชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี และนครราชสีมา) จำนวน 532 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 318 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จันทบุรี สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และนครราชสีมา) จำนวน 4,356 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2,866 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 155 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา จันทบุรี สระแก้ว และชลบุรี) จำนวน 693 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 297 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 7 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พบอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สระแก้ว และนครราชสีมา) จำนวน 2,611 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาด และหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ผลิตขยายแตนเบียน (<i>Anagyrus lopezi</i>) แผลงข้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน หวานปูนขาวหรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่แสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าที่ขุดออกหรือกรณีระบาดรุนแรงมาก ให้ใช้สารเคมีฟอสฟิทธิลอลูมิเนียม - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน - นำแมลงข้างปีกใสปล่อยในพื้นที่ระบาด เพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง - จัดทำแผนการอบรมเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดการระบาดและการป้องกันการระบาดของโรคใบด่าง
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนวดยาว 3. แมลงนูนหลวง 4. จักจั่น 5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 6. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ลพบุรี) จำนวน 450 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 100 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 220 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 1,033 ไร่ การระบาดลดลง 503 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 70 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักด้ และตัวหนวดยาว และใช้เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุมโดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูกาลปลูกต่อไป และให้เกษตรกรเฝ้าดินชุดต่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 1,487 ไร่ พบการระบาดในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 122,816 ไร่ การระบาดลดลง 7,539 ไร่	- แจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ให้เกษตรกรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง - จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และภูเก็ต) จำนวน 448 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 12 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและขุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรค
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ตัวแรด	พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด จำนวน 5,536 ไร่ การระบาดลดลง 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด จำนวน 55,889 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด จำนวน 10,492 ไร่ การระบาดลดลง 70 ไร่	- ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ ตัดทางใบหรือยอดที่ถูกศัตรูพืชทำลายมาเผาทิ้ง เก็บไข่หนอน และตัวเต็มวัยไปทำลาย เพื่อไม่ให้แหล่งแพร่พันธุ์ของศัตรูมะพร้าว

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			- ปลอยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงค้ำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดและด้วงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>)
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก 3. หนอนหน้าแมว 4. ด้วงแรด 5. ด้วงกุหลาบ 6. หนู 7. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 17 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 57 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 20 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จำนวน 844 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 77 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 140 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กระบี่) จำนวน 45 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันโดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดำ หนอนปลอกเล็ก และหนอนหน้าแมวทำลายมาเผาทิ้ง กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปลอยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำและหนอนปลอกเล็กในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) และใช้กับดักแสงไฟล่อหนอนหน้าแมวในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ตันปาล์มน้ำมันที่ถูกทำลายระดับรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ให้เกษตรกรใช้กับดักล่อหนูตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง และใช้เยื่อโปรโตชีวกำจัดหนู - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาในบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรคราขาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จำนวน 1,116 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่	- ให้เกษตรกรชุดคลุมบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรคราขาวยางพารา - ให้เกษตรกรนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมกับปุ๋ยหมักใช้ในสวนยางพาราและทาในบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรคราขาวยางพารา - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีโพรฟิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้นราดบริเวณที่เป็นโรคราขาวยางพารา
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนเจาะผล 3. เพลี้ยไฟ 4. เพลี้ยแป้ง 5. เพลี้ยไก่แจ้ 6. โรครากเน่าโคนเน่า 7. โรคราดำ 8. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 2 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> ไม่พบพื้นที่ระบาดในสัปดาห์นี้ <u>การระบาดลดลง</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 3 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และชุมพร) จำนวน 10,582 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 62 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 7 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ สังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการทำลายของหนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะผล เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด - กำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตักพื้นหลุมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง - แหล่งที่มีการระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึมให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้งห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน - ตัดแต่งผลทุเรียนไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกัน และใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย และควรเริ่มห่อผลทุเรียนตั้งแต่มีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปด้วยถุงมุ้งลอน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่เจาะรูบริเวณขอบล่างเพื่อให้มีน้ำระบายออกมาได้

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			- หากระบาดรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารแลมบ์ดา - ไซยาโลทริน 2.5% อีซี หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทำลายของหนอนเจาะผลสำหรับในแหล่งที่มีการระบาด ให้พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน โดยพ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน - ให้ตัดส่วนที่เพลี้ยแป้งและเพลี้ยไก่แจ้ทำลายไปทำลายนอกแปลง หากรุนแรงให้พ่นเชื้อราบีวเวอเรียเดิมสารจับใบ โดยพ่นทุก 7 วัน ติดต่อกัน 2 - 3 ครั้ง ในช่วงเย็น อากาศไม่ร้อน ทิ้งทั้งบนใบและใต้ใบทุเรียน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ขุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลายแล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำ และโรคใบไหม้ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่นๆ
เงาะ	1. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนเงาะอย่างสม่ำเสมอ ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อลดความชื้นภายในทรงพุ่ม ตัดส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลาย และเก็บรวบรวมใบที่เป็นโรคและร่วงหล่นในบริเวณสวนไปเผาทำลาย - เมื่อพบใบแก่ถูกทำลายมากกว่าร้อยละ 30 ตัดต้นแนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้น หรือใช้พ่นป้องกันเป็นระยะๆ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 12 มิ.ย. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 12 มิ.ย. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 47 จังหวัด 309 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 30 จุด ในพื้นที่ 15 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เพชรบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และสตูล

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 65,491 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 4,308 ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 25 – 31 พ.ค. 62) เกิดโรคในสุนัข 8 ครั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง สุรินทร์ กาฬสินธุ์ สมุทรสาคร และจังหวัดสงขลา

8.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 25 – 31 พ.ค. 62) พบการระบาดในกระบือ 1 ครั้ง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 จังหวัด จังหวัดสงขลา

8.3 โรค布鲁เซลเลซิส (ช่วงวันที่ 25 – 31 พ.ค. 62) เกิดโรคในแพะ 1 ครั้ง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 จังหวัด จังหวัดสตูล

8.4 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และโรคระบาดสัตว์อื่นๆ ในสัปดาห์นี้

8.5 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 25 – 31 พ.ค. 62) พบการระบาด 3 โรค ดังนี้

- โรคคอตีบแอฟริกาในสุกร 14 ครั้ง
 - ในหมูป่า 3 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์
 - ในสุกรและหมูป่า 7 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศแอฟริกาใต้
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศเบลเยียม
- โรค Pullorum disease ในนก ที่ประเทศเดนมาร์ก
- โรคปากและเท้าเปื่อย ในโค ที่ประเทศมาลาวี