



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยในระยะนี้ โดยภาคเหนือตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง มีการกระจายของฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยในระยะนี้

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 11 ก.ค 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 12 ก.ค. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.เมือง	ยะลา	51.9	ฝนตกหนัก
2.	อ.เมือง	อุดรธานี	10.4	ฝนตกปานกลาง
3.	อ.กลาง	ภูเก็ต	8.3	ฝนตกเล็กน้อย
4.	อ.เมือง	แม่ฮ่องสอน	7.4	ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 36,937 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 13,017 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 25) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (46,142 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 9,205 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 60.11 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 125.54 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 39,131 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 35,046 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 11,506 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (43,290 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 8,244 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 51.52 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 110.52 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 35,880 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	8,773	35	2,028	11	75	1,001	375	37	278	31	83	25,825	9,148	35	2,306	12	16,678
ตอน.	12	8,368	2,704	32	1,056	16	218	1,998	598	30	452	24	230	10,367	3,302	32	1,508	18	7,064
กลาง	3	1,419	162	11	102	8	22	369	109	30	85	25	25	1,788	271	15	188	11	1,516
ตะวันตก	2	26,605	18,088	68	4,811	36	7	142	68	48	59	45	9	26,747	18,156	68	4,870	36	8,591
ตะวันออก	6	1,515	418	28	319	23	51	964	404	42	352	39	57	2,479	822	33	670	29	1,657
ใต้	4	8,194	4,901	60	3,190	49	39	668	337	50	285	46	43	8,863	5,238	59	3,475	49	3,625
รวม	35	70,926	35,046	49	11,506	24	412	5,142	1,891	37	1,511	32	447	76,069	36,937	49	13,017	25	39,131

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,561 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 1,865 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 10) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 9.02 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 42.20 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,310 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	4,863	36	1,063	11	4.36	0.00	22.00	22.00	8,599
สิริกิตี	3,486	37	636	10	4.29	2.69	18.20	18.11	6,024
ภูมิพล+สิริกิตี	8,349	36	1,699	10	8.65	2.69	40.20	40.11	14,623
แควน้อยฯ	157	17	114	13	0.37	0.73	1.30	1.30	782
ป่าสักชลสิทธิ์	56	6	53	5	0.00	0.00	0.70	0.70	904
รวมทั้งหมด	8,561	34	1,865	10	9.02	3.42	42.20	42.11	16,310

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 14 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯแม่กง อุดมธรา (20%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (17%) อ่างฯห้วยหลวง (23%) อ่างฯน้ำพุง (22%) อ่างฯอุบลรัตน์ (24%) อ่างฯลำปาว (28%) อ่างฯลำพระเพลิง (15%) อ่างฯลำนางรอง (23%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (6%) อ่างฯทับเสลา (24%) อ่างฯกระเสียว (23%) อ่างฯขุนด่านฯ (15%) อ่างฯคลองสิียด (14%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (22%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 318 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 358 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.09 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.11 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.49 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.65 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.38 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.38 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 137 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 151 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 101 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 31 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 5 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 6 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 6 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 55 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 65 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลา) 6 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 20 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 148 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 165 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุม (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุม) 23 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 51 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 56 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 18 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 66 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 67 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)										เกณฑ์	หมายเหตุ
		4 ก.ค.	5 ก.ค.	6 ก.ค.	7 ก.ค.	8 ก.ค.	9 ก.ค.	10 ก.ค.	11 ก.ค.	12 ก.ค.			
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแล จ.ปทุมธานี	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร	
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.23	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	ปกติ		
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.24	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.24	ปกติ		

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

3. การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562/63

พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 จำนวน 58.99 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562)

จำนวน 13.24 ล้านไร่ รวม 67 จังหวัด แบ่งเป็น ในเขตชลประทาน 62 จังหวัด ปลูกข้าว 6.60 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 59 จังหวัด ปลูกข้าว 6.64 ล้านไร่

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 11 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิชณุโลก ตาก กาญจนบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ สระแก้ว และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1-11 กรกฎาคม 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร (2) ตาก (2) น่าน (8) พะเยา (8) พิจิตร (12) พิชณุโลก (1) ลำพูน (1) ลำปาง (13) เชียงราย (18) อุดรดิตถ์ (2) เพชรบูรณ์ (11) เชียงใหม่ (7) แพร่ (8) สุโขทัย (4)
กลาง	ชัยนาท (1) นครสวรรค์ (7) ลพบุรี (6) สระบุรี (3) สุพรรณบุรี (2) อ่างทอง (1) อุทัยธานี (4)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์ (2) ขอนแก่น (14) ชัยภูมิ (2) นครราชสีมา (14) บุรีรัมย์ (23) ยโสธร (9) ร้อยเอ็ด (20) ศรีสะเกษ (7) สุรินทร์ (18) หนองบัวลำภู (4) อำนาจเจริญ (7) อุบลราชธานี (4) มหาสารคาม (6) อุดรธานี (1) เลย (10) มุกดาหาร (1)
ตะวันออก	ชลบุรี (1) ระยอง (1) สระแก้ว (3) ฉะเชิงเทรา (3) ปราจีนบุรี (1)
ใต้	ชุมพร (3) นครศรีธรรมราช (13) พัทลุง (8) สงขลา (4) สุราษฎร์ธานี (2)
รวม	รวม 47 จังหวัด (302 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย จำนวน 35 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	1	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ จ.เชียงใหม่ (แม่แจ่ม)
2. พิชณุโลก	5	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กำแพงเพชร (คลองลาน ปางศิลาทอง ขามเฒ่าลักษณะบุรี)
3. ตาก	3	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.เชียงใหม่ (ฮอด ดอยเต่า) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล ตอนล่าง
4. กาญจนบุรี	9	มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.อุทัยธานี (บ้านไร่)
5. ลพบุรี	1	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.อุทัยธานี (สว่างอารมณ์ ท้าทัน) จ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์ ลาดยาว โกรกพระ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา
6. นครราชสีมา	1	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
7. ขอนแก่น	4	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น (มัญจาคีรี บ้านแฮด) จ.ชัยภูมิ (แก้งคร้อ) และ จ.เลย (เมืองเลย)
8. อุบลราชธานี	2	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.อุบลราชธานี (สำโรง น้ำขุ่น ทุ่งศรีอุดม น้ำยืน เดชอุดม บุนทริก) จ.ศรีสะเกษ (โนนคูณ เบญจลักษณ์ น้ำเกลี้ยง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิรินธร
9. สุรินทร์	6	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ศรีสะเกษ (ไพรบึง ชูขันธ)
10. สระแก้ว	2	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ จ.สระแก้ว (ตาพระยา)
11. สุราษฎร์ธานี	1	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งและพื้นที่การเกษตร จ.นครศรีธรรมราช (ชะอวด เขียวใหญ่ ร่อนพิบูลย์) จ.พัทลุง (ควนขนุน ป่าพะยอม)

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม - 11 กรกฎาคม 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 125 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 88.88 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 3,329 เที่ยวบิน (4,765:43 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 59 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิชณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนราธิวาส

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 116 เครื่อง ในพื้นที่ 23 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 65 เครื่อง ในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(1) แม่ฮ่องสอน(1) อุตรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(16) น่าน(6) พะเยา(2) นครราชสีมา(7) สกลนคร(1) อำนาจเจริญ(4) นครพนม(4) ยโสธร(3) กาญจนบุรี(2) นครนายก(4) ปราจีนบุรี(7) ฉะเชิงเทรา(3) ระยอง(1)

- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 51 เครื่อง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย(2) นครราชสีมา(15) บุรีรัมย์(2) เลย(3) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(9) กาญจนบุรี(3)

6. ผลกระทบด้านการเกษตร

6.1 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งแล้ว 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตรด ชลบุรี อุตรดิตถ์ พิจิตร เชียงราย สุโขทัย น่าน และจังหวัดตาก จำนวน 42 อำเภอ 170 ตำบล 1,324 หมู่บ้าน เนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ได้ประกาศยุติสถานการณ์แล้วในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด 3 อ. (เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ เมืองสงวน) 3 ต. 14 ม. จ.นครราชสีมา 3 อ. (เฉลิมพระเกียรติ สูงเนิน พระทองคำ) 4 ต. 35 ม. จ.พิจิตร 1 อ. (สากเหล็ก) 4 ต. 17 ม. จ.สุโขทัย 3 อ. (สวรรคโลก ศรีนคร ศรีสนาลัย) 18 ต. 142 ม. จ.พิษณุโลก 3 อ. (วัดโบสถ์ ชาติตระการ เมืองฯ) 11 ต. 80 ม. จ.น่าน 1 อ. (เวียงสา) 1 ต. 2 ม. จ.อุตรดิตถ์ 1 อ. (ท่าปลา) 2 ต. 15 ม. จ.ตรด 3 อ. (เขาสมิง บ่อไร่ เมืองฯ) 23 ต. 154 ม. จ.เชียงราย 13 อ. (เมืองฯ ป่าแดด เชียงแสน พญาเม็งราย แม่สาย พวน เทิง แม่จัน เชียงของ เวียงชัย เวียงแก่น ขุนตาล ดอยหลวง) 63 ต. 561 ม. และ จ.ชลบุรี 1 อ. (เกาะสีชัง) 1 ต. 7 ม. และ จ.ศรีสะเกษ 6 อ. (เมืองจันทร์ ศรีรัตนะ ขุขันธ์ ไพรบึง โพธิ์ศรีสุวรรณ ขุนหาญ) 16 ต. 126 ม. ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) จำนวน 2 จังหวัด 4 อำเภอ 24 ตำบล 171 หมู่บ้าน ดังนี้

จังหวัด	จำนวน			รายชื่ออำเภอที่ประกาศเขตฯ
	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	
1. ตาก	2	13	92	เมือง (10ต. 66ม.) วังเจ้า (3ต. 26ม.)
2. มหาสารคาม	2	11	79	วาปีปทุม (10ต. 69ม.) พัทธภูมิพิสัย (1ต. 10ม.)
รวม 2 จังหวัด	4	24	171	
จากทั้งหมด 76 จังหวัด	878	7,255	75,032	
คิดเป็นร้อยละของประเทศ	0.46	0.33	0.23	

ผลกระทบด้านการเกษตร

ด้านพืช 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก น่าน และสุพรรณบุรี เกษตรกร 22,676 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 140,075 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 39,499 ไร่ พืชไร่ 42,473 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 58,103 ไร่ สรรวจพบความเสียหายแล้ว 6 จังหวัด (พิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร ตาก และน่าน) เกษตรกร 6,662 ราย พื้นที่ 39,503 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 45.75 ล้านบาท (ผ่าน ก.ช.อ. แล้ว 12.73 ล้านบาท) ช่วยเหลือแล้ว 20.98 ล้านบาท

6.2 วาตภัย ช่วงภัย วันที่ 8 ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 37 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี แพร่ ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก เชียงใหม่ นครสวรรค์ ลำพูน เชียงราย น่าน ขอนแก่น หนองคาย เลย บึงกาฬ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ จันทบุรี ตรด ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี สุราษฎร์ธานี และชุมพร เกษตรกร 12,562 ราย พื้นที่ 38,979 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,042 ไร่ พืชไร่ 16,631 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 21,306 ไร่ สรรวจพบความเสียหายแล้ว 32 จังหวัด เกษตรกร 4,317 ราย พื้นที่ 10,404 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 14.47 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 12.72 ล้านบาท

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.3 อุทกภัย ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา (ประกาศเขตฯแล้ว) และจังหวัดตรัง (ยังไม่ประกาศเขตฯ) เกษตรกร 49 ราย พื้นที่ 531 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 50 ไร่ พืชไร่ 1 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 480 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.4 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) พะเยา (โรคราบอดหอมแดงและหนอนกระทุ้ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) อุดรดิตถ์ (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) และเชียงราย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) เกษตรกร 9,269 ราย พื้นที่ 62,918 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,610 ไร่ พืชไร่ 53,972 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,336 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 3 จังหวัด เกษตรกร 1,424 ราย พื้นที่ 6,385 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 7.78 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 1.60 ล้านบาท

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนกระทุ้งกล้าข้าว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (อำนาจเจริญ) จำนวน 252 ไร่ การระบาดลดลง 12,119 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนกระทุ้งกล้า เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำเกษตรกรสำรวจแปลง ใช้การตัดใบข้าว เก็บทำลาย และตัดหญ้าที่คั่นนาในการป้องกันกำจัดเพื่อลดปริมาณของหนอนกระทุ้งกล้าข้าว
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไรแดง 3. แมลงนูนหลวง 4. เพลี้ยหอย 5. โรคโคนเน่าหัวเน่า 6. โรคพุ่มแจ้ 7. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ลำพูน นครราชสีมา ลพบุรี ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 678 ไร่ การระบาดลดลง 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และกาญจนบุรี) จำนวน 11,366 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 145 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 407 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 9 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 519 ไร่ การระบาดคงที่ พบอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส <i>Cassava mosaic virus</i> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว) จำนวน 18,774 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,452.25 ไร่	- สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณะชนเกี่ยวกับโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ - จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัด - สำรวจสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังร่วมกับกรมวิชาการเกษตร - ให้เกษตรกรสำรวจแปลงสม่ำเสมอ และให้เจ้าหน้าที่สุ่มสำรวจและติดตามการระบาดในแปลงที่พบอาการแบบครอบคลุมพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ - วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาดเสียหาย - ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงหรือชาวพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลัง ในช่วงที่ต้นอ่อนจะกระทบแล้งนาน - แخذท่อนพันธุ์สำหรับการปลูกมันสำปะหลังในฤดูต่อไป เพื่อลดการระบาดของเพลี้ยหอย เมื่อเกิดการระบาดแล้วแนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีตามที่กรมวิชาการแนะนำ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนวดยาว 3. แมลงงูหนอนหวาง 4. จักจั่น 5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 6. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) จำนวน 133 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 60 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 160 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 420 ไร่ การระบาดลดลง 1,033 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 70 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงงูหนอนหวาง ดักแด้ และตัวหนวดยาว และใช้เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ลำปาง พะเยา เลย สระบุรี และราชบุรี) จำนวน 67,212 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 20,634 ไร่ พื้นที่ระบาด 50 จังหวัด จำนวน 1,050,237.18 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 604,172.18 ไร่	- แจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ให้เกษตรกรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง - จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และภูเก็ต) จำนวน 493 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 45 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและซุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงค้ำหนาม 3. ตัวแรด 4. หนอนพาราซ่า	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จำนวน 5,227 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด จำนวน 41,446 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 504 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด จำนวน 10,537 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 378 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร) จำนวน 3 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าว - ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนพาราซ่าทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง - ปลปล่อยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงค้ำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ให้เกษตรกรดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของตัวแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก 3. หนอนหน้าแมว 4. ตัวแรด 5. ตัวงูหลาย 6. หนู	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ปทุมธานี และสงขลา) จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 60 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สงขลา ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 902 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 60 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 52 ไร่ การระบาดลดลง 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 140 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของตัวแรด และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหัวดำ หนอนปลอกเล็ก และหนอนหน้าแมวทำลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย - ปลปล่อยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำและหนอนปลอกเล็กในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	7. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชุมพร และกระบี่) จำนวน 132 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 87 ไร่	- สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกุหลาบทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ใช้กับดักล่อหนูตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง และใช้เยื่อโปรโตชีว - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรครากขาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และปัตตานี) จำนวน 989 ไร่ การระบาดลดลง 130 ไร่	- ให้เกษตรกรขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีฟิโพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณที่เป็นโรครากขาวยางพารา
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนเจาะผล 3. โรครากเน่าโคนเน่า 4. โรคราดำ 5. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตรว และ ชุมพร) จำนวน 10,350 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 61 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 6 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ สังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการทำลายของหนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะผล เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด - กำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตักพื้นหลุมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง - แหล่งที่มีการระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึมให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้งห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน - ตัดแต่งผลทุเรียนไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกัน และใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย และควรเริ่มห่อผลทุเรียนตั้งแต่มีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปด้วยถุงมุ้งในล่อนถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่เจาะรูบริเวณขอบล่างเพื่อให้ไอน้ำระบายออกมาได้ - หากระบาดรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทำลายของหนอนเจาะผลสำหรับในแหล่งที่มีการระบาด ให้พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน โดยพ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลายแล้วทาผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำและโรคใบไหม้ทุกๆ 3-7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลาม
เงาะ	1. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนเงาะอย่างสม่ำเสมอ ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อลดความชื้นภายในทรงพุ่ม ตัดส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลาย และเก็บรวบรวมใบที่เป็นโรคและร่วงหล่นในบริเวณสวนไปเผาทำลาย - เมื่อพบใบแก่ถูกทำลายมากกว่าร้อยละ 30 ตัดต้นแนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 85% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทั้งต้น หรือใช้พ่นป้องกันเป็นระยะๆ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 7 ก.ค. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 7 ก.ค. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 321 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 27 จุด ในพื้นที่ 16 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว นครราชสีมา ยโสธร สุรินทร์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และสตูล

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 93,360 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 4,571 ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 22 - 28 มิ.ย. 62) เกิดโรคในสุนัข 3 ครั้ง และในโค 2 ครั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ชลบุรี นครศรีธรรมราช สตูล และจังหวัดสงขลา

8.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 22 - 28 มิ.ย. 62) เกิดในโคเนื้อ 3 ครั้ง ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา และเกิดในโคนม 1 ครั้ง ในพื้นที่ 1 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลแยกชนิด

8.3 มีรายงานโรคระบาดสัตว์อื่นๆ คือ โรคพี อาร์ อาร์ เอส 1 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างรอผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

8.4 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

8.5 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 22 - 28 มิ.ย. 62) พบการระบาด 8 โรค ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 35 ครั้ง
 - ในหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศฮังการี
 - ในหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย
 - ในหมูป่า 2 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์
 - ในสุกรและหมูป่า 20 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
 - ในหมูป่า 3 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศแอฟริกาใต้
- โรคไข้หวัดนกในนก 2 ครั้ง
 - H5N2 ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศเดนมาร์ก
 - ชนิดรุนแรงต่ำ ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศเนปาล
- โรคนิวคาสเซิล ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศคาซัคสถาน
- โรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข 1 ครั้ง ที่เขตปกครองพิเศษเซวตา
- โรคแอนแทรกซ์ ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศเมียนมาร์
- โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบติดต่อ ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศนามิเบีย
- โรคโลหิตจางติดต่อ ในม้า 1 ครั้ง ที่ประเทศออสเตรเลีย
- โรควัณโรค ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศเยอรมัน