



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้ โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีการกระจายของฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ สำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 25 ก.ค 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 26 ก.ค. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	89.5	ฝนตกหนัก
2.	อ.พุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	82.0	ฝนตกหนัก
3.	อ.ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	82.0	ฝนตกหนัก
4.	อ.ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	77.5	ฝนตกหนัก
5.	อ.เขาสมิง	ตราด	74.5	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค. 62)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 35,898 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 11,996 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (49,724 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 13,826 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 74.42 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 105.94 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 40,170 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 34,118 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 10,595 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 22) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (46,686 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 12,568 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 60.81 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 91.92 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 36,808 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	8,117	33	1,372	8	75	1,001	341	59	244	27	83	25,825	8,458	33	1,616	9	17,368
ตอน.	12	8,368	2,599	31	967	14	218	1,998	556	60	412	22	230	10,367	3,155	30	1,379	16	7,212
กลาง	3	1,419	146	10	86	6	22	369	103	48	79	23	25	1,788	249	14	166	10	1,539
ตะวันตก	2	26,605	18,024	68	4,747	36	7	142	67	72	58	44	9	26,747	18,091	68	4,806	36	8,656
ตะวันออก	6	1,515	410	27	310	22	51	964	383	58	331	36	57	2,479	793	32	641	28	1,686
ใต้	4	8,194	4,823	59	3,112	48	39	668	330	57	277	45	43	8,863	5,153	58	3,390	48	3,710
รวม	35	70,926	34,118	48	10,595	22	412	5,142	1,780	35	1,401	29	447	76,069	35,898	47	11,996	23	40,170

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,924 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 1,228 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 7) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 4.09 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 41.99 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,947 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	4,502	33	702	7	0.00	0.00	21.00	21.00	8,960
สิริกิตี	3,257	34	407	6	4.09	3.25	18.39	18.98	6,253
ภูมิพล+สิริกิตี	7,759	34	1,109	7	4.09	3.25	39.39	39.98	15,213
แควน้อยฯ	126	13	83	9	0.00	0.00	2.16	2.16	813
ป่าสักชลสิทธิ์	39	4	36	4	0.00	0.00	0.44	0.69	921
รวมทั้งหมด	7,924	32	1,228	7	4.09	3.25	41.99	42.83	16,947

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 20 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯแม่จัดสมบูรณ์ชล (25%) อ่างฯแม่กวงอุดมธารา (12%) อ่างฯก๊วกคหมา (21%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (9%) อ่างฯแม่มอก (18%) อ่างฯห้วยหลวง (17%) อ่างฯน้ำพุ (16%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (4%) อ่างฯอุบลรัตน์ (-1%) อ่างฯลำปาว (20%) อ่างฯลำพระเพลิง (14%) อ่างฯมูลบน (24%) อ่างฯลำแซะ (27%) อ่างฯลำนางรอง (19%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (4%) อ่างฯทับเสลา (15%) อ่างฯกระเสียว (11%) อ่างฯขุนด่านฯ (14%) อ่างฯคลองสิียด (6%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (17%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 237 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 219 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.73 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.47 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.21 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.19 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.38 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.38 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 94 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 94 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 61 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 27 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 6 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 4 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 5 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 33 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 35 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลป์) 5 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 16 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 118 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 115 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมทอง) 6 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 46 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 55 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 11 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 63 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 63 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)								เกณฑ์	หมายเหตุ
		19 ก.ค.	20 ก.ค.	21 ก.ค.	22 ก.ค.	23 ก.ค.	24 ก.ค.	25 ก.ค.	26 ก.ค.		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนายนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนากกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 25 ก.ค. 62	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.97	-9.83
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.27	-11.73
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.54	-10.66
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	2.23	-9.77
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	2.39	-10.11
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.63	-11.87

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562/63

ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ปลูกข้าวแล้ว 47.88 ล้านไร่

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 11 หน่วย ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิชณุโลก ตาก กาญจนบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ สระแก้ว และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16-25 กรกฎาคม 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร (4) พะเยา (5) พิชณุโลก (5) ลำปาง (7) อุดรดิตถ์ (5) พิจิตร (6) เชียงราย (12) เชียงใหม่ (12) เพชรบูรณ์ (9) แพร่ (5) น่าน (15) ลำพูน (8) สุโขทัย (2) แม่ฮ่องสอน (1)
กลาง	กาญจนบุรี (2) ชัยนาท (2) นครสวรรค์ (10) สระบุรี (6) ปทุมธานี (1) ลพบุรี (9) สุพรรณบุรี (2) อุทัยธานี (5) สิงห์บุรี (1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์ (9) ขอนแก่น (18) นครราชสีมา (21) บุรีรัมย์ (23) มหาสารคาม (13) มุกดาหาร (2) ยโสธร (5) ร้อยเอ็ด (16) ศรีสะเกษ (12) สุรินทร์ (10) หนองคาย (1) เลย (14) อุดรธานี (5) อุบลราชธานี (7) ชัยภูมิ (7) สกลนคร (13) หนองบัวลำภู (1) นครพนม (1) อำนาจเจริญ (7)
ตะวันออก	จันทบุรี (1) ฉะเชิงเทรา (5) ชลบุรี (4) ระยอง (1) สระแก้ว (5) ปราจีนบุรี (3)
ใต้	ชุมพร (2) นครศรีธรรมราช (11) พัทลุง (8) สงขลา (4) ราชบุรี (1) เพชรบุรี (1)
รวม	รวม 54 จังหวัด (365 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย จำนวน 15 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	1	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ จ.ลำปาง (แม่ทะ แม่เมาะ เกาะคา เมืองลำปาง) จ.เชียงใหม่ (สันป่าตอง หางดง สารภี) จ.ลำพูน (เมืองลำพูน)
2. พิษณุโลก	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมที่ระดับปฏิบัติการมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับท้องฟ้าปิด มีเมฆชั้นกลาง-สูงปกคลุมเต็มท้องฟ้า และมีฝนละอองตกเป็นระยะๆ ตลอดทั้งวันในพื้นที่เป้าหมาย
3. ตาก	2	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.เชียงใหม่ (ดอยเต่า ฮอด)
4. กาญจนบุรี	2	มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี (ไทรโยค ด่านมะขามเตี้ย เมืองกาญจนบุรี ท่าม่วง ท่ามะกา พนมทวน) จ.ราชบุรี (จอมบึง โพธาราม)
5. ลพบุรี	2	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์ ตากลิ โกรกพระ ชุมแสง ท่าตะโก หนองบัว พยุหะคีรี ลาดยาว ไพศาล) จ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท มโนรมย์) จ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี ท้าพัน สว่างอารมณ์) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนวังร่มเกล้า อ่างเก็บน้ำเขาพระ บึงบอระเพ็ด
6. นครราชสีมา	1	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (วังน้ำเขียว ครบุรี) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำนลบน เขื่อนลำแชะ
7. ขอนแก่น	1	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
8. อุบลราชธานี	1	ฝนตกเล็กน้อย บางบริเวณพื้นที่เกษตร จ.ยโสธร (กุดชุม ทรายมูล เมืองยโสธร ป่าดิว คำเขื่อนแก้ว ไทยเจริญ) จ.อำนาจเจริญ (หัวตะพาน เมืองอำนาจเจริญ เสนางคนิคม ลืออำนาจ ชานุมาน ปทุมราชวงศา พนา) จ.อุบลราชธานี (เขมราฐ กุดข้าวปุ้น ตระการพืชผล ม่วงสามสิบ) พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธรูทยาน และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยถ้ำแซ่
9. สุรินทร์	3	มีฝนตกเล็กน้อย พื้นที่การเกษตร จ.ร้อยเอ็ด (เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ พนมไพร หนองฮี)
10. สระแก้ว	2	มีฝนตกเล็กน้อย ในพื้นที่การเกษตร จ.สระแก้ว (โคกสูง)
11. สุราษฎร์ธานี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเครื่องบินของกองทัพอากาศตรวจซ่อมประจำสัปดาห์

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 25 กรกฎาคม 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 139 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 88.45 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 3,817 เที่ยวบิน (5,479:48 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 59 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนราธิวาส

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 1,935 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค และอุทกภัย จำนวน 206 เครื่อง ในพื้นที่ 25 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 130 เครื่อง ในพื้นที่ 27 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(8) ลำพูน(2) แม่ฮ่องสอน(1) อุตรดิตถ์(2) พิจิตร(11) ลำปาง(16) น่าน(6) พะเยา(2) แพร่(4) ตาก(1) พิษณุโลก(6) นครราชสีมา(8) บุรีรัมย์(1) สกลนคร(1) อำนาจเจริญ(6) ยโสธร(2) อุบลราชธานี(3) เลย(2) อุดรธานี(5) สกลนคร(1) นครนายก(4) ปราจีนบุรี(8) ตราด(4) ฉะเชิงเทรา(4) ระยอง(1) ราชบุรี(4) นครสวรรค์(17)

- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 76 เครื่อง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย(2) นครราชสีมา(15) บุรีรัมย์(9) เลย(5) สกลนคร(2) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(5) สุพรรณบุรี(17) พระนครศรีอยุธยา(2) อ่างทอง(2)

6. ผลกระทบด้านการเกษตร

6.1 ภาวะฝนแล้ง ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 1 จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี (ประกาศสาธารณภัยแล้ว) เกษตรกร 290 ราย พื้นที่ 4,125 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ (มันสำปะหลัง) 4,125 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.2 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) พะเยา (โรคราบอดหอมแดงและหนอนกระทุ้ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) อุดรดิตถ์ (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) และเชียงราย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) เกษตรกร 9,221 ราย พื้นที่ 62,646 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,338 ไร่ พืชไร่ 53,972 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,336 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 3 จังหวัด เกษตรกร 3,048 ราย พื้นที่ 18,647 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 21.86 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 1.60 ล้านบาท

6.3 วาตภัย ช่วงภัย วันที่ 8 ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 38 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี แพร่ ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุดรดิตถ์ ตาก เชียงใหม่ นครสวรรค์ ลำพูน เชียงราย น่าน ขอนแก่น หนองคาย เลย บึงกาฬ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร อุดรธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร และปัตตานี เกษตรกร 12,665 ราย พื้นที่ 31,481 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,697 ไร่ พืชไร่ 15,340 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 14,445 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 33 จังหวัด เกษตรกร 4,353 ราย พื้นที่ 10,306 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 14.43 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 14.02 ล้านบาท

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.4 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – พ.ค. 62

ด้านพืช 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุดรดิตถ์ ตาก และน่าน เกษตรกร 21,962 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 126,983 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 34,917 ไร่ พืชไร่ 43,455 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 48,612 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 7 จังหวัด เกษตรกร 7,828 ราย พื้นที่ 42,551 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 50.34 ล้านบาท แบ่งเป็น อยู่ระหว่างของบปลัดฯ เสนอกรมแล้ว 19.27 ล้านบาท รอประชุม ก.ช.ก.จ. 2.44 ล้านบาท อยู่ระหว่าง อบต. ช่วยเหลือ 2.72 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 22.39 ล้านบาท

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนกระทุ้งกล้าข้าว	ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนกระทุ้งกล้า เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีวเวอเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไรแดง 3. แมลงนูนหลวง 4. เพลี้ยหอย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ลำพูน นครราชสีมา ลพบุรี ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 678 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และกาญจนบุรี) จำนวน 11,366 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 145 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 407 ไร่ การระบาดคงที่	- สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ - จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัด - สำรวจสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	5. โรคโคนเน่าหัวเน่า 6. โรคพุ่มแจ้ 7. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 3 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 529 ไร่ การระบาดคงที่ พบอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส <i>Cassava mosaic virus</i> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว) จำนวน 18,774 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เกษตรกรสำรวจแปลงสม่ำเสมอ และให้เจ้าหน้าที่ สุ่มสำรวจและติดตามการระบาดในแปลงที่พบอาการแบบครอบคลุมพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ - วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาดเสียหาย - ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงห้ำหิ้วพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลัง ในช่วงที่ต้นอ่อนจะกระทบแล้งนาน - แห่ท่อนพันธุ์สำหรับการปลูกมันสำปะหลังในฤดูต่อไป เพื่อลดการระบาดของเพลี้ยหอย เมื่อเกิดการระบาดแล้วแนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีตามที่กรมวิชาการแนะนำ
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ดั้วหนวดยาว 3. แมลงนูนหลวง 4. จักจั่น 5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 6. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) จำนวน 133 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 60 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 160 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 1,453 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,033 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 70 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และดั้วหนวดยาว และใช้เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียม ควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ลำปาง พะเยา เชียงราย เลย และราชบุรี) จำนวน 43,980 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 17,124 ไร่ พื้นที่ระบาด 50 จังหวัด จำนวน 1,151,373 ไร่ การระบาดลดลง 29,375 ไร่	- แจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ให้เกษตรกรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง - จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และภูเก็ต) จำนวน 494 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและซุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด 4. หนอนพาราซ่า	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จำนวน 5,113 ไร่ การระบาดลดลง 147 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด จำนวน 41,460 ไร่ การระบาดลดลง 56 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด จำนวน 10,509 ไร่ การระบาดลดลง 72 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร) จำนวน 3 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูมะพร้าว - ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนพาราซ่าทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้แหล่งแพร่พันธุ์ของดั้วแรด และศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			- ใช้กำดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก 3. หนอนหน้าแมว 4. ด้วงแรด 5. ด้วงกุหลาบ 6. หนอน 7. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร และสงขลา) จำนวน 17 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 62 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 20 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สงขลา ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 1,018 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 116 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 25 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 27 ไร่ ไม่มีการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 140 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชุมพร และกระบี่) จำนวน 132 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รมรังสีให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหัวดำ หนอนปลอกเล็ก และหนอนหน้าแมวทำลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย - ใช้กำดักไฟโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกุหลาบทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ใช้กำดักล่อหนูตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง และใช้เยื่อโปรโตชีว - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรคราขาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 1,100 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 127 ไร่	- ให้เกษตรกรรูดคู้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีไพโรฟิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น ไร่บริเวณที่เป็นโรคยางพารายางพารา
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนเจาะผล 3. โรคราเน่าโคนเน่า 4. โรคราดำ 5. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 2 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง และชุมพร) จำนวน 10,374 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 6 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 21 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่	- โรคราเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคราเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่โดยหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดโรคราเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ขุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - หนอนเจาะลำต้นทุเรียน แนะนำให้สังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการทำลายของหนอนเจาะลำต้น เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด ทำการกำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตักผีพันหลวมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนเจาะลำต้นทุเรียนรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึมให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน - หนอนเจาะผลทุเรียน แนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจผลทุเรียนภายในสวน หากพบร่องรอยทำลายของหนอนเจาะผลทุเรียนให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลายทิ้ง ตัดแต่งผลทุเรียนไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกัน และใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย และเริ่มห่อผลทุเรียนตั้งแต่มีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปด้วยถุงมุ้งไนลอน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่เจาะรูบริเวณขอบล่าง เพื่อให้มีน้ำระบายออกมาได้ หากการระบาดของหนอนเจาะผลทุเรียนรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารแลมบ์ดา - ไซยาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลเฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทำลายของหนอนเจาะผล สำหรับในแหล่งที่มีการระบาด ให้พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน โดยพ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน - โรคราดำ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำ และโรคใบไหม้ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ
เงาะ	1. โรคใบจุดสาหร่าย	ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดคงที่	

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 23 ก.ค. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 23 ก.ค. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 329 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 22 จุด ในพื้นที่ 11 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง นครราชสีมา อุบลราชธานี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 93,360 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 4,678 ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 22 - 28 มิ.ย. 62) เกิดโรคในสุนัข 3 ครั้ง และในโค 2 ครั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ชลบุรี นครศรีธรรมราช สตูล และจังหวัดสงขลา

8.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 22 - 28 มิ.ย. 62) เกิดในโคเนื้อ 3 ครั้ง ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา และเกิดในโคนม 1 ครั้ง ในพื้นที่ 1 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลแยกชนิด

8.3 มีรายงานโรคระบาดสัตว์อื่นๆ คือ โรคพี อาร์ อาร์ เอส 1 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างรอผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

8.4 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

8.5 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 22 - 28 มิ.ย. 62) พบการระบาด 8 โรค ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 35 ครั้ง
 - ในหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศฮังการี
 - ในหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย
 - ในหมูป่า 2 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์
 - ในสุกรและหมูป่า 20 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
 - ในหมูป่า 3 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศแอฟริกาใต้

- โรคไข้หวัดนกในนก 2 ครั้ง
 - H5N2 ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศเดนมาร์ก
 - ชนิดรุนแรงต่ำ ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศเนปาล
- โรคนิวคาสเซิล ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศคาซัคสถาน
- โรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข 1 ครั้ง ที่เขตปกครองพิเศษเซวตา
- โรคแอนแทรกซ์ ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศเมียนมาร์
- โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบติดต่อ ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศนามิเบีย
- โรคโลหิตจางติดต่อ ในม้า 1 ครั้ง ที่ประเทศออสเตรีย
- โรควัณโรค ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศเยอรมัน