



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 20 มิถุนายน 2562


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-2 วันข้างหน้าไว้ด้วย

ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาว เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 17 มิ.ย. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 18 มิ.ย. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.พิชัย	อุตรดิตถ์	96.5	ฝนตกหนักมาก
2.	อ.บ้านดุง	อุดรธานี	83.5	ฝนตกหนัก
3.	อ.กะเปอร์	ระนอง	83.0	ฝนตกหนัก
4.	อ.ตรอน	อุตรดิตถ์	82.0	ฝนตกหนัก
5.	อ.ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	77.0	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 38,376 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 14,450 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (45,954 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 7,578 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 56.53 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 103.30 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 37,693 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 36,401 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 12,858 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (42,997 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 6,596 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 40.66 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 92.23 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 34,526 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	9,787	39	3,043	17	75	1,001	417	42	318	35	83	25,825	10,204	40	3,361	18	15,621
ตอน.	12	8,368	2,836	34	1,186	18	218	1,998	655	33	508	28	230	10,367	3,491	34	1,694	20	6,875
กลาง	3	1,419	191	13	131	10	22	369	110	30	86	25	25	1,788	301	17	217	13	1,487
ตะวันตก	2	26,605	18,132	68	4,855	36	7	142	74	52	64	48	9	26,747	18,206	68	4,919	37	8,541
ตะวันออก	6	1,515	404	27	304	21	51	964	370	38	318	35	57	2,479	774	31	622	27	1,705
ใต้	4	8,194	5,051	62	3,340	52	39	668	349	52	297	48	43	8,863	5,400	61	3,637	51	3,463
รวม	35	70,926	36,401	51	12,858	27	412	5,142	1,975	38	1,592	33	447	76,069	38,376	50	14,450	28	37,693

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,549 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 2,853 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 16) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 8.55 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 45.36 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 15,322 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,436	40	1,636	17	0.60	1.09	20.00	20.00	8,026
สิริกิตี	3,856	41	1,006	15	7.93	7.90	23.02	23.05	5,654
ภูมิพล+สิริกิตี	9,291	40	2,642	16	8.53	8.99	43.02	43.05	13,681
แควน้อยฯ	175	19	132	15	0.02	0.34	1.30	1.30	764
ป่าสักชลสิทธิ์	83	9	80	8	0.00	0.00	1.04	1.04	877
รวมทั้งหมด	9,549	38	2,853	16	8.55	9.33	45.36	45.39	15,322

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 12 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ แม่กวอดมธรา (23%) อ่างฯ แควน้อยฯ บำรุงแดน (19%) อ่างฯ ห้วยหลวง (24%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (25%) อ่างฯ ลำพระเพลิง (14%) อ่างฯ ลำนางรอง (29%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (9%) อ่างฯ ทับเสลา (24%) อ่างฯ กระเสี้ยว (23%) อ่างฯ ชุนด่านฯ (12%) อ่างฯ คลองสิียด (14%) อ่างฯ นฤปดินทรจินดา (20%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำมูล ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำน่าน แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 418 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 364 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.45 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.75 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.91 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.70 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.51 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.51 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 123 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 123 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 91 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 31 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 1 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 9 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 10 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 32 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 33 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 5 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 21 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 160 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 157 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 14 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 56 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 75 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 15 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 76 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 77 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)								เกณฑ์	หมายเหตุ
		13 มิ.ย.	14 มิ.ย.	15 มิ.ย.	16 มิ.ย.	17 มิ.ย.	18 มิ.ย.	19 มิ.ย.	20 มิ.ย.		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแฉ จ.ปทุมธานี	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.21	0.22	0.21	ปกติ	
เจ้าพระยา	ท่าน้ำกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

3. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62

ทั้งประเทศ จำนวน 16.08 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.21 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 4.87 ล้านไร่

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 8.74 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.18 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 1.56 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562)

ทั้งประเทศ จำนวน 13.89 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.72 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 2.17 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.40 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 10.74 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 0.98 ล้านไร่) ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 8.25 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.71 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 0.54 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.39 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 7.58 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 0.13 ล้านไร่)

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2561/62			* สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2561/62						ข้าวรอบที่ 2		
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าว	% ข้าว	พืชไร่ พืชผัก	% พืชไร่ พืชผัก	รวม	% รวมทั้งหมด	พื้นที่ เก็บเกี่ยว	พื้นที่ เสียหาย	พื้นที่รอ เก็บเกี่ยว
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	8.03	2.43	10.46	9.02	112.37	0.59	24.28	9.61	91.90	8.06	-	0.96
	นอกเขตชลประทาน	3.18	2.44	5.62	2.70	84.91	1.58	64.75	4.28	76.16	2.68	-	0.02
	รวม	11.21	4.87	16.08	11.72	104.58	2.17	44.56	13.89	86.40	10.74	-	0.98
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	5.30	0.77	6.07	6.03	113.77	0.08	10.39	6.11	100.66	5.90	-	0.13
	นอกเขตชลประทาน	1.88	0.79	2.67	1.68	89.36	0.46	58.23	2.14	80.15	1.68	-	-
	รวม	7.18	1.56	8.74	7.71	107.38	0.54	34.62	8.25	94.39	7.58	-	0.13

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 11 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สระแก้ว อำเภอดำรงวิทยารัษฎานุประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16-17 มิถุนายน 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	พะเยา (1) พิจิตร (3) ลำปาง (2) ลำพูน (1) สุโขทัย (4) อุตรดิตถ์ (2) เชียงราย (13) เชียงใหม่ (3) เพชรบูรณ์ (5) แพร่ (2)
กลาง	ไม่มีการขอรับบริการ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา (4) บุรีรัมย์ (3) ศรีสะเกษ (1)
ตะวันออก	ไม่มีการขอรับบริการ
ใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	รวม 13 จังหวัด (44 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ที่ 17 มิถุนายน 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย จำนวน 11 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	2	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ จ.แพร่ (สอง) จ.น่าน (บ้านหลวง เวียงสา) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง จ.แพร่ (สอง)
2. ตาก	2	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
3. ลพบุรี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมชั้นบนมีกำลังแรงและมีเมฆชั้นกลาง ชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้า ส่งผลให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่มีการพัฒนาตัวในแนวตั้ง
4. ราชบุรี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมชั้นบนมีกำลังแรงและมีเมฆชั้นกลาง ชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้ากับมีฝนตกเป็นระยะบริเวณสนามบิน
5. นครราชสีมา	4	มีฝนตกเล็กน้อย-ปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (โนนสูง พิมาย ชุมพวง ห้วยแถลง เมืองยาง) จ.บุรีรัมย์ (ลำปลายมาศ หนองหงส์) พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา (วังน้ำเขียว)
6. ขอนแก่น	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆชั้นกลาง ชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้าตลอดทั้งวัน ส่งผลให้กลุ่มเมฆในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาตัวช้า
7. อุบลราชธานี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เดินทางและจัดเตรียมอุปกรณ์
8. สระแก้ว	3	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา (ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต) จ.สระแก้ว (วังสมบูรณ์ วังน้ำเย็น) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด
9. หัวหิน	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมชั้นบนมีกำลังแรงและมีเมฆชั้นกลางปกคลุมเต็มตลอดทั้งวัน ส่งผลให้กลุ่มเมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
10. สุราษฎร์ธานี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมชั้นบนมีกำลังแรงและมีเมฆชั้นกลางปกคลุมเต็มตลอดทั้งวัน ส่งผลให้กลุ่มเมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
11. สงขลา	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีเมฆชั้นกลาง ชั้นสูงปกคลุมตลอดทั้งวัน ประกอบกับลมที่ระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง ส่งผลให้กลุ่มเมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 17 มิถุนายน 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 103 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 90.32 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 2,797 เที่ยวบิน (4,004:51 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม ยโสธร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส พัทลุง และสงขลา

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 83 เครื่อง ในพื้นที่ 18 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 50 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(16) น่าน(6) พะเยา(2) นครราชสีมา(2) สกลนคร(1) กาญจนบุรี(2) นครนายก(4) ปราจีนบุรี(8) ฉะเชิงเทรา(4) ระยอง(2)

- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 48 เครื่อง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย(2) นครราชสีมา(13) บุรีรัมย์(1) เลย(3) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(9) กาญจนบุรี(3)

6. ผลกระทบด้านการเกษตร

6.1 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งฯ แล้ว 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตรวดี อุตรดิตถ์ พิจิตร เชียงราย และจังหวัดสุโขทัย จำนวน 39 อำเภอ 156 ตำบล 1,230 หมู่บ้าน เนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ได้ประกาศยุติสถานการณ์แล้วในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด 3 อ. (เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ เมืองสรวง) 3 ต. 14 ม. จ.นครราชสีมา 3 อ. (เฉลิมพระเกียรติ สูงเนิน พระทองคำ) 4 ต. 35 ม. จ.พิจิตร 1 อ. (สากเหล็ก) 4 ต. 17 ม. จ.สุโขทัย 3 อ. (สวรรคโลก ศรีนคร ศรีษะนาถ) 18 ต. 142 ม. และ จ.ตรวดี 2 อ. (เขาสมิง บ่อไร่) 21 ต. 141 ม. ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) จำนวน 7 จังหวัด 27 อำเภอ 106 ตำบล 881 หมู่บ้าน ดังนี้

จังหวัด	จำนวน			รายชื่ออำเภอที่ประกาศเขตฯ
	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	
1. พิษณุโลก	3	11	80	วัดโบสถ์ (4ต. 37ม.) ขาดิตระการ (5ต. 38ม.) เมืองฯ (2ต. 5ม.)
2. อุตรดิตถ์	1	2	15	ท่าปลา (2ต. 15ม.)
3. เชียงราย	13	63	561	เมืองฯ (5ต. 40ม.) ป่าแดด (5ต. 58ม.) เชียงแสน (6ต. 70ม.) พญาเม็งราย (2ต. 2ม.) แม่สาย (5ต. 14ม.) พาน (13ต. 123ม.) เทิง (7ต. 124ม.) แม่จัน (9ต. 58ม.) เชียงของ (3ต. 14ม.) เวียงชัย (2ต. 20ม.) เวียงแก่น (1ต. 1ม.) ขุนตาล (3ต. 32ม.) ดอยหลวง (2ต. 5ม.)
4. ศรีสะเกษ	6	16	126	เมืองจันทร์ (1ต. 7ม.) ขุขันธ์ (4ต. 36ม.) ไพรบึง (1ต. 15ม.) ศรีรัตน (3ต. 29ม.) ขุนหาญ (4ต. 27ม.) โพธิ์ศรีสุวรรณ (3ต. 12ม.)
5. มหาสารคาม	2	11	79	วาปีปทุม (10ต. 69ม.) พยัคภูมิพิสัย (1ต. 10ม.)
6. ตรวดี	1	2	13	เมืองฯ (2ต. 13ม.)
7. ชลบุรี	1	1	7	เกาะสีชัง (1ต. 7ม.)
รวม 7 จังหวัด	27	106	881	
จากทั้งหมด 76 จังหวัด	878	7,255	75,032	
คิดเป็นร้อยละของประเทศ	3.08	1.46	1.17	

ผลกระทบด้านการเกษตร

ด้านพืช 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุตรดิตถ์ และตาก เกษตรกร 24,018 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 138,962 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 41,401 ไร่ พืชไร่ 46,960 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 50,601 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 5 จังหวัด (พิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร และตาก) เกษตรกร 6,325 ราย พื้นที่ 40,633 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 47.01 ล้านบาท (ผ่าน ก.ช.อ. แล้ว 17.28 ล้านบาท)

6.2 วาตภัย ช่วงภัย วันที่ 8 ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 34 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี แพร่ ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก เชียงใหม่ นครสวรรค์ ลำพูน เชียงราย น่าน ขอนแก่น หนองคาย เลย บึงกาฬ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี ตรวดี ปราจีนบุรี ชัยนาท ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี และสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 11,983 ราย พื้นที่ 28,063 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,651 ไร่ พืชไร่ 15,146 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 11,266 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 28 จังหวัด เกษตรกร 3,927 ราย พื้นที่ 10,006 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 13.80 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 7.95 ล้านบาท

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.3 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) พะเยา (โรคราบาดหอมแดง) อุตรดิตถ์ (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) และเชียงราย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) เกษตรกร 1,092 ราย พื้นที่ 7,513 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 6,625 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 888 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 3 จังหวัด เกษตรกร 743 ราย พื้นที่ 1,406 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 2.08 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 1.45 ล้านบาท

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนกระทู้กล้า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ) จำนวน 3,366 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3,366 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีวเวเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำเกษตรกรสำรวจแปลง หากเริ่มพบการระบาด หากพบการระบาดรุนแรงแนะนำให้ใช้สารเคมีกำจัดแมลง เช่น มาลาไทยอน หรือเฟนิโตรไทออน
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไธแดง 3. แมลงนูนหลวง 4. เพลี้ยหอย 5. โรคโคนเน่าหัวเน่า 6. โรคพุ่มแจ้ 6. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ระยอง ชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี และนครราชสีมา) จำนวน 557 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กาญจนบุรี จันทบุรี สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และนครราชสีมา) จำนวน 10,344 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5,988 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 155 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา จันทบุรี สระแก้ว และชลบุรี) จำนวน 577 ไร่ การระบาดลดลง 116 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 7 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และสระแก้ว) พบการระบาดในมันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน จำนวน 516 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 516 ไร่ พบอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สระแก้ว และนครราชสีมา) จำนวน 2,629 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 18 ไร่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาด และหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ผลิตขยายแตนเบียน (<i>Anagyrus lopezi</i>) แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน หว่านปูนขาวหรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มา บริเวณรอบโคนต้นที่แสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าที่ขุดออก หรือกรณีระบาดรุนแรงมาก ให้ใช้สารเคมีฟอสฟิทธิล อลูมิเนียม - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียม ใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน - นำแมลงช้างปีกใสปล่อยในพื้นที่ระบาด เพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง - จัดทำแผนการอบรมเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดการระบาดและการป้องกันการระบาดของโรคใบด่าง
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนวดยาว 3. แมลงนูนหลวง 4. จักจั่น 5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 6. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ลพบุรี) จำนวน 450 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 40 ไร่ การระบาดลดลง 40 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 160 ไร่ การระบาดลดลง 60 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 1,033 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 70 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักด้ และตัวหนวดยาว และใช้เชื้อราบีวเวเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุมโดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูกาลปลูกต่อไป และให้เกษตรกรเฝ้าดินชุดต่อทิ้งไม่ให้เปื้อนแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พบการระบาดในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 155,089 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 32,273 ไร่	- แจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ให้เกษตรกรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง - จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และภูเก็ต) จำนวน 448 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและขุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด จำนวน 5,579 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 43 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด จำนวน 55,769 ไร่ การระบาดลดลง 120 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด จำนวน 10,545 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 53 ไร่	- ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บไข่หนอน และตัวเต็มวัยไปทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของศัตรูมะพร้าว - ปลอຍແຕນເປັນບຣາຄອນ (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอຍແຕນເປັນອະສີໂຄເດສ (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักฟิโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับดั้วแรดและดั้วงวง ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>)
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก 3. หนอนหน้าแมว 4. ดั้วแรด 5. ดั้วกู่หลาบ 6. หนู 7. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 57 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จำนวน 844 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 77 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 140 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กระบี่) จำนวน 45 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน โดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดำ หนอนปลอกเล็ก และหนอนหน้าแมวทำลายมาเผาทิ้ง กำจัดวัชพืช บริเวณสวนปาล์มน้ำมัน และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปลอຍແຕນເປັນບຣາຄອນ (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำและหนอนปลอกเล็กในพื้นที่ - ใช้กาดักฟิโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับดั้วแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) และใช้กับดักแสงไฟล่อ หนอนหน้าแมวในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกทำลายระดับรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) พ่น บริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ให้เกษตรกรใช้กับดักล่อหนูตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง และใช้เยื่อโปรโตชีวกำจัดหนู - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาในบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรคราขาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จำนวน 1,119 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	- ให้เกษตรกรชุดคลุมบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรคราขาวยางพารา - ให้เกษตรกรนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมกับปุ๋ยหมัก ใช้ในสวนยางพาราและทาในบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรคราขาวยางพารา - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีโพพริโค นาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น รวดบริเวณที่เป็นโรคราขาวยางพารา
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนเจาะผล 3. เพลี้ยแป้ง 4. เพลี้ยไก่แจ้ 5. โรครากเน่าโคนเน่า 6. โรคราดำ 7. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 3 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี และตราด) จำนวน 10,371 ไร่ การระบาดลดลง 211 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 7 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ สังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการทำลายของ หนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะผล เก็บไข่และหนอน ไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด - กำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่อง ในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายดักพื้น หลวมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง - แหล่งที่มีการระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง ชนิดดูดซึมให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้งห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน - ตัดแต่งผลทุเรียนไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกัน และใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าว คั่นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือ ตัวหนอนเข้าหลบอาศัย และควรเริ่มห่อผลทุเรียน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			ตั้งแต่มีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปด้วยถุงมุ้งไนลอน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่เจาะรูบริเวณขอบล่าง เพื่อให้ระบายออกมาได้ - หากกระบาดรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารแลมบ์ดา - ไซยาโลทริน 2.5% อีซี หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทำลายของหนอนเจาะผลสำหรับในแหล่งที่มีการระบาด - ให้ตัดส่วนที่เพลี้ยแบ่งและเพลี้ยไก่แจ้ทำลายไปทำลายนอกแปลง หากรุนแรงให้พ่นเชื้อราบีวเวเรีย เต็มสารจับใบ โดยพ่นทุก 7 วัน ติดต่อกัน 2 - 3 ครั้ง ในช่วงเย็น อากาศไม่ร้อน ทิ้งทั้งบนใบและใต้ใบทุเรียน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ขุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลายแล้วพ่นผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำ และโรคใบไหม้ทุกๆ 3-7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลาม
เงาะ	1. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนเงาะอย่างสม่ำเสมอ ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อลดความชื้นภายในทรงพุ่ม ตัดส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลาย และเก็บรวบรวมใบที่เป็นโรคและร่วงหล่นในบริเวณสวนไปเผาทำลาย - เมื่อพบใบแก่ถูกทำลายมากกว่าร้อยละ 30 ตัดต้น แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทิ้งไว้ให้ทั่วทั้งต้น หรือใช้พ่นป้องกันเป็นระยะๆ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 16 มิ.ย. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 16 มิ.ย. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 47 จังหวัด 313 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 31 จุด ในพื้นที่ 15 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เพชรบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 66,007 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 4,365 ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 1-7 มิ.ย.62) จำนวน 7 ครั้ง เกิดโรคในสุนัข 6 ครั้ง และโค 1 ครั้ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี สุรินทร์ เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา

8.2 พบสารพิษอันตราย โรคพี อาร์ อาร์ เอส ในสุกรพ่อแม่พันธุ์ จากฟาร์มเอกชนพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไม่พบสุกรแสดงอาการป่วยตาย และฟาร์มมีประวัติวัคซีนป้องกันโรคพี อาร์ อาร์ เอสในฟาร์ม

8.3 ไม่มีโรคปากและเท้าเปื่อย และสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ในสัปดาห์นี้

8.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 1-7 มิ.ย.62) พบการระบาด 4 โรค ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 16 ครั้ง
 - ในสุกร 8 ครั้ง ที่ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน ประเทศโปแลนด์ และประเทศโรมาเนีย
 - ในหมูป่า 8 ครั้ง ที่ประเทศเบลเยียม ประเทศยูเครน ประเทศลัตเวีย และประเทศโรมาเนีย
- โรคไข้หวัดนก ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศจีน
- โรคบรูเซลลา ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศบอสวานา
- โรค Lumpy skin 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศอิสราเอล