



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรออกจากฝั่งต่อไปอีกในระยะนี้

หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 4 ก.ค 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 5 ก.ค. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.รัตนวาปี	หนองคาย	78.5	ฝนตกหนัก
2.	อ.เขาสมิง	ตราด	73.0	ฝนตกหนัก
3.	อ.เมือง	สมุทรสาคร	43.0	ฝนตกหนัก
4.	อ.นายายอาม	จันทบุรี	40.0	ฝนตกหนัก
5.	อ.เกาะช้าง	ตราด	38.5	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.) (ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 37,346 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 13,422 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (45,975 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 8,629 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 94.01 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 107.79 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 38,722 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 35,412 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 11,870 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 25) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (43,135 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 7,723 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 72.56 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 91.53 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 35,514 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	9,074	37	2,330	13	75	1,001	392	59	294	33	83	25,825	9,466	37	2,623	14	16,359
ตอน.	12	8,368	2,776	33	1,125	17	218	1,998	624	53	477	26	230	10,367	3,400	33	1,603	19	6,967
กลาง	3	1,419	173	12	113	8	22	369	110	48	86	25	25	1,788	283	16	199	12	1,505
ตะวันตก	2	26,605	17,979	68	4,702	35	7	142	69	80	60	45	9	26,747	18,048	67	4,762	35	8,699
ตะวันออก	6	1,515	408	27	308	22	51	964	397	53	345	38	57	2,479	805	32	653	28	1,674
ใต้	4	8,194	5,002	61	3,292	51	39	668	342	57	290	47	43	8,863	5,344	60	3,582	50	3,518
รวม	35	70,926	35,412	50	11,870	25	412	5,142	1,934	38	1,552	33	447	76,069	37,346	49	13,422	26	38,722

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8,848 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 36 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 2,152 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 12) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 3.20 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 46.35 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,023 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,029	37	1,229	13	0.00	0.00	24.00	24.00	8,433
สิริกิตี	3,597	38	747	11	2.71	2.78	20.01	20.16	5,913
ภูมิพล+สิริกิตี	8,626	38	1,976	12	2.71	2.78	44.01	44.16	14,346
แควน้อยฯ	156	17	113	13	0.49	0.82	1.30	1.30	783
ป่าสักชลสิทธิ์	65	7	62	7	0.00	0.20	1.04	1.04	895
รวมทั้งหมด	8,848	36	2,152	12	3.20	3.80	46.35	46.50	16,023

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 14 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯแม่กง อุดมธรา (23%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (17%) อ่างฯห้วยหลวง (24%) อ่างฯน้ำพุ (25%) อ่างฯอุบลรัตน์ (24%) อ่างฯลำปาว (30%) อ่างฯลำพระเพลิง (15%) อ่างฯลำนางรอง (25%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (7%) อ่างฯทับเสลา (24%) อ่างฯกระเสียว (23%) อ่างฯขุนด่านฯ (14%) อ่างฯคลองสิียด (13%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (21%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 361 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 333 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.26 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.94 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.10 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.03 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.38 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.38 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 133 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 133 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 97 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 30 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 6 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 6 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 6 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 40 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 40 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 6 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 20 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 136 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 135 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุม (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุม) 17 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 45 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 55 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 19 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 73 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 76 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)								เกณฑ์	หมายเหตุ
		28 มิ.ย.	29 มิ.ย.	30 มิ.ย.	1 ก.ค.	2 ก.ค.	3 ก.ค.	4 ก.ค.	5 ก.ค.		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.19	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนายนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนากมชลประทานสามเสน กทม.	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

3. การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562/63

พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 จำนวน 59.00 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562)

จำนวน 10.98 ล้านไร่ รวม 66 จังหวัด แบ่งเป็น ในเขตชลประทาน 61 จังหวัด ปลูกข้าว 5.74 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 56 จังหวัด ปลูกข้าว 5.24 ล้านไร่

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 11 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิชณุโลก ตาก กาญจนบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ สระแก้ว และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	พะเยา (3) พิจิตร (12) พิชณุโลก (1) ลำพูน (1) ลำปาง (1) เชียงราย (3) เพชรบูรณ์ (5) เชียงใหม่ (1) แพร่ (8)
กลาง	ชัยนาท (1) นครสวรรค์ (3) ลพบุรี (5) สระบุรี (1) สุพรรณบุรี (1) อ่างทอง (1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์ (1) ขอนแก่น (2) ชัยภูมิ (1) นครราชสีมา (3) บุรีรัมย์ (23) ยโสธร (9) ร้อยเอ็ด (3) ศรีสะเกษ (4) สุรินทร์ (4) อำนาจเจริญ (1) อุบลราชธานี (3)
ตะวันออก	ชลบุรี (1) ระยอง (1) สระแก้ว (2) ฉะเชิงเทรา (3)
ใต้	ชุมพร (2) นครศรีธรรมราช (8) พัทลุง (8) สงขลา (2) สุราษฎร์ธานี (1)
รวม	รวม 35 จังหวัด (129 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย ไม่มีการปฏิบัติการฝนหลวง มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมที่ระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง ประกอบกับมีเมฆชั้นกลางปกคลุมทั่วไป ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางแนวตั้งของเมฆในพื้นที่เป้าหมาย
2. พิชณุโลก	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมที่ระดับปฏิบัติการมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับมีเมฆชั้นกลางปกคลุมทั่วไป ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางแนวตั้งของเมฆในพื้นที่เป้าหมาย
3. ตาก	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมผิวพื้นและลมระดับบนมีกำลังแรง ประกอบกับมีเมฆชั้นกลางปกคลุมโดยทั่วไป ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางแนวตั้งของเมฆในพื้นที่เป้าหมาย
4. กาญจนบุรี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสภาพอากาศปิดกับมีฝนตกบริเวณสนามบินและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นระยะๆ
5. ลพบุรี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมท้องฟ้าเต็มท้องฟ้าประกอบด้วยมีฝนตกพริ้วเล็กน้อยบริเวณสนามบินและลมในระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง ส่งผลให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
6. นครราชสีมา	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้าและมีฝนตกเล็กน้อยเป็นระยะ ประกอบกับลมระดับผิวพื้นและลมระดับบนมีกำลังแรง ทำให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
7. ขอนแก่น	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆชั้นกลางสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้าและลมระดับบนมีกำลังแรง ทำให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
8. อุบลราชธานี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีเมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้าตลอดทั้งวัน ประกอบกับลมชั้นบนมีกำลังแรง ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
9. สุรินทร์	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศทรงตัวประกอบด้วยลมชั้นบนมีกำลังแรง ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
10. สระแก้ว	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสภาพอากาศปิดมีฝนตกบริเวณสนามบินและพื้นที่โดยรอบเป็นระยะๆ ประกอบกับลมที่ระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง
11. สุราษฎร์ธานี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้ารอสนับสนุนเครื่องบินจากกองทัพอากาศและช่วงบ่ายลมที่ระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 4 กรกฎาคม 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 118 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 89.63 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 3,118 เที่ยวบิน (4,462:48 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 59 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยาแพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส พัทลุง และสงขลา

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 101 เครื่อง ในพื้นที่ 18 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 49 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(16) น่าน(6) พะเยา(2) นครราชสีมา(2) สกลนคร(1) กาญจนบุรี(2) นครนายก(4) ปราจีนบุรี(9) ฉะเชิงเทรา(3) ระยอง(1)
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 52 เครื่อง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย(2) นครราชสีมา(17) บุรีรัมย์(1) เลย(3) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(9) กาญจนบุรี(3)

6. ผลกระทบด้านการเกษตร

6.1 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งฯ แล้ว 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตราด ชลบุรี อุตรดิตถ์ พิจิตร เชียงราย สุโขทัย และจังหวัดน่าน จำนวน 40 อำเภอ 157 ตำบล 1,232 หมู่บ้าน เนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ได้ประกาศยุติสถานการณ์แล้วในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด 3 อ. (เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ เมืองสรวง) 3 ต. 14 ม. จ.นครราชสีมา 3 อ. (เฉลิมพระเกียรติ สูงเนิน พระทองคำ) 4 ต. 35 ม. จ.พิจิตร 1 อ. (สากเหล็ก) 4 ต. 17 ม. จ.สุโขทัย 3 อ. (สวรรคโลก ศรีนคร ศรีสันทลย์) 18 ต. 142 ม. จ.พิษณุโลก 3 อ. (วัดโบสถ์ ชาติตระการ เมืองฯ) 11 ต. 80 ม. จ.น่าน 1 อ. (เวียงสา) 1 ต. 2 ม. จ.อุตรดิตถ์ 1 อ. (ท่าปลา) 2 ต. 15 ม. และ จ.ตราด 3 อ. (เขาสมิง บ่อไร่ เมืองฯ) 23 ต. 154 ม. และปิดสถานการณ์บางพื้นที่ คือ จ.ศรีสะเกษ 1 อ. (ขุขันธ์) 4 ต. 36 ม. ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) จำนวน 4 จังหวัด 19 อำเภอ 83 ตำบล 701 หมู่บ้าน ดังนี้

จังหวัด	จำนวน			รายชื่ออำเภอที่ประกาศเขตฯ
	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	
1. เชียงราย	13	63	561	เมืองฯ (5ต. 40ม.) ป่าแดด (5ต. 58ม.) เชียงแสน (6ต. 70ม.) พญาเม็งราย (2ต. 2ม.) แม่สาย (5ต. 14ม.) พาน (13ต. 123ม.) เทิง (7ต. 124ม.) แม่จัน (9ต. 58ม.) เชียงของ (3ต. 14ม.) เวียงชัย (2ต. 20ม.) เวียงแก่น (1ต. 1ม.) ขุนตาล (3ต. 32ม.) ดอยหลวง (2ต. 5ม.)
2. ศรีสะเกษ	3	8	54	ไพรบึง (1ต. 15ม.) ขุนหาญ (4ต. 27ม.) โพธิ์ศรีสุวรรณ (3ต. 12ม.)
3. มหาสารคาม	2	11	79	วาปีปทุม (10ต. 69ม.) พยัคภูมิพิสัย (1ต. 10ม.)
4. ชลบุรี	1	1	7	เกาะสีชัง (1ต. 7ม.)
รวม 4 จังหวัด	19	83	701	
จากทั้งหมด 76 จังหวัด	878	7,255	75,032	
คิดเป็นร้อยละของประเทศ	2.16	1.14	0.93	

ผลกระทบด้านการเกษตร

ด้านพืช 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และน่าน เกษตรกร 24,089 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 139,061 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 41,401 ไร่ พืชไร่ 46,960 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 50,700 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 6 จังหวัด (พิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร ตาก และน่าน) เกษตรกร 6,662 ราย พื้นที่ 39,503 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 45.75 ล้านบาท (ผ่าน ก.ช.ภ.อ. แล้ว 12.73 ล้านบาท) ช่วยเหลือแล้ว 15.21 ล้านบาท

6.2 วาดภัย ช่วงภัย วันที่ 8 ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 35 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี แพร่ ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก เชียงใหม่ นครสวรรค์ ลำพูน เชียงราย น่าน ขอนแก่น หนองคาย เลย บึงกาฬ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ชลบุรี ชัยนาท ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี และสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 12,533 ราย พื้นที่ 31,206 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,651 ไร่ พืชไร่ 15,270 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 14,285 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 29 จังหวัด เกษตรกร 4,255 ราย พื้นที่ 10,252 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 14.25 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 10.48 ล้านบาท

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.3 อุทกภัย ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา (ประกาศเขตฯแล้ว) และจังหวัดตราด (ยังไม่ประกาศเขตฯ) เกษตรกร 49 ราย พื้นที่ 531 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 50 ไร่ พืชไร่ 1 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 480 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.4 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) พะเยา (โรคราบอดหอมแดง) อุตรดิตถ์ (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) และเชียงราย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) เกษตรกร 1,356 ราย พื้นที่ 8,498 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,610 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 888 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 3 จังหวัด เกษตรกร 791 ราย พื้นที่ 1,678 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 2.38 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 1.60 ล้านบาท

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนกระทู้กล้าข้าว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สุรินทร์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ) จำนวน 12,371 ไร่ การระบาดลดลง 653 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนกระทู้กล้า เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีวเวเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำเกษตรกรสำรวจแปลง และแนะนำใช้การตัดใบข้าว เก็บทำลาย และแนะนำให้ตัดหญ้าที่คันนา เพื่อป้องกันกำจัด เพื่อลดปริมาณของหนอนกระทู้กล้าข้าว
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไรแดง 3. เพลี้ยหอย 4. แมลงงูหนวด 5. โรคโคนเน่าหัวเน่า 6. โรคพุ่มแจ้ 7. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ลพบุรี ระยอง ชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี ลำพูน และนครราชสีมา) จำนวน 695 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 113 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กาญจนบุรี จันทบุรี สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และนครราชสีมา) จำนวน 11,366 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 772 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา จันทบุรี สระแก้ว และชลบุรี) จำนวน 407 ไร่ การระบาดลดลง 170 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 145 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 9 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 519 ไร่ การระบาดคงที่ พบอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาด และหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ผลิตขยายแตนเบียน (<i>Anagyrus lopezi</i>) แผลงข้างปีกใส่และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน หวานปูนขาวหรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่แสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าที่ขุดออกหรือกรณีระบาดรุนแรงมาก ให้ใช้สารเคมีฟอสฟิทธิลอลูมิเนียม และในช่วงฝนชุกควรตรวจแปลงทุกวัน - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้แมลงงูหนวด รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน - นำแมลงข้างปีกใส่ปล่อยในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงที่พบการระบาดของโรคด่างอย่างสม่ำเสมอ และให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลัง ในช่วงที่ต้นอ่อนจะกระทบแล้งนาน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
		พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สระแก้ว นครราชสีมา สุรินทร์ ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา) จำนวน 17,321.75 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7,338.25 ไร่	- ให้เกษตรกรสำรวจติดตามการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เมื่อพบต้นที่แสดงอาการให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจในห้องปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งดำเนินการทำลายต้นที่แสดงอาการอื่นๆ ที่จากแปลงปลูกตามมาตรการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด - ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบเพลี้ยหอยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และแช่ท่อนพันธุ์สำหรับการปลูกมันสำปะหลังในฤดูต่อไป เพื่อลดการระบาดและใช้สารเคมีตามที่กรมวิชาการแนะนำ
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนอนยาว 3. แมลงนูนหลวง 4. จักจั่น 5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 6. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) จำนวน 133 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 83 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 60 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 160 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 1,453 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 70 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักด้ และตัวหนอนยาว และใช้เชื้อราบีวเวเรียและเชื้อราเมตาโรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรเฝ้าดินชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ราชบุรี และพะเยา) จำนวน 46,578 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 46,553 ไร่ พบการระบาดในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 446,065 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 154,709 ไร่	- แจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ให้เกษตรกรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง - จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และภูเก็ต) จำนวน 448 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและซุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ตัวแรด	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จำนวน 5,227 ไร่ การระบาดลดลง 41 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด จำนวน 40,942 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด จำนวน 10,159 ไร่ การระบาดลดลง 122 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าว - ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวและการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ปลอยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาโรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก 3. หนอนหน้าแมว 4. ตัวแรด 5. ตัวงูหลาบ 6. หนู	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 57 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 842 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 77 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย เพื่อไม่ให้แหล่งแพร่พันธุ์ของตัวแรดและหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหัวดำ หนอนปลอกเล็ก และหนอนหน้าแมวทำลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย - ปลอยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำและหนอนปลอกเล็กในพื้นที่

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	7. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 140 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กระบี่) จำนวน 45 ไร่ การระบาดคงที่	- ใช้กำดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกุหลาบทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ใช้กำดักล่อหนูตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง และใช้เยื่อโปรโตชีว - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรคราขาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จำนวน 1,119 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เกษตรกรรูดคู่อ้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีไพโรฟิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณที่เป็นโรคราขาวยางพารา
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนเจาะผล 3. โรครากเน่าโคนเน่า 4. โรคราดำ 5. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และตราด) จำนวน 10,289 ไร่ การระบาดลดลง 82 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 6 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ สังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการทำลายของหนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะผล เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด - กำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตักพื้นหลุมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง - แหล่งที่มีการระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึมให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้งห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน - ตัดแต่งผลทุเรียนไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกัน และใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย และควรเริ่มห่อผลทุเรียนตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปด้วยถุงมุ้งไนลอน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่เจาะรูบริเวณขอบล่างเพื่อให้ น้ำระบายออกมาได้ - หากระบาดรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารแลมบ์ดา - ไฮยาโลทริน 2.5% อีซี หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทำลายของหนอนเจาะผลสำหรับในแหล่งที่มีการระบาด ให้พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน โดยพ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ขุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลายแล้วทาผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำและโรคใบไหม้ทุกๆ 3-7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลาม

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
เงาะ	1. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนเงาะอย่างสม่ำเสมอ ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อลดความชื้นภายในทรงพุ่ม ตัดส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลาย และเก็บรวบรวมใบที่เป็นโรคและร่วงหล่นในบริเวณสวนไปเผาทำลาย - เมื่อพบใบแก่ถูกทำลายมากกว่าร้อยละ 30 ตัดต้น แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ 85% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทั้งต้น หรือใช้พ่นป้องกันเป็นระยะๆ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 1 ก.ค. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 1 ก.ค. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 47 จังหวัด 319 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 30 จุด ในพื้นที่ 16 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว นครราชสีมา ยโสธร สุรินทร์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เพชรบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และสตูล

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 77,918 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 4,468 ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 15 - 21 มิ.ย. 62) เกิดโรคในสุนัข 5 ครั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สมุทรสาคร และจังหวัดสงขลา

8.2 โรค布鲁เซลโลซิส (ช่วงวันที่ 15 - 21 มิ.ย. 62) เกิดในแพะ 2 ครั้ง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ และเกิดในแกะ 1 ครั้ง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 จังหวัดราชบุรี

8.3 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

8.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 15 - 21 มิ.ย. 62) พบการระบาด 2 โรค ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 18 ครั้ง
 - ในหมูป่า 2 ครั้ง ที่ประเทศเบลเยียม
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศลาว
 - ในหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศฮังการี
 - ในหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย
 - ในสุกรและหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
 - ในสุกร 3 ครั้ง ที่ประเทศเวียดนาม
- โรค Tilapia lake virus ในปลานิล 1 ครั้ง ที่ประเทศอินเดีย