



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทย ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 7 ก.ค 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 8 ก.ค. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.เชียงกลาง	น่าน	41.5	ฝนตกหนัก
2.	อ.แม่ลำน้อย	แม่ฮ่องสอน	32.5	ฝนตกปานกลาง
3.	อ.เกาะช้าง	ตราด	31.0	ฝนตกปานกลาง
4.	อ.โขงเจียม	อุบลราชธานี	27.0	ฝนตกปานกลาง
5.	อ.สบเมย	แม่ฮ่องสอน	23.0	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.) (ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 37,226 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 13,303 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (45,984 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 8,758 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 86.68 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 128.18 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 38,843 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 35,295 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 11,753 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 25) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (43,170 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 7,875 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 73.44 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 111.79 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 35,631 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	8,932	36	2,187	12	75	1,001	383	58	286	32	83	25,825	9,315	36	2,472	13	16,511
ตอน.	12	8,368	2,747	33	1,097	16	218	1,998	614	52	469	25	230	10,367	3,361	32	1,565	18	7,005
กลาง	3	1,419	168	12	108	8	22	369	110	48	86	25	25	1,788	278	16	194	11	1,510
ตะวันตก	2	26,605	18,041	68	4,764	36	7	142	68	78	59	44	9	26,747	18,109	68	4,823	36	8,638
ตะวันออก	6	1,515	417	28	318	22	51	964	416	54	364	40	57	2,479	833	34	681	29	1,646
ใต้	4	8,194	4,990	61	3,280	51	39	668	340	57	287	47	43	8,863	5,330	60	3,567	50	3,532
รวม	35	70,926	35,295	50	11,753	25	412	5,142	1,931	38	1,550	33	447	76,069	37,226	49	13,303	26	38,843

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8,712 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 2,016 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 11) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 6.64 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 46.34 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,159 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	4,946	37	1,146	12	0.00	0.00	24.00	24.00	8,516
สิริกิติ์	3,546	37	696	10	4.41	2.85	20.00	20.00	5,964
ภูมิพล+สิริกิติ์	8,492	37	1,842	11	4.41	2.85	44.00	44.00	14,480
แควน้อยฯ	159	17	116	13	2.23	2.95	1.30	1.30	780
ป่าสักชลสิทธิ์	61	6	58	7	0.00	0.00	1.04	1.04	899
รวมทั้งหมด	8,712	35	2,016	11	6.64	5.80	46.34	46.34	16,159

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 14 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯแม่กง อุดมธรา (21%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (17%) อ่างฯห้วยหลวง (24%) อ่างฯน้ำพุง (24%) อ่างฯอุบลรัตน์ (24%) อ่างฯลำปาว (29%) อ่างฯลำพระเพลิง (15%) อ่างฯลำนางรอง (24%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (6%) อ่างฯทับเสลา (24%) อ่างฯกระเสียว (23%) อ่างฯขุนด่านฯ (15%) อ่างฯคลองสิียด (14%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (22%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 457 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 471 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.58 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.62 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.66 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.44 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.38 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.38 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 155 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 156 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 115 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 35 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 5 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 7 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 7 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 41 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 38 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 6 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 21 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 146 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 143 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 24 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 46 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 56 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 20 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 71 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 73 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)								เกณฑ์	หมายเหตุ
		1 ก.ค.	2 ก.ค.	3 ก.ค.	4 ก.ค.	5 ก.ค.	6 ก.ค.	7 ก.ค.	8 ก.ค.		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนายนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.23	0.22	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนากมชลประทานสามเสน กทม.	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	0.25	0.24	0.24	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

3. การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562/63

พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 จำนวน 59.00 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562)

จำนวน 10.98 ล้านไร่ รวม 66 จังหวัด แบ่งเป็น ในเขตชลประทาน 61 จังหวัด ปลูกข้าว 5.74 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 56 จังหวัด ปลูกข้าว 5.24 ล้านไร่

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 11 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก กาญจนบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ สระแก้ว และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร (1) ตาก (1) น่าน (4) พะเยา (4) พิจิตร (12) พิษณุโลก (1) ลำพูน (1) ลำปาง (13) เชียงราย (18) อุดรดิตถ์ (2) เพชรบูรณ์ (11) เชียงใหม่ (7) แพร่ (8) สุโขทัย (4)
กลาง	ชัยนาท (1) นครสวรรค์ (3) ลพบุรี (5) สระบุรี (1) สุพรรณบุรี (1) อ่างทอง (1) อุทัยธานี (2)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์ (7) ขอนแก่น (13) ชัยภูมิ (1) นครราชสีมา (13) บุรีรัมย์ (23) ยโสธร (9) ร้อยเอ็ด (4) ศรีสะเกษ (4) สุรินทร์ (12) อำนาจเจริญ (7) อุบลราชธานี (4) มหาสารคาม (1) อุดรธานี (1) เลย (1)
ตะวันออก	ชลบุรี (1) ระยอง (1) สระแก้ว (2) ฉะเชิงเทรา (3)
ใต้	ชุมพร (2) นครศรีธรรมราช (8) พัทลุง (8) สงขลา (2) สุราษฎร์ธานี (1)
รวม	รวม 44 จังหวัด (229 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย จำนวน 17 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมในระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง ทำให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
2. พิษณุโลก	2	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
3. ตาก	2	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ลำปาง (แม่พริก เถิน) พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่มอก จ.ลำปาง (เถิน)
4. กาญจนบุรี	3	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
5. ลพบุรี	2	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
6. นครราชสีมา	1	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
7. ขอนแก่น	2	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
8. อุบลราชธานี	1	มีฝนตกเล็กน้อย บางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.อุบลราชธานี (เดชอุดม นาจะหลวย บุณฑริก น้ำยืน พงศรีอุดม)
9. สุรินทร์	4	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ร้อยเอ็ด (เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ โพนทราย) จ.สุรินทร์ (รัตนบุรี)
10. สระแก้ว	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ ระดับ 0-10,000 ฟุต มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการ (52.2%) ประกอบกับมีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมตลอดวัน ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสไม่พัฒนาตัวในพื้นที่เป้าหมาย
11. สุราษฎร์ธานี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ที่ระดับปฏิบัติการมีค่าต่ำกว่า 60% ประกอบกับสภาพอากาศมีลักษณะทรงตัว ส่งผลทำให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 7 กรกฎาคม 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 121 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 88.82 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 3,168 เที่ยวบิน (4,535:48 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 59 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตรัง ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส พัทลุง และสงขลา

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 101 เครื่อง ในพื้นที่ 18 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 49 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ อุดรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(16) น่าน(6) พะเยา(2) นครราชสีมา(2) สกลนคร(1) กาญจนบุรี(2) นครนายก(4) ปราจีนบุรี(9) ฉะเชิงเทรา(3) ระยอง(1)

- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 52 เครื่อง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย(2) นครราชสีมา(17) บุรีรัมย์(1) เลย(3) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(9) กาญจนบุรี(3)

6. ผลกระทบด้านการเกษตร

6.1 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งฯ แล้ว 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตรวต ชลบุรี อุดรดิตถ์ พิจิตร เชียงราย สุโขทัย และจังหวัดน่าน จำนวน 40 อำเภอ 157 ตำบล 1,232 หมู่บ้าน เนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ได้ประกาศยุติสถานการณ์แล้วในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด 3 อ. (เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ เมืองสรวง) 3 ต. 14 ม. จ.นครราชสีมา 3 อ. (เฉลิมพระเกียรติ สูงเนิน พระทองคำ) 4 ต. 35 ม. จ.พิจิตร 1 อ. (สากเหล็ก) 4 ต. 17 ม. จ.สุโขทัย 3 อ. (สวรรคโลก ศรีนคร ศรีสันทลย์) 18 ต. 142 ม. จ.พิษณุโลก 3 อ. (วัดโบสถ์ ชาติตระการ เมืองฯ) 11 ต. 80 ม. จ.น่าน 1 อ. (เวียงสา) 1 ต. 2 ม. จ.อุดรดิตถ์ 1 อ. (ท่าปลา) 2 ต. 15 ม. และ จ.ตรวต 3 อ. (เขาสมิง บ่อไร่ เมืองฯ) 23 ต. 154 ม. และปิดสถานการณ์บางพื้นที่ คือ จ.ศรีสะเกษ 1 อ. (ขุขันธ์) 4 ต. 36 ม. ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) จำนวน 4 จังหวัด 19 อำเภอ 83 ตำบล 701 หมู่บ้าน ดังนี้

จังหวัด	จำนวน			รายชื่ออำเภอที่ประกาศเขตฯ
	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	
1. เชียงราย	13	63	561	เมืองฯ (5ต. 40ม.) ป่าแดด (5ต. 58ม.) เชียงแสน (6ต. 70ม.) พญาเม็งราย (2ต. 2ม.) แม่สาย (5ต. 14ม.) พาน (13ต. 123ม.) เทิง (7ต. 124ม.) แม่จัน (9ต. 58ม.) เชียงของ (3ต. 14ม.) เวียงชัย (2ต. 20ม.) เวียงแก่น (1ต. 1ม.) ขุนตาล (3ต. 32ม.) ดอยหลวง (2ต. 5ม.)
2. ศรีสะเกษ	3	8	54	ไพรบึง (1ต. 15ม.) ขุนหาญ (4ต. 27ม.) โพธิ์ศรีสุวรรณ (3ต. 12ม.)
3. มหาสารคาม	2	11	79	วาปีปทุม (10ต. 69ม.) พยัญภูมิพิสัย (1ต. 10ม.)
4. ชลบุรี	1	1	7	เกาะสีชัง (1ต. 7ม.)
รวม 4 จังหวัด	19	83	701	
จากทั้งหมด 76 จังหวัด	878	7,255	75,032	
คิดเป็นร้อยละของประเทศ	2.16	1.14	0.93	

ผลกระทบด้านการเกษตร

ด้านพืช 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุดรดิตถ์ ตาก และน่าน เกษตรกร 24,089 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 139,061 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 41,401 ไร่ พืชไร่ 46,960 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 50,700 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 6 จังหวัด (พิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร ตาก และน่าน) เกษตรกร 6,662 ราย พื้นที่ 39,503 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 45.75 ล้านบาท (ผ่าน ก.ช.อ. แล้ว 12.73 ล้านบาท) ช่วยเหลือแล้ว 15.21 ล้านบาท

6.2 วาตภัย ช่วงภัย วันที่ 8 ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 36 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี แพร่ ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุดรดิตถ์ ตาก เชียงใหม่ นครสวรรค์ ลำพูน เชียงราย น่าน ขอนแก่น หนองคาย เลย บึงกาฬ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร อุดรธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี ตรวต ปราจีนบุรี ชลบุรี ชัยนาท ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี สุราษฎร์ธานี และชุมพร เกษตรกร 12,550 ราย พื้นที่ 31,238 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,651 ไร่ พืชไร่ 15,270 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 14,320 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 31 จังหวัด เกษตรกร 4,273 ราย พื้นที่ 10,290 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 14.32 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 10.97 ล้านบาท

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.3 อุทกภัย ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา (ประกาศเขตฯแล้ว) และจังหวัดตรัง (ยังไม่ประกาศเขตฯ) เกษตรกร 49 ราย พื้นที่ 531 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 50 ไร่ พืชไร่ 1 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 480 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.4 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) พะเยา (โรคราบอดหอมแดง) อุตรดิตถ์ (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) และเชียงราย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) เกษตรกร 1,356 ราย พื้นที่ 8,498 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,610 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 888 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 3 จังหวัด เกษตรกร 791 ราย พื้นที่ 1,678 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 2.38 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 1.60 ล้านบาท

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนกระทู้กล้าข้าว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อำนาจเจริญ) จำนวน 252 ไร่ การระบาดลดลง 12,119 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนกระทู้กล้า เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำเกษตรกรสำรวจแปลง ใช้การตัดใบข้าว เก็บทำลาย และตัดหญ้าที่คั่นนาในการป้องกันกำจัด เพื่อลดปริมาณของหนอนกระทู้กล้าข้าว
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไรแดง 3. แมลงนูนหลวง 4. เพลี้ยหอย 5. โรคโคนเน่าหัวเน่า 6. โรคพุ่มแจ้ 7. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ลำพูน นครราชสีมา ลพบุรี ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 678 ไร่ การระบาดลดลง 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (นครราชสีมา ลพบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และกาญจนบุรี) จำนวน 11,366 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 145 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ลพบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 407 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 9 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี และ สระแก้ว) จำนวน 519 ไร่ การระบาดคงที่ พบอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส <i>Cassava mosaic virus</i> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว) จำนวน 18,774 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,452.25 ไร่	- สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณะชน เกี่ยวกับโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ - จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัด - สำรวจสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังร่วมกับกรมวิชาการเกษตร - ให้เกษตรกรสำรวจแปลงสม่ำเสมอ และให้เจ้าหน้าที่สุ่มสำรวจและติดตามการระบาดในแปลงที่พบอาการแบบครอบคลุมพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ - วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาดเสียหาย - ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงหิวข้าวพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลัง ในช่วงที่ต้นอ่อนจะกระทบแล้งนาน - แยกท่อนพันธุ์สำหรับการปลูกมันสำปะหลังในฤดูต่อไป เพื่อลดการระบาดของเพลี้ยหอย เมื่อเกิดการระบาดแล้วแนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีตามที่กรมวิชาการแนะนำ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนวดยาว 3. แมลงงูหนวด 4. จักจั่น 5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 6. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) จำนวน 133 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 60 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 160 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 420 ไร่ การระบาดลดลง 1,033 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 70 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงงูหนวด ดักแด้ และตัวหนวดยาว และใช้เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตตาโรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ลำปาง พะเยา เลย สระบุรี และราชบุรี) จำนวน 67,212 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 20,634 ไร่ อยู่ระหว่างการสำรวจ	- แจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ให้เกษตรกรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง - จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และภูเก็ต) จำนวน 493 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 45 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและซุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงค้ำหนาม 3. ตัวแรด 4. หนอนพาราซ่า	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จำนวน 5,227 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด จำนวน 41,446 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 504 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด จำนวน 10,537 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 378 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร) จำนวน 3 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าว - ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนพาราซ่าทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง - ปลอยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงค้ำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาโรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ให้เกษตรกรดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้แหล่งแพร่พันธุ์ของตัวแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก 3. หนอนหน้าแมว 4. ตัวแรด 5. ตัวงูทาบ 6. หนู	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ปทุมธานี และสงขลา) จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 60 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สงขลา ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 902 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 60 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 52 ไร่ การระบาดลดลง 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 140 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย เพื่อไม่ให้แหล่งแพร่พันธุ์ของตัวแรด และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหัวดำ หนอนปลอกเล็ก และหนอนหน้าแมวทำลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย - ปลอยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำและหนอนปลอกเล็กในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาโรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	7. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร และกระบี่) จำนวน 132 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 87 ไร่	- สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกุหลาบทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ใช้กับดักล่อตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง และใช้เยื่อโปรโตชีว - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรครากขาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และปัตตานี) จำนวน 989 ไร่ การระบาดลดลง 130 ไร่	- ให้เกษตรกรขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีฟิโพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณที่เป็นโรครากขาวยางพารา
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนเจาะผล 3. โรครากเน่าโคนเน่า 4. โรคราดำ 5. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง และ ชุมพร) จำนวน 10,350 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 61 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 6 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ สังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการทำลายของหนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะผล เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด - กำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตักพื้นหลุมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง - แหล่งที่มีการระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึมให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้งห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุก 3 เดือน - ตัดแต่งผลทุเรียนไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกัน และใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย และควรเริ่มห่อผลทุเรียนตั้งแต่มีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปด้วยถุงมุ้งไนลอน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่เจาะรูบริเวณขอบล่างเพื่อให้น้ำระบายออกมาได้ - หากระบาดรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทำลายของหนอนเจาะผลสำหรับในแหล่งที่มีการระบาด ให้พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน โดยพ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลายแล้วทาผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำและโรคใบไหม้ทุกๆ 3-7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลาม
เงาะ	1. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนเงาะอย่างสม่ำเสมอ ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อลดความชื้นภายในทรงพุ่ม ตัดส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลาย และเก็บรวบรวมใบที่เป็นโรคและร่วงหล่นในบริเวณสวนไปเผาทำลาย - เมื่อพบใบแก่ถูกทำลายมากกว่าร้อยละ 30 ตัดต้นแนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทั้งต้น หรือใช้พ่นป้องกันเป็นระยะๆ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 5 ก.ค. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 5 ก.ค. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 321 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 28 จุด ในพื้นที่ 16 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว นครราชสีมา ยโสธร สุรินทร์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และสตูล

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 93,360 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 4,571 ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 15 - 21 มิ.ย. 62) เกิดโรคในสุนัข 5 ครั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สมุทรสาคร และจังหวัดสงขลา

8.2 โรค布鲁เซลเลซิส (ช่วงวันที่ 15 - 21 มิ.ย. 62) เกิดในแพะ 2 ครั้ง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ และเกิดในแกะ 1 ครั้ง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 จังหวัดราชบุรี

8.3 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

8.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 15 - 21 มิ.ย. 62) พบการระบาด 2 โรค ดังนี้

- โรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกร 18 ครั้ง
 - ในหมูป่า 2 ครั้ง ที่ประเทศเบลเยียม
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศลาว
 - ในหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศฮังการี
 - ในหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศสโลวีเนีย
 - ในสุกรและหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
 - ในสุกร 3 ครั้ง ที่ประเทศเวียดนาม
- โรค Tilapia lake virus ในปลานิล 1 ครั้ง ที่ประเทศอินเดีย