ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com
http://www.moac.go.th

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ


1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

"พายุโซนร้อน "วิภา" (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562)" ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันนี้ (1 ส.ค. 62) พายุโซนร้อน "วิภา" มีศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะไหหลำ ประเทศจีน หรือที่ละติจูด 20.1 องศาเหนือ ลองจิจูด 110.5 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 พายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเกาะไหหลำ ประเทศจีนตอนใต้ และประเทศเวียดนามตอนบน ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วย

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเล อันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 31 ก.ค. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 1 ส.ค. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.เชียงกลาง	น่าน	265.0	ฝนตกหนักมาก
2.	อ.เชียงม่วน	พะเยา	94.5	ฝนตกหนักมาก
3.	อ.ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	90.5	ฝนตกหนักมาก
4.	อ.หนองม่วงไข่	แพร่	75.5	ฝนตกหนัก
5.	อ.บ้านหลวง	น่าน	75.0	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค. 62)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 35,695 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 11,803 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (52,094 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 16,399 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 145.80 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 109.40 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 40,373 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 33,887 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 10,374 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 22) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (48,909 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 15,021 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 129.50 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 94.17 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 37,039 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุที่ รนก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุที่ รนก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุที่ รนก.	ปริมาตรน้ำ				(ล้าน ม.^{3})
			ในอ่างฯ	% รนก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รนก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รนก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	7,943	32	1,198	7	75	1,001	333	60	236	26	83	25,825	8,276	32	1,434	8	17,549
ตอน.	12	8,368	2,618	31	997	15	218	1,998	587	66	443	24	230	10,367	3,205	31	1,440	17	7,161
กลาง	3	1,419	139	10	79	6	22	369	104	48	80	23	25	1,788	243	14	158	9	1,545
ตะวันตก	2	26,605	17,984	68	4,707	35	7	142	67	70	58	44	9	26,747	18,051	67	4,765	35	8,696
ตะวันออก	6	1,515	410	27	311	22	51	964	392	61	340	37	57	2,479	802	32	651	28	1,676
ใต้	4	8,194	4,793	58	3,082	48	39	668	325	57	272	44	43	8,863	5,118	58	3,355	47	3,745
รวม	**35**	**70,926**	**33,887**	**48**	**10,374**	**22**	**412**	**5,142**	**1,808**	**35**	**1,429**	**30**	**447**	**76,069**	**35,695**	**47**	**11,803**	**23**	**40,373**

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 7,741 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 31 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 1,045 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 6) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 18.13 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 37.18 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,130 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	รับได้อีก
ภูมิพล	4,383	33	583	6	1.66	4.06	21.00	21.00	9,079
สิริกิติ์	3,207	34	357	5	15.84	7.77	14.01	13.87	6,303
ภูมิพล+สิริกิติ์	**7,590**	**33**	**940**	**6**	**17.50**	**11.83**	**35.01**	**34.87**	**15,382**
แควน้อยฯ	117	12	74	8	0.63	0.96	1.73	1.73	822
ป่าสักชลสิทธิ์	34	4	31	3	0.00	0.00	0.44	0.44	926
รวมทั้งหมด	**7,741**	**31**	**1,045**	**6**	**18.13**	**12.79**	**37.18**	**37.04**	**17,130**

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 25 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (6%) อ่างฯสิริกิติ์ (5%) อ่างฯแม่งัดสมบูรณ์ชล (26%) อ่างฯแม่กวงอุดมธารา (12%) อ่างฯกิ่วคอหมา (20%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (8%) อ่างฯแม่มอก (17%) อ่างฯห้วยหลวง (17%) อ่างฯน้ำพุง (16%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (4%) อ่างฯอุบลรัตน์ (-2%) อ่างฯลำปาว (19%) อ่างฯลำพระเพลิง (14%) อ่างฯมูลบน (22%) อ่างฯลำแซะ (24%) อ่างฯลำนางรอง (18%) อ่างฯสิรินธร (14%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (3%) อ่างฯทับเสลา (14%) อ่างฯกระเสียว (11%) อ่างฯวชิราลงกรณ (26%) อ่างฯขุนด่านฯ (15%) อ่างฯคลองสียัด (6%) อ่างฯบางพระ (29%) อ่างฯนฤบดินทรจินดา (17%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทึง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำบางประกง แม่น้ำท่าตะเภา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 275 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 271 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.90 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.30 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.50 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.40 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.51 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.51 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 100 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 97 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 74 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 20 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 6 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 3 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 3 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 16 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 17 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 3 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 10 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 92 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 92 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอู่ทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง) 9 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 30 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 41 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 12 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 65 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 64 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)								เกณฑ์	หมายเหตุ
		25 ก.ค.	26 ก.ค.	27 ก.ค.	28 ก.ค.	29 ก.ค.	30 ก.ค.	31 ก.ค.	1 ส.ค.		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.26	ปกติ	
เจ้าพระยา	ท่าน้ำกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.24	0.24	0.25	0.26	0.28	0.27	0.29	0.35	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 31 ก.ค.62	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	3.07	-9.73
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	6.54	-9.46
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	2.96	-9.24
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	2.87	-9.13
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	3.47	-9.03
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	4.49	-10.01

หมายเหตุ : -ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562/63

สถานการณ์เพาะปลูกพืชสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562)

เพาะปลูกพืชสำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน รวมทั้งหมด 72,750,126 ไร่ แบ่งเป็น

จังหวัด	พื้นที่ทั้งหมด			รวมพื้นที่ปลูกแล้ว (ไร่)		
	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	รวม	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	รวม
ข้าว	13,034,034	47,614,995	60,649,030	10,186,640	40,175,052	50,361,692
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	178,421	5,657,771	5,836,192	142,654	4,255,140	4,397,794
มันสำปะหลัง	83,724	9,242,771	9,326,495	62,272	8,224,922	8,287,194
อ้อยโรงงาน	1,012,267	9,728,124	10,740,391	899,201	8,804,244	9,703,445
รวมทั้งหมด	**14,308,447**	**72,243,661**	**86,552,108**	**11,290,767**	**61,459,359**	**72,750,126**

ที่มา : (ศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร)

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 11 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก กาญจนบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ สระแก้ว และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร (6) พะเยา (5) พิษณุโลก (5) ลำปาง (8) อุตรดิตถ์ (5) พิจิตร (7) เชียงราย (13) เชียงใหม่ (14) เพชรบูรณ์ (9) แพร่ (5) น่าน (15) ลำพูน (8) สุโขทัย (3) แม่ฮ่องสอน (6) ตาก (1)
กลาง	กาญจนบุรี (4) ชัยนาท (4) นครสวรรค์ (10) สระบุรี (7) ปทุมธานี (1) ลพบุรี (9) สุพรรณบุรี (2) อุทัยธานี (7) สิงห์บุรี (2)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์ (9) ขอนแก่น (18) นครราชสีมา (21) บุรีรัมย์ (23) มหาสารคาม (13) มุกดาหาร (7) ยโสธร (5) ร้อยเอ็ด (16) ศรีสะเกษ (12) สุรินทร์ (10) หนองคาย (1) เลย (14) อุดรธานี (21) อุบลราชธานี (7) ชัยภูมิ (8) สกลนคร (13) หนองบัวลำภู (1) นครพนม (1) อำนาจเจริญ (7)
ตะวันออก	จันทบุรี (1) ฉะเชิงเทรา (5) ชลบุรี (4) ระยอง (1) สระแก้ว (5) ปราจีนบุรี (3)
ใต้	ชุมพร (2) นครศรีธรรมราช (11) พัทลุง (8) สงขลา (4) ราชบุรี (1) เพชรบุรี (1) กระบี่ (1) ประจวบคีรีขันธ์ (1)
รวม	**รวม 57 จังหวัด (411 อำเภอ)**

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย จำนวน 17 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	-	**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ชุดบินของกองทัพอากาศและตรวจซ่อมอากาศยานประจำสัปดาห์
2. พิษณุโลก	-	**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากลมมีกำลังแรง ประกอบกับมีเมฆชั้นกลางปกคลุมเต็มท้องฟ้า และมีฝนละอองตกเป็นระยะ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตัวของเมฆในแนวตั้ง
3. ตาก	2	**มีฝนตกเล็กน้อย** บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กำแพงเพชร (คลองลาน คลองขลุง)
4. กาญจนบุรี	6	**มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่** บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สุพรรณบุรี (ด่านช้าง หนองหญ้าไซ อู่ทอง ดอนเจดีย์ สามชุก เดิมบางนางบวช) จ.กาญจนบุรี (เลาขวัญ หนองปรือ ศรีสวัสดิ์) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน
5. ลพบุรี	4	**มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง** บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท สรรคบุรี สรรพยา หันคา) จ.สิงห์บุรี (อินทร์บุรี) จ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี โคกสำโรง สระโบสถ์ ชัยบาดาล หนองม่วง บ้านหมี่ พัฒนานิคม) จ.นครสวรรค์ (ตาคลี ตากฟ้า บรรพตพิสัย ลาดยาว เก้าเลี้ยว ชุมแสง) จ.กำแพงเพชร (ขาณุวรลักษบุรี) จ.พิจิตร (โพทะเล บางมูลนาก) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม)
6. นครราชสีมา	-	**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากลมระดับผิวพื้น-ลมระดับบนมีกำลังแรง ประกอบกับเมฆชั้นกลาง-ชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้า มีฝนละอองตกเป็นระยะ
7. ขอนแก่น	2	**มีฝนตกเล็กน้อย** บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น (มัญจาคีรี บ้านไผ่) จ.ชัยภูมิ (แก้งคร้อ)
8. อุบลราชธานี	-	**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากเมฆชั้นกลาง-ชั้นสูง ปกคลุมเต็มท้องฟ้า มีฝนละอองบริเวณสนามบินและบริเวณโดยรอบเป็นระยะ
9. สุรินทร์	3	**มีฝนตกเล็กน้อย** บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์ (นางรอง เฉลิมพระเกียรติ ประโคนชัย)
10. สระแก้ว	-	**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากท้องฟ้ามีเมฆชั้นสูงปกคลุม ตลอดวันประกอบกับลมที่ระดับปฏิบัติการมีกำลังแรงส่งผล ให้เมฆคิวมูลัสไม่พัฒนาตัวในพื้นที่เป้าหมาย
11. สุราษฎร์ธานี	-	**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากกองทัพอากาศสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ชุดบินของกองทัพอากาศ เพื่อไปปฏิบัติงานที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.สงขลา และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.สุราษฎร์ธานี จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อไปตั้งหน่วยปฏิบัติการฝน จ.สงขลา

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 145 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 88.21 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 3,989 เที่ยวบิน (5,724:38 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนราธิวาส

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 1,935 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค และอุทกภัย จำนวน 214 เครื่อง ในพื้นที่ 35 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 138 เครื่อง ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(2) ลำพูน(2) แม่ฮองสอน(1) อุตรดิตถ์(2) พิจิตร(11) ลำปาง(16) น่าน(6) พะเยา(2) พิษณุโลก(6) แพร่(6) ตาก(3) กำแพงเพชร(9) นครราชสีมา(8) บุรีรัมย์(1) ศรีสะเกษ(1) สกลนคร(4) อำนาจเจริญ(6) ยโสธร(2) อุบลราชธานี(2) เลย(4) อุดรธานี(2) หนองคาย(4) นครนายก(4) ปราจีนบุรี(7) ตราด(4) ฉะเชิงเทรา(1) ระยอง(1) ราชบุรี(4) นครสวรรค์(17)
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 76 เครื่อง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย(2) นครราชสีมา(16) บุรีรัมย์(8) เลย(5) สกลนคร(2) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(5) สุพรรณบุรี(17) พระนครศรีอยุธยา(2) อ่างทอง(2)

6. ผลกระทบด้านการเกษตร

6.1 ภาวะฝนแล้ง ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน

- ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสุรินทร์
- ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิฯ (อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าฯ ลงนามในประกาศ)

ด้านพืช 1 จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร 290 ราย พื้นที่ 4,125 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ (มันสำปะหลัง) 4,125 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.2 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) พะเยา (โรคระบาดหอมแดงและหนอนกระทู้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) อุตรดิตถ์ (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) และเชียงราย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) เกษตรกร 9,221 ราย พื้นที่ 62,646 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,338 ไร่ พืชไร่ 53,972 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,336 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว 3 จังหวัด เกษตรกร 3,106 ราย พื้นที่ 18,779 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 22.01 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 1.60 ล้านบาท**

6.3 วาตภัย ช่วงภัย วันที่ 8 ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 38 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี แพร่ ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก เชียงใหม่ นครสวรรค์ ลำพูน เชียงราย น่าน ขอนแก่น หนองคาย เลย บึงกาฬ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร อุดรธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร และปัตตานี เกษตรกร 12,665 ราย พื้นที่ 31,481 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,697 ไร่ พืชไร่ 15,340 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 14,445 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว 33 จังหวัด เกษตรกร 4,358 ราย พื้นที่ 10,315 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 14.44 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 14.08 ล้านบาท**

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.4 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – พ.ค. 62

ด้านพืช 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และน่าน เกษตรกร 22,710 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 133,928 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 35,881 ไร่ พืชไร่ 49,333 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 48,714 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว 7 จังหวัด เกษตรกร 8,575 ราย พื้นที่ 49,495 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 58.33 ล้านบาท แบ่งเป็น อยู่ระหว่างของบปลัดฯ เสนอกรมแล้ว 19.27 ล้านบาท รอประชุม ก.ช.ภ.จ. 2.44 ล้านบาท อยู่ระหว่าง อบต. ช่วยเหลือ 2.72 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 22.39 ล้านบาท**

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. แมลงหล่า 2. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สระบุรี) จำนวน 200 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 200 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (มุกดาหาร) จำนวน 87 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 87 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนกระทู้กล้า เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้แสงไฟฟ้าล่อแมลงและทำลายในช่วงที่มีการระบาด เนื่องจากแมลงหล่าชอบบินมาเล่นแสงไฟเวลากลางคืน และกำจัดวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นในนาข้าว เพื่อให้นาข้าวโปร่ง แสงแดดส่องถึงโคนต้นข้าว ทำให้สภาพนาข้าวไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของแมลงหล่า - ให้เกษตรกรดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ และไขน้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวอายุ 6-7 วันหลังหว่าน ใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไรแดง 3. แมลงนูนหลวง 4. เพลี้ยหอย 5. โรคโคนเน่าหัวเน่า 6. โรคพุ่มแจ้ 7. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ลำพูน นครราชสีมา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว) จำนวน 658 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และกาญจนบุรี) จำนวน 11,366 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 85 ไร่ การระบาดลดลง 60 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 407 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 16 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 529 ไร่ การระบาดคงที่ พบอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส *Cassava mosaic virus* พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว) จำนวน 19,229.75 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 455.75 ไร่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน *Anagyrus lopezi* แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน ให้หว่านปูนขาวหรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโครเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออกหรือกรณีแสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าระบาดรุนแรงมากใช้สารเคมีฟอสอีทิล อลูมิเนียม อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ราดต้นละ 300 ซีซี หรือพ่นอัตรา 150 กรัมต่อไร่ สำรวจติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงฝนชุกควรตรวจแปลงทุกวัน - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน และให้หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด - จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			สำนักงานเกษตรจังหวัดและรายงานผลการสำรวจติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์ - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณะชนเกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ - วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาด - ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงหวี่ขาวพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาด
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ด้วงหนวดยาว 3. แมลงนูนหลวง 4. จักจั่น 5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 6. โรคใบขาว	ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 133 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 40 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 160 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 3,713 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2,260 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 70 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และด้วงหนวดยาว และใช้เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินขุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก **2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)**	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ลำปาง พะเยา เชียงราย เลย และราชบุรี) จำนวน 34,966 ไร่ การระบาดลดลง 9,014 ไร่ พื้นที่ระบาด 50 จังหวัด จำนวน 1,127,733 ไร่ การระบาดลดลง 23,640 ไร่	- แจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ให้เกษตรกรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง - จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และภูเก็ต) จำนวน 494 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและชุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ - รณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ด้วงแรด 4. หนอนพาราซ่า	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จำนวน 5,095 ไร่ การระบาดลดลง 18 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด จำนวน 26,250 ไร่ การระบาดลดลง 15,210 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด จำนวน 10,510 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 3 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าว - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนพาราซ่าทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปล่อยแตนเบียนบราคอน (*Bracon hebetor*) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (*Asecodes hispinarum*) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กำดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (*Metarhizium anisopliae*) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร และสงขลา) จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหัวดำ หนอนปลอกเล็ก และหนอนหน้าแมวทำลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย - ใช้กำดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (*Metarhizium anisopliae*) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกุหลาบทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
	2. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 59 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	
	3. หนอนหน้าแมว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่	
	4. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สงขลา ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 1,018 ไร่ การระบาดคงที่	
	5. ด้วงกุหลาบ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่	
	6. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชุมพร และกระบี่) จำนวน 132 ไร่ การระบาดคงที่	
ยางพารา	1. โรครากขาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และปัตตานี) จำนวน 1,100 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เกษตรกรขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีโพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้นราดบริเวณที่เป็นโรครากขาวยางพารา
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่	- **โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน** แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - **หนอนเจาะลำต้นทุเรียน** แนะนำให้สังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการทำลายของหนอนเจาะลำต้น เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด กำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลวมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนเจาะลำต้นทุเรียนรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึมให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน - **หนอนเจาะผลทุเรียน** ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจผลทุเรียนภายในสวน หากพบร่องรอยทำลายของหนอนเจาะผลทุเรียนให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลายทิ้ง ตัดแต่งผลทุเรียนไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกัน ใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย และเริ่มห่อผลทุเรียนตั้งแต่มีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปด้วยถุงมุ้งไนล่อน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่เจาะรูบริเวณขอบล่างเพื่อให้น้ำระบายออกมาได้ หากการระบาดของหนอนเจาะผลทุเรียนรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารแลมบ์ดา - ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
	2. หนอนเจาะผล	ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 2 ไร่	
	3. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และชุมพร) จำนวน 10,374 ไร่ การระบาดคงที่	
	4. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 6 ไร่ การระบาดคงที่	
	5. โรคใบไหม้	ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 1 ไร่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทำลายของหนอนเจาะผล สำหรับในแหล่งที่มีการระบาด ให้พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน โดยพ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน - **โรคราดำ** ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำและโรคใบไหม้ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ
เงาะ	1. โรคใบจุดสาหร่าย	ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดคงที่	

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 29 ก.ค. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 29 ก.ค. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 331 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 20 จุด ในพื้นที่ 13 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง นครราชสีมา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 93,833 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 4,678 ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 13 – 19 ก.ค. 62) เกิดโรคในสุนัข 5 ครั้ง และในโค 1 ครั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา

8.2 ไม่มีรายงานโรคปากและเท้าเปื่อยในสัปดาห์นี้

8.3 ไม่มีรายงานโรคระบาดสัตว์อื่นๆ ในสัปดาห์นี้

8.4 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

8.5 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 13 – 19 ก.ค. 62) พบการระบาด 5 โรค ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 50 ครั้ง
  - ในสุกรและหมูป่า 3 ครั้ง ที่ประเทศบัลแกเรีย
  - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศจีน
  - ในหมูป่า 5 ครั้ง ที่ประเทศฮังการี
  - ในหมูป่า 2 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์
  - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศลาว
  - ในหมูป่า 6 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย
  - ในหมูป่า 3 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์
  - ในสุกรและหมูป่า 21 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
  - ในหมูป่า 3 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน
  - ในสุกรและหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย
  - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน
- โรค sheep pox and goat pox ในแกะ 2 ครั้ง ที่ประเทศคาซัคสถาน
- โรคเวสต์ไนล์ ในม้า 1 ครั้ง ที่ประเทศกรีซ
- โรควัวบ้า ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศสเปน
- โรคหลอดเลือดแดงอักเสบ ในม้า 1 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์

8.6 โรคไข้หวัดใหญ่ (H1N1) ในคน กระทรวงสาธารณสุข ประเทศเมียนมาร์ รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้เสียชีวิต 59 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 296 ราย