



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

“ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8-11 ส.ค.62)” ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ในช่วงวันที่ 8-11 ส.ค.62 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย โดยมีผลกระทบตามภาคดังนี้

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 มีฝนตกหนักบางแห่ง

ภาคตะวันออก : จังหวัดจันทบุรี และตราด

ภาคใต้ : จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

ภาคตะวันออก : จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้ : จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 มีฝนหนักบางแห่ง


ภาคตะวันออก : จังหวัดจันทบุรี และตราด

ภาคใต้ : จังหวัดระนอง พังงา ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 7 ส.ค. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 8 ส.ค. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.แม่ลาน้อย	แม่ฮ่องสอน	36.5	ฝนตกหนัก
2.	อ.หนองพอก	ร้อยเอ็ด	27.5	ฝนตกปานกลาง
3.	อ.โซ่พิสัย	บึงกาฬ	27.0	ฝนตกปานกลาง
4.	อ.กุตุชุม	ยโสธร	25.0	ฝนตกปานกลาง
5.	อ.ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	24.5	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 62)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 36,650 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 12,767 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (52,787 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 16,137 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 320.69 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 88.33 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 39,418 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 34,817 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 11,313 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (49,688 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 14,871 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 297.43 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 75.27 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 36,109 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	8,157	33	1,412	8	75	1,001	350	35	253	28	83	25,825	8,507	33	1,666	9	17,318
ตอน.	12	8,368	2,619	31	1,007	15	218	1,998	575	29	431	23	230	10,367	3,194	31	1,437	17	7,172
กลาง	3	1,419	132	9	72	5	22	369	101	27	77	22	25	1,788	233	13	149	9	1,555
ตะวันออก	2	26,605	18,630	70	5,353	40	7	142	67	47	58	43	9	26,747	18,697	70	5,411	40	8,050
ตะวันออก	6	1,515	415	27	316	22	51	964	418	43	366	40	57	2,479	833	34	681	29	1,646
ใต้	4	8,194	4,863	59	3,153	49	39	668	322	48	270	44	43	8,863	5,185	59	3,423	48	3,677
รวม	35	70,926	34,817	49	11,313	24	412	5,142	1,833	36	1,454	31	447	76,069	36,650	48	12,767	24	39,418

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,920 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 1,224 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 7) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 93.82 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 28.23 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,951 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	4,340	32	540	6	39.67	43.03	13.00	16.00	9,122
สิริกิตี	3,439	36	589	9	52.54	83.99	13.92	14.00	6,071
ภูมิพล+สิริกิตี	7,779	34	1,129	7	92.21	127.02	26.92	30.00	15,193
แควน้อยฯ	114	12	71	8	1.61	1.26	1.04	1.04	825
ป่าสักชลสิทธิ์	28	3	25	3	0.00	0.00	0.27	0.27	932
รวมทั้งหมด	7,920	32	1,225	7	93.82	128.28	28.23	31.31	16,951

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 24 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (6%) อ่างฯสิริกิตี (9%) อ่างฯแม่จัดสมบูรณ์ชล (30%) อ่างฯแม่กวอดมธราธา (14%) อ่างฯก๊วคหมา (24%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (8%) อ่างฯแม่มอก (17%) อ่างฯห้วยหลวง (18%) อ่างฯน้ำพุ (17%) อ่างฯจุฬารักษ์ (4%) อ่างฯอุบลรัตน์ (-2%) อ่างฯลำปาว (17%) อ่างฯลำพระเพลิง (13%) อ่างฯมูลบน (20%) อ่างฯลำแะ (22%) อ่างฯลำนางรอง (15%) อ่างฯสิรินธร (20%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (3%) อ่างฯทับเสลา (14%) อ่างฯกระเสียว (11%) อ่างฯขุนด่านฯ (16%) อ่างฯคลองสิียด (5%) อ่างฯบางพระ (27%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (19%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำยม ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ

แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิฐ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 244 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 237 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.76 ม.รทก.

ต่ำกว่าตลิ่ง 8.44 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.12 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.12 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.51 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.51 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 84 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 83 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 60 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 19 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 5 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 3 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 4 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 16 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 17 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 3 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีสวภาค) 9 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 127 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 126 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 9 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 55 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 55 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 8 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 69 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)								เกณฑ์	หมายเหตุ
		1 ส.ค.	2 ส.ค.	3 ส.ค.	4 ส.ค.	5 ส.ค.	6 ส.ค.	7 ส.ค.	8 ส.ค.		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแล จ.ปทุมธานี	0.19	0.20	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.26	0.27	0.28	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.35	0.49	0.74	0.83	0.80	0.68	0.62	0.50	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 7 ส.ค. 62	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.92	-9.88
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	8.74	-7.26
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	5.97	-6.23
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	4.33	-7.67
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	4.65	-7.85
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	5.25	-9.25

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562/63

สถานการณ์เพาะปลูกพืชสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562)

เพาะปลูกพืชสำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน รวมทั้งหมด 76,222,847 ไร่ แบ่งเป็น

จังหวัด	เนื้อที่ปลูกแล้ว (ไร่)					
	เนื้อที่ปลูกแล้วทั้งหมด			ปลูกแล้วเสียหายสิ้นเชิง		
	ในเขต ขป.	นอกเขต ขป.	รวม	ในเขต ขป.	นอกเขต ขป.	รวม
รวมทั้งประเทศ	11,776,432	64,446,415	76,222,847	5,906	467,975	473,881
ข้าว	10,579,073	42,112,200	52,691,273	5,293	292,795	298,088
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	143,166	4,491,623	4,634,789	607	132,835	133,442
มันสำปะหลัง	70,787	8,572,352	8,643,139	6	32,778	32,784
อ้อย	983,406	9,270,240	10,253,646	0	9,567	9,567

(ที่มา : ศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งฝนทั้งช่วง ปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร)

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 11 หน่วย ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก กาญจนบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ สระแก้ว และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร (2) ตาก (1) สุโขทัย (2) อุตรดิตถ์ (9) เชียงราย (3) เชียงใหม่ (4) แพร่ (1) น่าน (2) พิษณุโลก (2) เพชรบูรณ์ (3) พิจิตร (2)
กลาง	กาญจนบุรี (2) นครสวรรค์ (6) สิงห์บุรี (5) อุทัยธานี (3) ลพบุรี (4) สุพรรณบุรี (1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา (33) บุรีรัมย์ (4)หนองคาย (1) ขอนแก่น (9) ชัยภูมิ (17) ศรีสะเกษ (22) อำนาจเจริญ (1) กาฬสินธุ์ (7) ยโสธร (1) ร้อยเอ็ด (4) สุรินทร์ (5) อุตรธานี (4) มหาสารคาม (6) มุกดาหาร (3) เลย (1)
ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา (4) ระยอง (1) สระแก้ว (3) ปราจีนบุรี (7)
ใต้	นครศรีธรรมราช (5) พัทลุง (7) ราชบุรี (1) สงขลา (4) เพชรบุรี (1)
รวม	รวม 41 จังหวัด (203 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย จำนวน 16 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	1	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
2. พิษณุโลก	1	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พิจิตร (สาขเหล็ก)
3. ตาก	2	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลตอนล่าง จ.ตาก (สามเงา)
4. กาญจนบุรี	3	มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ บริเวณพื้นที่พื้นที่การเกษตร จ.สุพรรณบุรี (ด่านช้าง) จ.กาญจนบุรี (ศรีสวัสดิ์ หนองปรือ เลาชั่วญ) และบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเตื่อ
5. ลพบุรี	2	มีฝนตกเล็กน้อยเป็นแห่งๆ บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.อุทัยธานี (ลานสัก ห้วยคน บ้านไร่ เมืองอุทัยธานี) จ.ชัยนาท (สรรพยา วัดสิงห์) จ.นครสวรรค์ (ตาคลี) และบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว
6. นครราชสีมา	1	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
7. ขอนแก่น	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมผิวพื้นและลมชั้นบนมีกำลังแรง ทำให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาตัวช้า
8. อุบลราชธานี	3	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่เกษตร จ.อุบลราชธานี (เขื่อนใน ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล) จ.ศรีสะเกษ (ศีลาลาด ราศีไศล) จ.ยโสธร (กุดชุม ทรายมูล ป่าตัว คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย ไทยเจริญ เลิงนกทา เมืองยโสธร) และ จ.อำนาจเจริญ (ห้วยตะพาน เสนางคนิคม ลืออำนาจ ปทุมราชวงศา เมืองอำนาจเจริญ พนา) และบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
9. สุรินทร์	3	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
10. สระแก้ว	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากทั้งฟ้ามีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมตลอดวัน ประกอบกับมวลอากาศมีลักษณะทรงตัว ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสไม่พัฒนาตัวในพื้นที่เป้าหมาย
11. สงขลา	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้า รอสันับสนุนเครื่องบินจากกองทัพอากาศ และช่วงบ่ายเมฆชั้นกลางปกคลุมเต็มท้องฟ้า ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 7 สิงหาคม 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 150 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 87.91 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 4,058 เที่ยวบิน (3,409:05 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุตรธานี นครพนม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนราธิวาส

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 1,935 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค และอุทกภัย จำนวน 235 เครื่อง ในพื้นที่ 35 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 156 เครื่อง ในพื้นที่ 30 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(2) ลำพูน(2) แม่ฮ่องสอน(1) อุตรดิตถ์(2) พิจิตร(11) ลำปาง(16) น่าน(6) พะเยา(2) พิษณุโลก(6)แพร่(6) ตาก(6) กำแพงเพชร(10) สุโขทัย(6) นครราชสีมา(11) บุรีรัมย์(3) ศรีสะเกษ(1) สกลนคร(4) อำนาจเจริญ(6) ยโสธร(1) อุบลราชธานี(5) เลย(3) อุดรธานี(2) หนองคาย(4) นครนายก(5) ปราจีนบุรี(8) ตราด(4) ฉะเชิงเทรา(1) ระยอง(1) ราชบุรี(4) นครสวรรค์(17)

- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 71 เครื่อง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย(2) นครราชสีมา(16) บุรีรัมย์(3) เลย(5) สกลนคร(2) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(5) สุพรรณบุรี(17) พระนครศรีอยุธยา(2) อ่างทอง(2)

- ช่วยเหลืออุทกภัย จำนวน 8 เครื่อง ในพื้นที่ 1 จังหวัด คือ ตาก(8)

เตรียมพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 106 คัน ได้แก่ ภาคเหนือ 24 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน ภาคใต้ 14 คัน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 18 คัน

- ช่วยเหลือในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ 1) ตาก (ปริมาณน้ำรวม 1,050,000 ลิตร) 2)แพร่ (ปริมาณน้ำรวม 12,000 ลิตร)

สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์

- สนับสนุนพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 3 จังหวัด 57,860 กิโลกรัม ได้แก่ ขอนแก่น (26,000 กก.) นครราชสีมา (26,860 กก.) สุรินทร์ (5,000 กก.)

- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 1 จังหวัด 4,000 กิโลกรัม คือ พะเยา

6. ผลกระทบด้านการเกษตร

6.1 ภาวะฝนแล้ง ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน

- จังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ 8 จังหวัด 65 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี (1) เพชรบูรณ์ (10) นครสวรรค์ (3) กำแพงเพชร (1) ขอนแก่น (24) ชัยภูมิ (16) นครราชสีมา (2) อุทัยธานี (8)

ด้านพืช 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร ขอนแก่น ชัยภูมิ และ นครราชสีมา เกษตรกร 257,038 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 4.28 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3.02 ล้านไร่ พืชไร่ 1.24 ล้านไร่ พืชสวนและอื่นๆ 0.02 ล้านไร่

ด้านปศุสัตว์ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และสุรินทร์ เกษตรกร 358 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ (โค-กระบือ) 2,412 ตัว

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.2 อุทกภัย ช่วงภัยเดือน พ.ค.62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก และเชียงราย เกษตรกร 4,983 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 23,279 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8,439 ไร่ พืชไร่ 14,642 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 198 ไร่

ด้านปศุสัตว์ 1 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา เกษตรกร 38 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 204 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 39 ตัว แพะ/แกะ/สุกร 15 ตัว สัตว์ปีก 150 ตัว

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.3 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) พะเยา (โรคระบาดหอมแดงและหนอนกระทุ้ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) อุตรดิตถ์ (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) และเชียงราย (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) เกษตรกร 9,221 ราย พื้นที่ 62,646 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,338 ไร่ พืชไร่ 53,972 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,336 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 3 จังหวัด เกษตรกร 3,106 ราย พื้นที่ 18,779 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 22.01 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 1.60 ล้านบาท

6.4 วาดภัย ช่วงภัย วันที่ 8 ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

ด้านพืช 38 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี แพร่ ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก เชียงใหม่ นครสวรรค์ ลำพูน เชียงราย น่าน ขอนแก่น หนองคาย เลย บึงกาฬ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร อุรธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร และปัตตานี เกษตรกร 12,873 ราย พื้นที่ 31,682 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,697 ไร่ พืชไร่ 15,340 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 14,645 ไร่สำรวจพบความเสียหายแล้ว 33 จังหวัด เกษตรกร 4,358 ราย พื้นที่ 10,315 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 14.44 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 14.08 ล้านบาท

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

6.5 ภัยแล้ง ช่วงภัย ม.ค. 62 – พ.ค. 62

ด้านพืช 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และน่าน เกษตรกร 22,999 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 136,396 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 34,900 ไร่ พืชไร่ 54,783 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 46,713 ไร่สำรวจพบความเสียหายแล้ว 7 จังหวัด เกษตรกร 9,552 ราย พื้นที่ 54,522 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 64.84 ล้านบาท แบ่งเป็น ช่วยเหลือแล้ว 44.37 ล้านบาท รอประชุมดำเนินการ ก.ช.ก. 20.47 ล้านบาท

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. แมลงห้ำ 2. เพลี้ยไฟ 3. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ลพบุรี) จำนวน 200 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (มุกดาหาร) จำนวน 87 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนกระทู้กล้า เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีวเอร์เรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้แสงไฟฟ้าล่อแมลงและทำลายในช่วงที่มีการระบาด เนื่องจากแมลงห้ำชอบบินมาเล่นแสงไฟเวลากลางคืน และกำจัดวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นในนาข้าว เพื่อให้น้ำข้าวโปร่ง - ให้เกษตรกรดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ และให้น้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวอายุ 6-7 วันหลังหว่าน ใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไรแดง 3. แมลงนูนหลวง 4. เพลี้ยหอย 5. โรคโคนเน่าหัวเน่า	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ลำพูน นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 658 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และกาญจนบุรี) จำนวน 11,366 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 85 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 407 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 16 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน <i>Anagyrus lopezi</i> แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาโรเซียมควบคุม - มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน ให้หว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออกหรือกรณีแสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าระบาดรุนแรงมากใช้สารเคมีฟอสฟิอิล อลูมิเนียม อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ราดต้นละ 300 ซีซี หรือฟันทอัตรา 150 กรัมต่อไร่ สำรวจติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงฝนควรตรวจแปลงทุกวัน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	6. โรคพุ่มแจ้ 7. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 529 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี) จำนวน 41,196.25 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 21,966.50 ไร่	- สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด - จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและรายงานผลการสำรวจติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์ - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณะชนเกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ - วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาด - ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงหริวขาวพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาด
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ดั้วหนวดยาว 3. แมลงนูนหลวง 4. จักจั่น 5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 6. โรคใบขาว	ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ <u>การระบาดลดลง</u> 133 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 40 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 160 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 3,713 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 70 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และดักหนวดยาว และใช้เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูกาลปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ลำปาง พะเยา เชียงราย เลย และราชบุรี) จำนวน 35,571 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 605 ไร่ พื้นที่ระบาด 52 จังหวัด จำนวน 1.38 ล้านไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 259,519 ไร่	- แจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ให้เกษตรกรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง - จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และภูเก็ต) จำนวน 494 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและซุบนอร์พันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ - รมรณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด จำนวน 5,397 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 302 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด จำนวน 25,391 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 859 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด จำนวน 10,379 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 131 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูมะพร้าว - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนพาราซ่าทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			- ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงค้ำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก 3. หนอนหน้าแมว 4. ด้วงแรด 5. ด้วงกุหลาบ 6. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 15 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 60 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 1,016 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 81 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 56 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชุมพร และกระบี่) จำนวน 132 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรังสีให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นที่แหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหัวดำ หนอนปลอกเล็ก และหนอนหน้าแมวทำลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย - ใช้กาดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกุหลาบทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรครากขาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และปัตตานี) จำนวน 1,096 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่	- ให้เกษตรกรขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีโพธิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณที่เป็นโรครากขาวยางพารา
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. โรครากเน่าโคนเน่า 3. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง และชุมพร) จำนวน 10,374 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 6 ไร่ การระบาดคงที่	- โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ขุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลาย แล้วทาผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - หนอนเจาะลำต้นทุเรียน แนะนำให้สังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการทำลายของหนอนเจาะลำต้น เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด กำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายดักพื้นหลวมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนเจาะลำต้นทุเรียนรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึมให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน - หนอนเจาะผลทุเรียน ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจผลทุเรียนภายในสวน หากพบร่องรอยทำลายของหนอนเจาะผลทุเรียนให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลายทิ้ง ตัดแต่งผลทุเรียนไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกัน ใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัย

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			วางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย และเริ่มท่อนผล ทุเรียนตั้งแต่มีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปด้วยถุงมุ้งในล่อน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่เจาะรูบริเวณขอบล่าง เพื่อให้มีน้ำระบายออกมาได้ หากการระบาดของหนอน เจาะผลทุเรียนรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารแลมบ์ดา -ไฮฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียน ที่พบการทำลายของหนอนเจาะผล สำหรับในแหล่งที่ มีการระบาด ให้พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน โดยพ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน - โรคราดำ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำ และโรคใบไหม้ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรค ราดำและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 6 ส.ค. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 6 ส.ค. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 336 จุด ปัจจุบัน
ยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 26 จุด ในพื้นที่ 18 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี สระบุรี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราชินบุรี
ระยอง นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และสตูล

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี
5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 93,895 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือ
ลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 4,778 ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 13 – 19 ก.ค. 62) เกิดโรคในสุนัข 5 ครั้ง และในโค 1 ครั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ระยอง นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา

8.2 ไม่มีรายงานโรคปากและเท้าเปื่อยในสัปดาห์นี้

8.3 ไม่มีรายงานโรคระบาดสัตว์อื่นๆ ในสัปดาห์นี้

8.4 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

8.5 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 13 – 19 ก.ค. 62) พบการระบาด 5 โรค ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 50 ครั้ง
 - ในสุกรและหมูป่า 3 ครั้ง ที่ประเทศบัลแกเรีย
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศจีน
 - ในหมูป่า 5 ครั้ง ที่ประเทศฮังการี
 - ในหมูป่า 2 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศลาว
 - ในหมูป่า 6 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย
 - ในหมูป่า 3 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์
 - ในสุกรและหมูป่า 21 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
 - ในหมูป่า 3 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน
 - ในสุกรและหมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน

- โรค sheep pox and goat pox ในแกะ 2 ครั้ง ที่ประเทศคาซัคสถาน
- โรคเวสต์ไนล์ ในม้า 1 ครั้ง ที่ประเทศกรีซ
- โรควัวบ้า ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศสเปน
- โรคหลอดเลือดแดงอักเสบ ในม้า 1 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์

8.6 โรคไข้หวัดใหญ่ (H1N1) ในคน กระทรวงสาธารณสุข ประเทศเมียนมาร์ รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้เสียชีวิต 59 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 296 ราย