



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร  
วันที่ 7 มกราคม 2562


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง

ภาคใต้จะมีฝนลดลง เว้นแต่จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง จะมีฝนปานกลาง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำได้

สำหรับคลื่นลม บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 6 ม.ค. 62 ถึง เวลา 7.00 น. วันที่ 7 ม.ค. 62



| ที่ | อำเภอ                    | จังหวัด     | ปริมาณฝน (มม.) | ความรุนแรง  |
|-----|--------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 1.  | ที่ว่าการอำเภอสุโขทัย    | นราธิวาส    | 31.2           | ฝนตกปานกลาง |
| 2.  | ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ    | นราธิวาส    | 30.6           | ฝนตกปานกลาง |
| 3.  | ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น        | อุบลราชธานี | 26.5           | ฝนตกปานกลาง |
| 4.  | ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง | ปัตตานี     | 18.4           | ฝนตกปานกลาง |
| 5.  | ที่ว่าการอำเภอยี่งอ      | นราธิวาส    | 14.8           | ฝนตกปานกลาง |

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

2. สถานการณ์น้ำ

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 57,143 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 33,214 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (62,058 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 82) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 4,915 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 40.11 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 119.77 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 18,926 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 53,732 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 30,189 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (57,736 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 4,004 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 29.18 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 99.12 ล้าน บ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,195 ล้าน ลบ.ม.

| ภาค      | ขนาดใหญ่        |                       |            |           |        |             | ขนาดกลาง        |                       |            |           |        |             | รวม             |                       |            |           |        |             | รับได้อีก<br>(ล้าน ม. <sup>3</sup> ) |
|----------|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------|-------------|--------------------------------------|
|          | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาตรน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาตรน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาตรน้ำ |           |        |             |                                      |
|          |                 |                       | ในอ่างฯ    | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ    | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ    | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                                      |
| เหนือ    | 8               | 24,825                | 17,466     | 70        | 10,721 | 60          | 75              | 1,001                 | 663        | 66        | 564    | 62          | 83              | 25,825                | 18,129     | 70        | 11,285 | 60          | 7,697                                |
| ตอน.     | 12              | 8,368                 | 4,342      | 52        | 2,692  | 40          | 218             | 1,998                 | 1,126      | 56        | 977    | 53          | 230             | 10,367                | 5,468      | 53        | 3,670  | 43          | 4,898                                |
| กลาง     | 3               | 1,419                 | 651        | 46        | 591    | 45          | 22              | 369                   | 209        | 57        | 185    | 53          | 25              | 1,788                 | 860        | 48        | 776    | 47          | 928                                  |
| ตะวันออก | 2               | 26,605                | 23,345     | 88        | 10,068 | 76          | 7               | 142                   | 121        | 85        | 112    | 91          | 9               | 26,747                | 23,466     | 88        | 10,180 | 76          | 3,281                                |
| ตะวันออก | 6               | 1,515                 | 1,176      | 78        | 1,077  | 76          | 51              | 963                   | 746        | 77        | 693    | 76          | 57              | 2,478                 | 1,922      | 78        | 1,770  | 76          | 556                                  |
| ใต้      | 4               | 8,194                 | 6,752      | 82        | 5,041  | 78          | 39              | 668                   | 546        | 82        | 494    | 77          | 43              | 8,863                 | 7,298      | 82        | 5,534  | 78          | 1,565                                |
| รวม      | 35              | 70,926                | 53,732     | 76        | 30,189 | 64          | 412             | 5,142                 | 3,411      | 66        | 3,025  | 63          | 447             | 76,068                | 57,143     | 75        | 33,214 | 64          | 18,926                               |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 17,285 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 10,589 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 7.02 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 51.34 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 7,586 ล้าน ลบ.ม.

| อ่างเก็บน้ำ      | ปริมาณน้ำในอ่างฯ |               | ปริมาณน้ำใช้การได้ |             | ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ |          | ปริมาณน้ำระบาย |          | ปริมาณน้ำ<br>รับได้อีก |
|------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|----------------|----------|------------------------|
|                  | ปริมาณน้ำ        | % ความจุอ่างฯ | ปริมาณน้ำ          | % น้ำใช้การ | วันนี้              | เมื่อวาน | วันนี้         | เมื่อวาน |                        |
| ภูมิพล           | 8,856            | 66            | 5,056              | 52          | 0.62                | 1.19     | 24.00          | 27.00    | 4,606                  |
| สิริกิติ์        | 7,252            | 76            | 4,402              | 66          | 5.61                | 4.05     | 23.00          | 26.02    | 2,258                  |
| ภูมิพล+สิริกิติ์ | 16,108           | 70            | 9,458              | 58          | 6.23                | 5.24     | 47.00          | 53.02    | 6,864                  |
| แควน้อยฯ         | 639              | 68            | 596                | 67          | 0.49                | 0.15     | 2.16           | 2.16     | 300                    |
| ป่าสักชลสิทธิ์   | 538              | 56            | 535                | 56          | 0.30                | 0.30     | 2.18           | 2.18     | 422                    |
| รวมทั้งหมด       | 17,285           | 69            | 10,589             | 58          | 7.02                | 5.69     | 51.34          | 57.36    | 7,586                  |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯทับเสลา (26%) อ่างฯกระเสียว (24%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 10 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯแม่จัดสมบูรณ์ชล (100%) อ่างฯกัวลม (88%) อ่างฯกัวคองมา (99%) อ่างฯศรีนครินทร์ (91%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (81%) อ่างฯหนองปลาไหล (90%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (87%) อ่างฯแก่งกระจาน (86%) อ่างฯปราณบุรี (87%) อ่างฯรัชชประภา (83%)

## 2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำบางปะกง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย แม่น้ำท่าตะเภา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำตาปี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 430 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 433 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.49 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.71 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 90 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 90 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.80 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.84 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.78 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.73 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 141 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 141 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 115 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 20 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 6 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 22 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 22 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 50 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 53 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลาป) 6 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 31 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 162 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 161 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมทอง) 20 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 61 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 66 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 15 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 104 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 101 ลบ.ม./วินาที)

## 2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

| แม่น้ำ    | จุดเฝ้าระวัง               | ความเค็ม<br>(กรัม/ลิตร)               | เกณฑ์ | หมายเหตุ                                                                                                               |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เจ้าพระยา | ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี     | 0.16<br>ข้อมูล ณ 7 ม.ค. 61 (08.00 น.) | ปกติ  | - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร<br>- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร |
| เจ้าพระยา | ทำนายนทบุรี จ.นนทบุรี      | 0.16<br>ข้อมูล ณ 7 ม.ค. 61 (08.00 น.) | ปกติ  |                                                                                                                        |
| เจ้าพระยา | ทำนักรมชลประทานสามเสน กทม. | 0.19<br>ข้อมูล ณ 7 ม.ค. 61 (08.00 น.) | ปกติ  |                                                                                                                        |

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)


### 3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2561/2562

**แผนการจัดสรรน้ำ** โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้งปี 2561/2562 (วันที่ 1 พ.ย.61 ถึง 30 เม.ย.62) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้ได้ จำนวน 39,570 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศจำนวน 23,100 ล้าน ลบ.ม.

**ผลการจัดสรรน้ำ** ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 7,007 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันนี้ใช้น้ำไป 58 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 2,924 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 37 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

| พื้นที่       | แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/62 (1 พ.ย.61 - 30 เม.ย.62) |                        |          |            |        | ผลการจัดสรรน้ำ |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|--------|----------------|----------------------|
|               | อุปโภค-บริโภค                                                   | รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ | การเกษตร | อุตสาหกรรม | รวม    | ปริมาณน้ำ      | % แผนจัดการจัดสรรน้ำ |
| ทั่วประเทศ    | 2,404                                                           | 6,440                  | 13,953   | 303        | 23,100 | 7,007          | 30                   |
| ลุ่มเจ้าพระยา | 1,140                                                           | 1,450                  | 5,410    | -          | 8,000  | 2,924          | 37                   |



### 4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62

**แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62**

**ทั่วประเทศ** จำนวน 16.08 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.21 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 4.87 ล้านไร่

**ลุ่มน้ำเจ้าพระยา** จำนวน 8.74 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.18 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 1.56 ล้านไร่

**ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562)**

**ทั่วประเทศ** จำนวน 7.04 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 6.04 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 1.00 ล้านไร่

**ลุ่มน้ำเจ้าพระยา** จำนวน 5.44 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 5.12 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 0.32 ล้านไร่

| ขอบเขตพื้นที่                    | พื้นที่แหล่งน้ำ | แผนการเพาะปลูก ปี 2561/62 |               |       | * สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2561/62 |               |            |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------|-----------------------------------|---------------|------------|
|                                  |                 | ข้าวรอบที่ 2              | พืชไร่ พืชผัก | รวม   | ข้าวรอบที่ 2                      | พืชไร่ พืชผัก | รวมทั้งหมด |
| ทั่วประเทศ<br>(77 จังหวัด)       | ในเขตชลประทาน   | 8.03                      | 2.43          | 10.46 | 4.78                              | 0.23          | 5.01       |
|                                  | นอกเขตชลประทาน  | 3.18                      | 2.44          | 5.62  | 1.26                              | 0.77          | 2.03       |
|                                  | รวม             | 11.21                     | 4.87          | 16.08 | 6.04                              | 1.00          | 7.04       |
| ลุ่มน้ำเจ้าพระยา<br>(22 จังหวัด) | ในเขตชลประทาน   | 5.30                      | 0.77          | 6.07  | 4.05                              | 0.07          | 4.12       |
|                                  | นอกเขตชลประทาน  | 1.88                      | 0.79          | 2.67  | 1.07                              | 0.25          | 1.32       |
|                                  | รวม             | 7.18                      | 1.56          | 8.74  | 5.12                              | 0.32          | 5.44       |

## 5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า


เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 149 เครื่อง ในพื้นที่ 26 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 22 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่(1) อุตรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(5) นครราชสีมา(3) ยโสธร(2) นครพนม(2) เพชรบุรี(5)
- ช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง จำนวน 50 เครื่อง ในพื้นที่ 10 จังหวัด คือ เชียงราย(1) สุโขทัย(6) นครสวรรค์(3) นครนายก(4) ปราจีนบุรี(18) ฉะเชิงเทรา(6) ชลบุรี(2) จันทบุรี(1) ระยอง(1) กาญจนบุรี(8)
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 48 เครื่อง ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร(1) นครราชสีมา(13) บุรีรัมย์(2) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(9) นครศรีธรรมราช(6)
- ช่วยเหลืออุทกภัย จำนวน 29 เครื่อง ในพื้นที่ 1 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช(29)

## 6. ผลกระทบด้านการเกษตร

### อุทกภัยภาคใต้

#### 1) ช่วงภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) 4 มกราคม 2562 – ปัจจุบัน



ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง  
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เคลื่อนตัวลงอ่าวไทย และเคลื่อนเข้าฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมเฉียบพลัน และน้ำไหลหลาก ทำให้เกิดอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต จันทบุรี ชลบุรี และตราด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

- ด้านพืช 7 จังหวัด เกษตรกร 164,929 ราย พื้นที่ 126,561 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 25,596 ไร่ พืชไร่ 5,052 ไร่ พืชสวนและอื่น ๆ 95,913 ไร่
- ด้านประมง 11 จังหวัด เกษตรกร 6,950 ราย พื้นที่ 10,096 ไร่ บ่อปลา 12,550 ไร่ กระชัง 5,720 ตร.ม. เรือประมง 88 ลำ
- ด้านปศุสัตว์ 5 จังหวัด เกษตรกร 35,838 ราย สัตว์ที่ได้รับผลกระทบ 1,729,389 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 68,271 ตัว สุกร 63,720 ตัว แพะ-แกะ 13,711 ตัว และสัตว์ปีก 1,583,687 ตัว

#### การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

- อพยพสัตว์ จำนวน 327,955 ตัว
- เสบียงสัตว์ จำนวน 47,200 กิโลกรัม
- ดูแลสุขภาพสัตว์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 10 ชุด / ถุงยังชีพสัตว์ จำนวน 496 ถุง

## 7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ม.ค. 62)

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                   | สถานการณ์                                                                                                                | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้าว    | 1. โรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี สุโขทัย และนครสวรรค์) จำนวน 33,510 ไร่ การระบาดลดลง 38,588 ไร่ | - ทำการประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ เพลี้ยไฟ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้งและศัตรูข้าวอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด                  |
|         | 2. โรคไหม้ข้าว             | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครสวรรค์ ระยอง และตาก) จำนวน 26 ไร่ การระบาดลดลง 3,190 ไร่                                      | - ผลิตและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอร์เรีย ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่                                                                                     |
|         | 3. โรคขอบใบแห้ง            | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (มหาสารคาม และตาก) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่                                                     | - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันและกำจัดโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ที่มีการระบาด                                                                                  |
|         |                            |                                                                                                                          | - แนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้บิวเวอร์เรียเพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่                                                                                              |
|         |                            |                                                                                                                          | - แนะนำให้เกษตรกรไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูงมากเกินไป และในแปลงที่มีการระบาดมากแนะนำให้ใช้สารเคมีฟอสฟอรัส เช่น Phenazine-5-Oxide โดยผสมน้ำแล้วพ่นในระยะที่ต้นข้าวแตกกอเต็มที่ |

| ชนิดพืช     | ศัตรูพืช                                                                        | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อ้อย        | 1. แมลงนูนหลวง<br>2. หนอนกออ้อย                                                 | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 75 ไร่<br>การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 1 ไร่<br>การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                          | - รมรณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่อาจเกิดการระบาด และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของศัตรูอ้อยในพื้นที่เสี่ยง<br>- แนะนำให้เกษตรกรทำการไถนาพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวงและดักแด้ และใช้เชื้อราบิวเวอเรียควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินที่มีความชื้น<br>- แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราบิวเวอเรียร่วมกับเชื้อราเมตาไรเซียมในการป้องกันกำจัดหนอนกออ้อยในพื้นที่ที่พบการระบาด พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ข้าวโพด     | 1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก                                                 | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตาก เชียงใหม่ และ เพชรบูรณ์) จำนวน 1,513 ไร่<br>การระบาดเพิ่มขึ้น 1,483 ไร่                                                                                                                                                                                                                                     | - ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์ และแจ้งเตือนในพื้นที่ปลูก เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง<br>- แนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานในการปลูกในฤดูต่อไป พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| มันสำปะหลัง | 1. โรคโคนเน่าหัวเน่า<br>2. แมลงนูนหลวง<br>3. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง<br>5. โรคแคง | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 51 ไร่ การระบาดลดลง 68 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 620 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชลบุรี จันทบุรี มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และตาก) จำนวน 346 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 11 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาฬสินธุ์) จำนวน 265 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 265 ไร่ | - รมรณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน<br>- ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่โดยเตรียมการผลิตเพื่อปล่อย 1,754 จุด จุดละ 3 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2562<br>- แนะนำให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน บริเวณที่แสดงอาการและโดยรอบห่างออกไปประมาณ 1 เมตร ไปเผาทิ้งทำลาย และหว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณีระบาดรุนแรงมากใช้สารเคมีฟอสฟิทธิล อลูมิเนียม และสำรวจติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงฝนชุกควรตรวจแปลงทุกวัน<br>- แนะนำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้ รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม<br>- สำรวจติดตามการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเมื่อพบต้นที่แสดงอาการได้เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจในห้องปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งดำเนินการทำลายต้นที่แสดงอาการอื่นๆ ที่จากแปลงปลูก<br>- สำนักงานเกษตรจังหวัด 54 จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จัดทำแผนการอบรมและการสำรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังครอบคลุมพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ<br>- แจ้งให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ และให้เก็บใบที่เสียหายไปเผาทำลายนอกแปลง และแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการป้องกันกำจัดทันที |
| สับปะรด     | 1. โรคเหี่ยว                                                                    | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ภูเก็ต และระยอง) จำนวน 16 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรขุดพินธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ และรมรณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกร เฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ชนิดพืช     | ศัตรูพืช                                                                          | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปาล์มน้ำมัน | 1. หนอนหัวดำ<br>2. ดั้วแรด<br>3. ดั้วกุหลาบ<br>4. หนอนปลอกเล็ก<br>5. โรคลำต้นเน่า | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กรุงเทพฯ ระยอง และ สงขลา) จำนวน 19 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ กระบี่) จำนวน 966 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลา และชุมพร) จำนวน 41 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี และ กระบี่) จำนวน 559 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กระบี่) จำนวน 45 ไร่ การระบาดคงที่ | - ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกัน กำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน<br>- ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) ในพื้นที่ระบาด<br>- ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผา และดูแลสวนปาล์ม ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์<br>- ผลิตและขยายเชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อนำมาใช้ควบคุมดั้วแรด และดั้วกุหลาบ<br>- ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซพวิน 85% ดับลิพพี) พ่น บริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ<br>- ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาในบริเวณที่เกิดโรคเพื่อ ควบคุมการระบาดของลำต้นเน่า และปรับพื้นที่ในแปลง ให้มีการระบายน้ำที่ดี<br>- ใช้กำดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับดั้วแรด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ยางพารา     | 1. โรครากขาว<br>2. โรคใบร่วง<br>3. โรคเส้นดำ                                      | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (นครพนม สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ปัตตานี) จำนวน 1,153 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่การระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                              | - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันกำจัดโรคที่ ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา โดยชุดคู่มือ บริเวรต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาด ไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก<br>- ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในบริเวณที่เกิดโรคเพื่อ ควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา<br>- แนะนำให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรค<br>- ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มานำมา ผสมกับปุ๋ยหมักใช้ในสวนยางพารา<br>- ใช้สารเคมีเมตาแลคซิล จะสามารถป้องกันและกำจัด โรคเส้นดำได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มะพร้าว     | 1. หนอนหัวดำ<br>2. แมลงดำหนาม<br>3. ดั้วแรด<br>4. ดั้วงวง                         | พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จำนวน 5,242 ไร่ การระบาดลดลง 33 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด จำนวน 61,099 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด จำนวน 9,657 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จำนวน 56 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                        | - ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกัน กำจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าว ตัดทาง ใบที่ถูกหนอนหัวดำทำลายมาเผา เพื่อทำลายหนอน หัวดำในระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ เพื่อ ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของศัตรูมะพร้าว<br>- ใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซเอท (emamectin benzoate ผสมกับน้ำ พ่นในมะพร้าวที่มีความสูง มากกว่า 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าว กะทิ และมะพร้าวทำน้ำตาล ซึ่งใช้สารเคมีฟลูเบนไดเอ ไมด์ 20%<br>- ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) แตนเบียนไซทริโคแกรมมา (Trichogramma spp.) และแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่<br>- ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) ทำลายไข่และตัวอ่อนดั้วแรด<br>- ใช้ตาข่ายดักจับและใช้กับดักไฟโรโมนล่อดั้วแรดมะพร้าว ในระยะเต็มวัย<br>- ควบคุมดั้วงวงมะพร้าวโดยใช้เหล็กยาวปลายเป็น ตะขอแทงเข้าไปเกี่ยวเอาตัวหนอนออกมาทำลายทิ้ง และใช้สารทาร์ ซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ำมันเครื่อง 1 ลิตร ผสมกับผงกำมะถัน 100 กรัม คนให้เข้ากัน ทาบริเวณรอยแผลที่เกิดจากการตัดทางใบ หรือรอย ตัดจั่นมะพร้าวเพื่อทำน้ำตาล รอยแตกที่โคนลำต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยของดั้วงวงจะเข้าวางไข่ |
| ทุเรียน     | 1. โรครากเน่าโคนเน่า                                                              | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง และ ระนอง) จำนวน 10,807 ไร่ การระบาดลดลง 115 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาด เพื่อให้ เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาด จัดทำข่าวเตือนการ ระบาด ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                            | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                       | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 2. เพลี้ยไก่แจ้<br>3. หนอนเจาะลำต้น<br>4. เพลี้ยไฟ<br>5. โรคราใบติด | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 32 ไร่<br>การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่<br>การระบาดลดลง 6 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่<br>ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้<br>การระบาดลดลง 26 ไร่ | - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่มีการระบาด โดยให้ชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา<br>- แนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยสังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการทำลายของหนอน เก็บไข่ไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลุมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัย มาทำลายทิ้ง แหล่งที่มีการระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูด และกำจัดแหล่งขยายพันธุ์โดยตัดต้นทุเรียนที่ถูกทำลายรุนแรงจนไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้วไปเผาทิ้ง เพื่อไม่ให้แหล่งสะสมการระบาดและทำความเสียหายต่อทุเรียนต้นอื่นๆ<br>- แนะนำเกษตรกรตัดยอดหรือกิ่งที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายไปเผาทิ้ง สำหรับต้นที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายระดับรุนแรงแนะนำให้ใช้สารอิมิดาโคลพริด 10 % เอสแอล หรือคาร์โบซันแฟน 20% พ่นให้ทั่วทั้งต้น |
| เงาะ    | 1. โรคใบจุดสาหร่าย                                                  | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 1 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                  | - แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงเงาะอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อลดความชื้นภายในทรงพุ่ม<br>- แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% ดับบลิวพี ฉีดพ่นที่ใบให้ทั่วต้น หรือใช้พ่นป้องกันเป็นระยะ ๆ<br>- แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพ่นบริเวณที่เป็นโรค และหมั่นสำรวจแปลงและกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความชื้นสะสม ไม่ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

## 8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

### 8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61)

1) สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 มีรายงานจังหวัดที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ตราด นครนายก บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครปฐม ชุมพร พังงา ภูเก็ต และนราธิวาส พบโรคทั้งหมด 54 จังหวัด 320 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 33 จุด ในพื้นที่ 21 จังหวัด คือ ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เชียงราย กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา และสตูล

2) ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ 22,829 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 1,824 ตัว

8.2 โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 15 - 21 ธ.ค. 61) พบทั้งหมด 12 ครั้ง ในสุนัข 11 ครั้ง และโค 1 ครั้ง เกิดในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เพชรบุรี สมุทรสาคร และสงขลา

8.3 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 15 – 21 ธ.ค. 61) พบการระบาด 2 ครั้ง ในโคนม 1 ครั้ง ในพื้นที่ 1 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี และเกิดโรคในโคเนื้อ 1 ครั้ง ในพื้นที่ 1 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8.4 โรคระบาดสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และโรคระบาดสัตว์อื่น (ช่วงวันที่ 15 – 21 ธ.ค. 61) ไม่มีรายงานในสัปดาห์นี้

8.5 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 15 – 21 ธ.ค. 61) พบการระบาด 3 โรค ใน 9 ประเทศ ดังนี้

1) โรค Peste des petits ruminants ในแพะแกะ 1 ครั้ง ที่ประเทศแอลจีเรีย

2) โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N1 ในนกอีแกและไก่ 2 ครั้ง ที่ประเทศอินเดีย

3) โรคคหิวแอฟริกันในสุกร 22 ครั้ง

- ประเทศเบลเยียม 1 ครั้ง เกิดโรคในหมูป่า

- ประเทศจีน 5 ครั้ง เกิดโรคในสุกร

- ประเทศฮังการี 3 ครั้ง เกิดโรคในหมูป่า

- ประเทศลัตเวีย 4 ครั้ง เกิดโรคในหมูป่า

- ประเทศโปแลนด์ 4 ครั้ง เกิดโรคในหมูป่า

- ประเทศโรมาเนีย 4 ครั้ง เกิดโรคในสุกรและหมูป่า

- ประเทศยูเครน 1 ครั้ง เกิดโรคในสุกร