



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

1. สภาพอากาศ

1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2562


ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะสูงขึ้นเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย จะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุม ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อไปอีกระยะหนึ่ง และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2562

1.2 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เว้นแต่ภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

1.3 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 20 ก.พ. 62 ถึง เวลา 7.00 น. วันที่ 21 ก.พ. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ	นราธิวาส	28.4	ฝนตกปานกลาง
2.	อบต.มะบ้าย	ร้อยเอ็ด	9.5	ฝนตกเล็กน้อย
3.	ที่ว่าการอำเภอกะป้อ	ปัตตานี	8.2	ฝนตกเล็กน้อย
4.	อบต.บ่อพลอย	ตราด	8.0	ฝนตกเล็กน้อย
5.	ที่ว่าการอำเภอเมือง	นราธิวาส	6.8	ฝนตกเล็กน้อย

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

2. สถานการณ์น้ำ

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 51,802 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 27,872 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (56,526 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 4,724 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 15.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 132.10 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 24,266 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 48,919 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 25,376 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (52,755 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 3,836 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 12.29 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 120.13 ล้าน บ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 22,008 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	15,238	61	8,493	47	75	1,001	595	59	495	54	83	25,825	15,833	61	8,988	48	9,993
ตอน.	12	8,368	3,630	43	1,979	29	218	1,998	903	45	754	41	230	10,367	4,533	44	2,733	32	5,834
กลาง	3	1,419	498	35	438	34	22	369	172	47	148	43	25	1,788	670	37	586	36	1,118
ตะวันออก	2	26,605	22,212	83	8,935	67	7	142	105	74	96	78	9	26,747	22,317	83	9,031	67	4,430
ตะวันออก	6	1,515	925	61	825	58	51	963	600	62	547	60	57	2,478	1,525	62	1,372	59	954
ใต้	4	8,194	6,417	78	4,706	73	39	668	508	76	455	71	43	8,863	6,925	78	5,161	72	1,938
รวม	35	70,926	48,919	69	25,376	54	412	5,142	2,883	56	2,495	52	447	76,068	51,802	68	27,872	53	24,266

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 15,000 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 8,304 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 2.96 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 48.79 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 9,871 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	7,941	59	4,141	43	0.00	0.00	21.00	21.00	5,521
สิริกิตี	6,184	65	3,334	50	2.52	2.40	22.60	22.51	3,326
ภูมิพล+สิริกิตี	14,125	61	7,475	46	2.52	2.40	43.60	43.51	8,847
แควน้อยฯ	484	52	441	49	0.44	1.00	3.02	3.02	455
ป่าสักชลสิทธิ์	390	41	387	40	0.00	0.00	2.17	2.17	570
รวมทั้งหมด	15,000	60	8,304	46	2.96	3.40	48.79	48.70	9,871

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 3 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯอุบลรัตน์ (29%) อ่างฯทับเสลา (25%) อ่างฯกระเสียว (23%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 3 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯแม่งัดสมบูรณ์ชล (91%) อ่างฯกัวคอง (87%) อ่างฯศรีนครินทร์ (88%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 400 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 424 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.39 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.81 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 90 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 90 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.10 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.14 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.78 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.78 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 134 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 135 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 111 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 21 ลบ.ม./วินาที และคลองอื่นๆ 2 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 20 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 20 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลาป) 7 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 30 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 158 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 159 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 11 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 60 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 70 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 17 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 97 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 94 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		15 ก.พ.	16 ก.พ.	17 ก.พ.	18 ก.พ.	19 ก.พ.	20 ก.พ.	21 ก.พ.		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแล จ.ปทุมธานี	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มน้ำ จ.นนทบุรี	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.23	0.24	0.27	0.23	0.21	0.20	0.18	ปกติ	

*ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร *ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2561/2562

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้งปี 2561/2562 (วันที่ 1 พ.ย.61 ถึง 30 เม.ย.62) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 39,570 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศจำนวน 23,100 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ (อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 13,306 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ใช้น้ำไปแล้ว 5,698 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/62 (1 พ.ย.61 - 30 เม.ย.62)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	2,404	6,440	13,953	303	23,100	13,306	58
ลุ่มเจ้าพระยา	1,140	1,450	5,410	-	8,000	5,698	71



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62

ทั่วประเทศ จำนวน 16.08 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.21 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 4.87 ล้านไร่

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 8.74 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.18 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 1.56 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)

ทั่วประเทศ จำนวน 12.10 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10.27 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 1.83 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.25 ของแผน

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 7.84 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.35 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 0.49 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.70 ของแผน

พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเกินกว่าแผน จำนวน 1.15 ล้านไร่ รวม 32 จังหวัด โดยแบ่งเป็น

- ในเขตชลประทาน 29 จังหวัด พื้นที่ 1.03 ล้านไร่ ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี ชลบุรี ตรัง ปรังจันบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และสตูล

- นอกเขตชลประทาน 5 จังหวัด พื้นที่ 0.12 ล้านไร่ ได้แก่ พิษณุโลก นครพนม บุรีรัมย์ สุรินทร์ และพระนครศรีอยุธยา

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2561/62			* สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2561/62					
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวรอบที่ 2	% ข้าวรอบ 2	พืชไร่ พืชผัก	% พืชไร่ พืชผัก	รวม ทั้งหมด	% รวมทั้งหมด
ทั่วประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	8.03	2.43	10.46	7.98	99.38	0.50	20.58	8.48	81.07
	นอกเขตชลประทาน	3.18	2.44	5.62	2.29	72.01	1.33	54.51	3.62	64.41
	รวม	11.21	4.87	16.08	10.27	91.61	1.83	37.58	12.10	75.25
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	5.30	0.77	6.07	5.84	110.19	0.08	10.39	5.92	97.53
	นอกเขตชลประทาน	1.88	0.79	2.67	1.51	80.32	0.41	51.90	1.92	71.91
	รวม	7.18	1.56	8.74	7.35	102.37	0.49	31.41	7.84	89.70

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1,851 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และอุปโภคบริโภค จำนวน 183 เครื่อง ในพื้นที่ 34 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 48 เครื่อง ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ อุดรดิตถ์(2) พิจิตร(1) ลำปาง(16) น่าน(4) พะเยา(2) ตาก(3) แพร่(6) ยโสธร(2) บุรีรัมย์(2) นครพนม(2) เลย(1) สุพรรณบุรี(2) เพชรบุรี(5)
- ช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง จำนวน 86 เครื่อง ในพื้นที่ 16 จังหวัด คือ เชียงใหม่(2) เชียงราย(1) กำแพงเพชร(7) สุโขทัย(5) ตาก(7) พะเยา(2) นครราชสีมา(2) ศรีสะเกษ(5) หนองคาย(8) นครสวรรค์(3) นครนายก(9) ปราจีนบุรี(24) ฉะเชิงเทรา(6) ชลบุรี(2) จันทบุรี(1) ระยอง(2)
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 49 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร(1) เชียงราย(2) นครราชสีมา(10) บุรีรัมย์(3) อุบลราชธานี(1) นนทบุรี(3) ปทุมธานี(14) ชัยนาท(9) นครศรีธรรมราช(6)

6. ผลกระทบด้านการเกษตร

6.1 ภัยแล้ง


สถานการณ์ภัยแล้ง ช่วง ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งฯ แล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 อำเภอ 32 หมู่บ้าน เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ขณะนี้ยังไม่มียผลกระทบด้านการเกษตร

6.2 อุทกภัยภาคใต้

ช่วงภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) 4 – 6 มกราคม 2562

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เคลื่อนตัวลงอ่าวไทย และเคลื่อนเข้าฝั่งบริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมเฉียบพลัน และน้ำไหลหลาก ทำให้เกิดอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต จันทบุรี ชลบุรี และตราด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้



ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

- ด้านพืช สำรวจพบความเสียหายแล้ว 8 จังหวัด เกษตรกร 14,180 ราย พื้นที่ 32,773 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,160 ไร่ พืชไร่ 1,060 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 30,554 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 54.14 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 14,061 ราย พื้นที่ 32,211 ไร่ วงเงิน 53.20 ล้านบาท
- ด้านปศุสัตว์ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 8 จังหวัด เกษตรกร 6,559 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 253,605 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 410 ตัว สุกร 708 ตัว แพะ-แกะ 361 ตัว สัตว์ปีก 252,126 ตัว แปลงหญ้า 578 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 19.94 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 86 ราย สัตว์ 4,421 ตัว วงเงิน 0.43 ล้านบาท
- ด้านประมง สำรวจพบความเสียหายแล้ว 8 จังหวัด เกษตรกร 5,427 ราย พื้นที่ 12,249 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 3,606 ไร่ บ่อกุ้ง 8,645 ไร่ กระจัง 13,463 ตารางเมตร คิดเป็นวงเงิน 113.88 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 2,749 ราย พื้นที่ 5,720 ไร่ กระจัง 11,710 ตารางเมตร วงเงิน 57.66 ล้านบาท
- เรือประมง สำรวจพบความเสียหายแล้ว 12 จังหวัด เกษตรกร 113 ราย เรือเสียหาย 113 ลำ (เรือประมงพื้นบ้าน 112 ลำ เรือพาณิชย์ 1 ลำ) ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 84 ราย เรือ 84 ลำ วงเงิน 0.77 ล้านบาท

การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

- หน่วยเฉพาะกิจสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 60 นาย ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
- มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 412,700 กิโลกรัม กล้วยซีฟัสต์ 2,332 ชุด รักษาสัตว์ 15,275 ตัว และดูแลสุขภาพสัตว์ 22,556 ตัว
- ดูแลแปลงนาหลังน้ำลด และให้คำแนะนำการปลูกข้าว โดยเฉพาะพันธุ์สังข์หยดพัทลุง ตลอดจนตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร เมล็ดพันธุ์ข้าวที่อาจเกิดความเสียหายจากความชื้น ให้นำไปเก็บไว้ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
- ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวนา โดยจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข 41 และ กข 49 ให้แก่ชาวนา รวม 17,000 กิโลกรัม ชาวนา 133 ราย พื้นที่ประมาณ 1,130 ไร่ ให้ความช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบภัยไม่เกิน 10 ไร่ ไร่ละ 15 กิโลกรัม (ต่อราย)
- ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 100,000 กิโลกรัม เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น จำนวน 100,000 ไร่ ทั้งนี้ ได้แจกจ่ายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้แก่ เกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ชุมพร กระบี่ พัทลุง และปัตตานี รวม 56,819 กิโลกรัม คิดเป็น 56.82%
- จัดส่งเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนสายหลัก จำนวน 6 รายการ ได้แก่ รถบด รถเกรด รถน้ำ รถขุดไฮดรอลิค รถแทรกเตอร์ ตีดินตะขาบ และรถขุดตีดินตะขาบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรเบื้องต้น
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูบำรุงดินหลังน้ำท่วม ได้แก่ สารเร่งซูเปอร์ พด.1 จำนวน 700 ชอง สารเร่งซูเปอร์ พด.2 จำนวน 1,020 ชอง ปุ๋ยหมัก จำนวน 535 ตัน ปุ๋ยสด จำนวน 105 ตัน โดโลไมท์ จำนวน 531.50 ตัน และหินปูนฝุ่น จำนวน 1,927 ตัน
- จัดเตรียมเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ย จำนวน 5 จังหวัด สหกรณ์ 12 แห่ง สมาชิก 3,002 ราย และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ที่มีหนี้เงินกู้กับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ก่อนเกิดภัยอย่างน้อย 1 ปี

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.พ. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. โรคไหม้ข้าว 3. โรคขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อ่างทอง สิงห์บุรี พิจิตร เพชรบูรณ์) จำนวน 37,728 ไร่ การระบาดลดลง 2,213 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สิงห์บุรี ตาก สงขลา) จำนวน 21 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สิงห์บุรี ตาก สงขลา) จำนวน 177 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 173 ไร่	- ทำการประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคไหม้ข้าว และศัตรูข้าวอื่น ๆ เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด - ผลิตและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อรา บิวเวอร์เรีย ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันและกำจัดโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ที่มีการระบาด - แนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้บิวเวอร์เรียเพื่อควบคุม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูง มากเกินไป และในแปลงที่มีการระบาดมากแนะนำให้ใช้สารเคมีฟอสฟอรัสต้นข้าว เช่น Phenazine-5-Oxide โดยผสมน้ำแล้วพ่นในระยะที่ต้นข้าวแตกกอเต็มที่
อ้อย	1. แมลงหนูลวง 2. ตัวหนอนยาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 487 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 350 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่ อาจเกิดการระบาด และประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์การ ระบาดของศัตรูอ้อยในพื้นที่เสี่ยง - แนะนำให้เกษตรกรทำการไถนาพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงหนูลวงและดักแด้ และ ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ ขณะปลูกหรือคูลงในพื้นที่ที่มีความชื้น - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียร่วมกับ เชื้อราเมตาไรเซียมในการป้องกันกำจัดหนอนกออ้อย ในพื้นที่ที่พบการระบาด พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่น สืบสวนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าวโพด	1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงราย ตาก เพชรบูรณ์) จำนวน 2,894 ไร่ การระบาดลดลง 376 ไร่ พบการระบาดในข้าวโพดโครงการฯ จำนวน 12,063 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 1.48 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด) พบการระบาดในข้าวโพदनอกโครงการฯ จำนวน 3,723 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 0.46 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด)	- ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์ และแจ้งเตือนในพื้นที่ปลูก เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของข้าวโพด และติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง - แนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานในการปลูกในฤดูต่อไป พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
มันสำปะหลัง	1. โรคโคนเน่าหัวเน่า 2. แมลงนูนหลวง 3. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 4. ไรแดง 5. โรคพุ่มแจ้	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี) จำนวน 7 ไร่ การระบาดลดลง 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 631 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชลบุรี จันทบุรี มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ตาก) จำนวน 127 ไร่ การระบาดลดลง 476 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาฬสินธุ์) จำนวน 265 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่การระบาด 2 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี) จำนวน 11 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่โดยเตรียมการผลิตเพื่อปล่อย 1,754 จุด จุดละ 3 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2562 - แนะนำให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน บริเวณที่แสดงอาการและโดยรอบห่างออกไปประมาณ 1 เมตร ไปเผาทั้งทำลาย และหว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณีระบาดรุนแรงมากใช้สารเคมีฟอสฟิทธิล อลูมิเนียม และสำรวจติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงฝนชุกควรตรวจแปลงทุกวัน - แนะนำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้ รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาตาไรเซียมควบคุม - สำรวจติดตามการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเมื่อพบต้นที่แสดงอาการได้เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจในห้องปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งดำเนินการทำลายต้นที่แสดงอาการอื่นๆ ที่จากแปลงปลูก - สำนักงานเกษตรจังหวัด 54 จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จัดทำแผนการอบรมและการสำรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังครอบคลุมพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ - แจ้งให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ และให้เก็บใบที่เสียหายไปเผาทำลายนอกแปลง และแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการป้องกันกำจัดทันที
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 2 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 13 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรขุดพินทุด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ และรมรังสีให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกร เฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. ตัวแรด 3. ตัวงูหลาบ 4. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร สงขลา) จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่) จำนวน 796 ไร่การระบาดลดลง 164 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลา ชุมพร) จำนวน 41 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี กระบี่) จำนวน 208 ไร่ การระบาดลดลง 354 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน - ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) ในพื้นที่ระบาด - ตัดทางใบที่ถูกทำลายมาเผา และดูแลสวนปาล์มให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ผลิตและขยายเชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อนำมาใช้ควบคุมตัวแรด และตัวงูหลาบ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	5. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชุมพร กระบี่) จำนวน 60 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 15 ไร่	- ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาในบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของลำต้นเน่า และปรับพื้นที่ในแปลงให้มีการระบายน้ำที่ดี - ใช้กำดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรด
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี นครพนม สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ปัตตานี) จำนวน 1,141 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่การระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันกำจัดโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา โดยชุดคู่มือบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก - ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา - แนะนำให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรค - ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มานำมาผสมกับปุ๋ยหมักใช้ในสวนยางพารา - ใช้สารเคมีเมตาแลคซิล จะสามารถป้องกันและกำจัดโรคเส้นดำได้
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ด้วงแรด 4. ด้วงงวง 5. หนอนพาราซ่า	พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด จำนวน 4,997 ไร่ การระบาดลดลง 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด จำนวน 59,854 ไร่ การระบาดลดลง 57 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด จำนวน 9,630 ไร่ การระบาดลดลง 88 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จำนวน 4 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร) จำนวน 3 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	- ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าว ตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดำทำลายมาเผา เพื่อทำลายหนอนหัวดำในระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของศัตรูมะพร้าว - ใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซเอท (emamectin benzoate ผสมกับน้ำ พ่นในมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวทำน้ำตาล ซึ่งใช้สารเคมีฟลูเบนไดเอไมด์ 20% - ปลอຍแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) แตนเบียนไซทริโคแกรมมา (Trichogramma spp.) และแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) ทำลายไข่และตัวอ่อนด้วงแรด - ใช้ตาข่ายดักจับและใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดมะพร้าวในระยะเต็มวัย - ควบคุมด้วงงวงมะพร้าวโดยใช้เหล็กยาวปลายเป็นตะขอแทงเข้าไปเกี่ยวเอาตัวหนอนออกมาทำลายทิ้ง และใช้สารทาร์ 1 ลิตร ผสมกับผงกำมะถัน 100 กรัม คนให้เข้ากัน ทาบริเวณรอยแผลที่เกิดจากการตัดทางใบ หรือรอยตัดจั่นมะพร้าว รอยแตกที่โคนลำต้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยของด้วงงวงจะเข้าวางไข่
กาแฟ	1. โรคใบจุดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร) จำนวน 3 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	- แนะนำให้ตัดแต่งทรงพุ่มต้นกาแฟให้โปร่ง ทำให้แสงสามารถส่องผ่านทรงพุ่มได้ หากพบการระบาดในระดับรุนแรงให้ใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น บอร์โดซ์มิกซ์เจอร์ (Alkaline Bordeaux Mixture) 0.5% หรือ คูปราวิท (Cupravit) 85% ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
ทุเรียน	1. โรครากเน่าโคนเน่า 2. หนอนเจาะลำต้น 3. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ชุมพร) จำนวน 11,121 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 507 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาด เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาด - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน โดยให้ชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก และนำไปเผาทำลายแล้วทาสีด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. ไรแดง 5. โรคราสีชมพู	ไม่พบการระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร) จำนวน 63 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 63 ไร่	- แนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยสังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการทำลายของหนอน เก็บไข่ไปทำลายเพื่อตัดวงจรระบาด หรือใช้ตาข่ายดักฟั่นหลวมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัย มาทำลายทิ้ง แหล่งที่มีการระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูด และกำจัดแหล่งขยายพันธุ์โดยตัดต้นทุเรียนที่ถูกทำลายรุนแรงจนไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้วไปเผาทิ้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมการระบาดและทำความเสียหายต่อทุเรียนต้นอื่นๆ - แนะนำเกษตรกรตัดยอดหรือกิ่งที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายไปเผาทิ้ง สำหรับต้นที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายระดับรุนแรงแนะนำให้ใช้สารอิมิดาโคลพริด 10 % เอสแอล หรือคาร์โบซันแฟน 20% พ่นให้ทั่วทั้งต้น

หมายเหตุ พื้นที่การระบาด (เพิ่มขึ้น ลดลง) เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 - 19 ก.พ. 62)

1) สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.61 - 19 ก.พ.62 รายงานพบโรคทั้งหมด 42 จังหวัด 203 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 43 จุด ในพื้นที่ 18 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เพชรบุรี ราชบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลาและสตูล

2) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561 มีจังหวัดที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ตรานายก บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครปฐม ชุมพร พังงา ภูเก็ต และนราธิวาส ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ 27,498 ตัว เร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมันได้ 2,360 ตัว

8.2 โรคพิษสุนัขบ้า (ช่วงวันที่ 2 - 8 ก.พ. 62) เกิดโรคทั้งหมด 18 ครั้ง ในสุนัข 16 ครั้ง และในแมว 2 ครั้ง ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ มหาสารคาม นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา และสตูล

8.3 โรคคัลเลอร์โรคซิส (ช่วงวันที่ 2 - 8 ก.พ. 62) พบการระบาดในแพะ 1 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

8.4 โรคพี อาร์ อาร์ เอส (ช่วงวันที่ 2 - 8 ก.พ. 62) พบการระบาดในสุกร 1 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

8.5 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และโรคระบาดสัตว์อื่นๆ ในสัปดาห์นี้

8.6 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 2 - 8 ก.พ. 62) พบการระบาด 5 โรค ใน 6 ประเทศ ดังนี้

- โรคไขหวัดนก ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศคูเวต
- โรควัวบ้า ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศโปแลนด์
- โรค Mycobacterium tuberculosis complex ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศอิสราเอล
- โรคท้องร่วงระบาด ในสุกร 2 ครั้ง ที่ประเทศลาว
- โรคคหิวแอฟริกา ในสุกร 2 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย และยูเครน