



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ


1.1 ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17-19 ตุลาคม 2562)" ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ในช่วงวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562 บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ธารนง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

สำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ทั้งนี้เนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 15 ต.ค. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 16 ต.ค. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.แม่ใจ	พะเยา	35.5	ฝนตกหนัก
2.	อ.บ้านธิ	ลำพูน	34.5	ฝนตกปานกลาง
3.	อ.สีชล	นครศรีธรรมราช	33.0	ฝนตกปานกลาง
4.	อ.กุดบาก	สกลนคร	32.5	ฝนตกปานกลาง
5.	อ.ควนกาหลง	สตูล	31.0	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 62)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 50,997 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 27,069 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (60,503 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 9,506 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 125.21 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 126.58 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 25,070 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 47,719 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 24,177 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (56,917 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 9,198 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 93.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 93.83 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 23,207 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	12,151	49	5,406	30	75	1,001	527	53	427	47	83	25,825	12,678	49	5,834	31	13,147
ตอน.	12	8,368	5,126	61	3,476	52	218	1,998	1,419	71	1,270	69	230	10,367	6,545	63	4,746	55	3,821
กลาง	3	1,419	494	35	434	35	22	369	212	57	188	55	25	1,788	706	39	622	37	1,082
ตะวันตก	2	26,605	23,454	88	10,177	76	7	140	85	61	76	58	9	26,745	23,539	88	10,253	76	3,206
ตะวันออก	6	1,515	935	62	836	58	51	964	685	71	633	69	57	2,479	1,620	65	1,468	63	859
ใต้	4	8,194	5,558	68	3,848	59	39	668	350	52	297	48	43	8,863	5,908	67	4,145	58	2,954
รวม	35	70,926	47,719	67	24,177	51	412	5,140	3,278	64	2,892	61	447	76,067	50,997	67	27,069	52	25,070

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 12,082 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 5,386 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 28.92 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 42.94 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,789 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,868	44	2,068	21	17.65	11.06	22.00	21.80	7,594
สิริกิตี	5,335	56	2,485	37	8.14	8.29	17.28	27.24	4,175
ภูมิพล+สิริกิตี	11,203	49	4,553	28	25.79	19.35	39.28	49.04	11,769
แควน้อยฯ	501	53	458	51	2.68	2.14	3.53	0.86	439
ป่าสักชลสิทธิ์	378	39	375	39	0.45	0.45	0.13	0.13	582
รวมทั้งหมด	12,082	49	5,386	30	28.92	21.94	42.94	50.03	12,789

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 10 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (21%) อ่างฯแม่กงอุดมธราฯ (24%) อ่างฯแม่มอก (28%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (11%) อ่างฯอุบลรัตน์ (2%) อ่างฯลำพระเพลิง (27%) อ่างฯลำนางรอง (18%) อ่างฯทับเสลา (13%) อ่างฯกระเสียว (15%) และ อ่างฯคลองสิียด (30%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 6 อ่าง ได้แก่ อ่างฯ ลำปาว (84%) อ่างฯสิรินธร (95%) อ่างฯศรีนครินทร์(88%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (89%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (92%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (91%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำพระสทิ้ง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำน่าน แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 422 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 424 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.34 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.86 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 120 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 120 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.35 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.42 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +6.06 ม.รทก. (เมื่อวาน +6.06 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝิ่งตะวันออก รวม 163 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 172 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 148 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 10 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 5 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 10 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 11 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 113 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 119 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 42 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 16 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝิ่งตะวันตก รวม 98 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 105 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) ปิด แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 45 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 41 ลบ.ม./วินาที และ คลองเล็กอื่นๆ 12 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 299 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 301 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม								เกณฑ์	หมายเหตุ
		9 ต.ค.	10 ต.ค.	11 ต.ค.	12 ต.ค.	13 ต.ค.	14 ต.ค.	15 ต.ค.	16 ต.ค.		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มน้ำ จ.นนทบุรี	0.16	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.16	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 16 ต.ค. 62	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.04	-10.76
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.56	-11.44
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.27	-10.93
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.49	-10.51
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	2.16	-10.34
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	3.01	-11.49

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 19 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา อุตรธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว ระยอง หัวหิน สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ลำปาง (1) เชียงราย (7) ตาก (1) เพชรบูรณ์ (3) แพร่ (2) อุตรดิตถ์ (1) พะเยา (8) พิษณุโลก (2) น่าน (1) พิจิตร (2)
กลาง	สระบุรี (2) อุทัยธานี (2) ลพบุรี (2) นครสวรรค์ (5) กาญจนบุรี (1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุตรธานี (3) บึงกาฬ (1) หนองคาย (1) นครราชสีมา (3) บุรีรัมย์ (1) สกลนคร (1) อุบลราชธานี (1) เลย (1)
ตะวันออก	ชลบุรี (6)
ใต้	สุราษฎร์ธานี (1)
รวม	รวม 25 จังหวัด (59 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 10 เที่ยวบิน ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	1	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พะเยา(เมืองพะเยา ดอกคำใต้ แม่ใจ) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด)
2. พิษณุโลก	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศค่อนข้างทรงตัว ส่งผลให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
3. ตาก	2	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก(สามเงา) จ.ลำพูน(ลิ)
4. กาญจนบุรี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง(22 น็อต) ส่งผลให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
5. ลพบุรี	2	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
6. นครราชสีมา	1	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (เลิงสา) จ.บุรีรัมย์(โนนดินแดง ละหานทราย) และพื้นที่ ลุ่มรับน้ำเขื่อนมูลบน เขื่อนลำแชะ เขื่อนลำนางรอง อ่างเก็บน้ำลำจังหัน อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ่างเก็บน้ำห้วยเตย
7. ขอนแก่น	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมผิวพื้นและลมชั้นบนมีกำลังแรง ประกอบกับมีลมกระโชกแรงบริเวณสนามบินเป็นระยะ
8. สุรินทร์	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศค่อนข้างทรงตัว ส่งผลให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายก่อตัวเล็กน้อยและสลายตัวเร็ว
9. ระยอง	3	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง
10. สุราษฎร์ธานี	1	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จ.ภูเก็ต
11. สงขลา	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจาก สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ชุดบินกองทัพอากาศ

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 15 ตุลาคม 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 218 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 89.45 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 6,052 เที่ยวบิน (8,578:58 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 59 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง โยธธรบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส และสตูล

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 2,139 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุบโศกบริโภค จำนวน 286 เครื่อง ในพื้นที่ 35 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 216 เครื่อง ในพื้นที่ 28 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 70 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด

เตรียมพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 106 คัน ได้แก่ ภาคเหนือ 24 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน ภาคใต้ 14 คัน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 18 คัน

- ช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 2 จังหวัด ได้แก่ 1) ตาก (ปริมาณน้ำรวม 1,050,000 ลิตร) 2) แพร่ (ปริมาณน้ำรวม 12,000 ลิตร)

สนับสนุนพืชอาหารสัตว์

- สนับสนุนพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 3 จังหวัด 81,860 กิโลกรัม
- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 15 จังหวัด 1,024,300 กิโลกรัม

สนับสนุนอาหารสัตว์ (อาหารอื่นๆ) 18,200 กิโลกรัม

สนับสนุนถุงยังชีพสำหรับสัตว์

- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 13 จังหวัด 2,746 ถุง
- อพยพสัตว์ 127,119 ตัว ปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายสัตว์กลับคืนสู่เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว
- สร้างเสริมสุขภาพสัตว์ 25,010 ตัว รักษาสัตว์ 18,643 ตัว

สนับสนุนเรือประมงน้ำจืดและรถยนต์

- ให้การสนับสนุนรถยนต์ 11 คัน และเรือ 22 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 95 นาย

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 62)

5.1 ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ นครราชสีมา กำแพงเพชร สระแก้ว สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร ขอนแก่น อุทัยธานี เชียงราย พัทลุง น่าน สระบุรี สุโขทัย ลพบุรี บุรีรัมย์ และจังหวัดอุดรธานี จำนวน 147 อำเภอ 1,048 ตำบล 5 เทศบาล 142 ชุมชน 11,405 หมู่บ้าน และได้ประกาศยุติสถานการณ์ในบางพื้นที่ 13 จังหวัด 57 อำเภอ 396 ตำบล 3,751 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 12 ชุมชน ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี 2 อำเภอ เพชรบูรณ์ 10 อำเภอ นครสวรรค์ 9 อำเภอ กำแพงเพชร 4 อำเภอ สระแก้ว 2 อำเภอ สุรินทร์ 1 อำเภอ พิจิตร 9 อำเภอ อุทัยธานี 8 อำเภอ เชียงราย 5 อำเภอ พัทลุง 1 อำเภอ น่าน 1 อำเภอ สระบุรี 3 อำเภอ และจังหวัดสุโขทัย 2 อำเภอ

ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง) จำนวน 8 จังหวัด 89 อำเภอ 652 ตำบล 4 เทศบาล 98 ชุมชน 7,654 หมู่บ้าน

ด้านพืช พบความเสียหายแล้ว 19 จังหวัด เกษตรกร 423,879 ราย พื้นที่ 4,871,266 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4,060,521 ไร่ พืชไร่ 806,891 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 3,855 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 5,452.18 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 6,330 ราย พื้นที่ 74,927 ไร่ เป็นเงิน 85.95 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 3,158.11 ล้านบาท (อยู่ระหว่างขยายวงเงินทดรองฯ 4 จังหวัด คือ จังหวัด สุโขทัย ขอนแก่น พิษณุโลก และจังหวัดสระแก้ว 602.79 ล้านบาท)
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 1,842.49 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 161.10 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างบันทึกประชาคม 204.53 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

5.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 24 ส.ค. – ปัจจุบัน

จังหวัดมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 24 จังหวัด จำนวน 187 อำเภอ 1,228 ตำบล 10,685 หมู่บ้าน 10 เทศบาล 162 ชุมชน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก พิจิตร แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ สุโขทัย ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ นครพนม ตราด ระนอง และจังหวัดชุมพร

สำรวจพบความเสียหายแล้วรวมทั้งสิ้น 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน สุโขทัย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด นครพนม ศรีสะเกษ สกลนคร อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดตราด จำแนกเป็นดังนี้

ด้านพืช สำรวจพบความเสียหายแล้ว 20 จังหวัด เกษตรกร 232,140 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิงรวม 1,967,397 ไร่ แยกเป็น ข้าว 1,784,394 ไร่ พืชไร่ 178,722 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 4,282 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 2,198.43 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 2,015 ราย พื้นที่ 14,833 ไร่ เป็นเงิน 16.70 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 380.26 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 953.46 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 17.80 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างบันทึกประชาคม 830.21 ล้านบาท

ด้านประมง สำรวจพบความเสียหายแล้ว 17 จังหวัด เกษตรกร 12,807 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิงรวม 13,084 ไร่ (บ่อปลา 11,721 ไร่ และบ่อกุ้ง 1,363 ไร่) กระชัง 2,506 ตารางเมตร คิดเป็นวงเงิน 65.19 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 455 ราย พื้นที่(บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 399 ไร่ เป็นเงิน 1.59 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 0.28 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 21.76 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 22.54 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างบันทึกประชาคม 19.02 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 12 จังหวัด เกษตรกร 873 ราย สัตว์ตายหรือสูญหายรวม 48,557 ตัว แยกเป็น โค-กระบือ 25 ตัว สุกร 55 ตัว และสัตว์ปีก 48,477 ตัว คิดเป็นวงเงิน 3.24 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 12 ราย สัตว์ตายหรือสูญหาย 2,718 ตัว เป็นเงิน 0.15 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 0.53 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 2.56 ล้านบาท

5.3 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา (หนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด) เพชรบูรณ์(โรคราน้ำค้าง) เกษตรกร 7,919 ราย พื้นที่ 54,624.25 ไร่ (พืชไร่) สรรพพบความเสียหายแล้ว 2 จังหวัด เกษตรกร 2,326 ราย พื้นที่ 17,056 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 19.58 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว (พะเยา) 2,316 ราย พื้นที่ 16,940 ไร่ เป็นเงิน 19.45 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด เกษตรกร 10 ราย พื้นที่ 116 ไร่ 0.13 ล้านบาท

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ต.ค. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 2. โรคไหม้ข้าว 3. โรคขอบใบแห้งข้าว 4. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 5. แมลงล่า 6. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (แพร่) จำนวน 789 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี มหาสารคาม มุกดาหาร อ่างทอง แพร่ ลำพูน และ สงขลา) จำนวน 7,326 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 469 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (แพร่) จำนวน 22 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุตร และสุพรรณบุรี) จำนวน 12,605 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 120 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 50 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลา และแพร่) จำนวน 107 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 25 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และศัตรูข้าวอื่นๆ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีบเวอเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำเกษตรกรให้งดหว่านปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และแนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ข้าว เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 สันป่าตอง 1 ทางยี่ 71 เป็นต้น - ใช้พันธุ์ข้าวต้านทานแมลงเพลี้ยจักจั่นสีเขียว เช่น กข 1 กข 3 กำจัดวัชพืช และพินาศอาศัยของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะนำโรค - ในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจำควรปลูกข้าว 2 พันธุ์ขึ้นไป โดยปลูกสลับพันธุ์กัน จะช่วยลดความรุนแรงของการระบาด พร้อมทั้งกำจัดพืชอาศัย เช่น หญ้าข้าวหนก หญ้านกสีชมพู หญ้าปล้อง เป็นต้น และเมื่อเริ่มมีการระบาดของหนอนห่อใบในแปลงข้าว ไม่ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเกิน 5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยยูเรียไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อไร่
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก 3. ด่างแรด 4. ด่างกุหลาบ 5. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 15 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 59 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี และกระบี่) จำนวน 689 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 375 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 100 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร) จำนวน 125 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 30 ไร่	- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ให้ตัดทางไปปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนหน้าแมวทำลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย - ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกุหลาบทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรคราขาว 2. โรคใบร่วง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และปัตตานี) จำนวน 1,192 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 57 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 67 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคราขาว โรคใบร่วง และโรคเส้นดำที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราในช่วงฤดูฝน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 95 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ให้เกษตรกรชุดคลุมบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีโปรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น ไร่ละบริเวณที่เป็นโรครากขาวยางพารา
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (พิจิตร อุตรดิตถ์ บัรรัมย์ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ตราด ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สงขลา สตูล พังงา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส และนครศรีธรรมราช) จำนวน 6,133 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 291 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก มหาสารคาม สกลนคร มุกดาหาร บัรรัมย์ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ชุมพร สุราษฎร์ธานี และระนอง) จำนวน 25,249 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 184 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก บัรรัมย์ สงขลา สตูล ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 9,192 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 566 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าว - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนพาราชาทำลายไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปลอຍแต่นเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของ หนอนหัวดำมะพร้าว - ปลอຍแต่นเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรด - ส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของ ด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไรแดงมันสำปะหลัง 3. เพลี้ยหอย 4. โรคโคนเน่าหัวเน่า 5. โรคพุ่มแจ้ 6. โรคใบไหม้ 7. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ลำปาง ชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 646 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลำปาง สระแก้ว ชลบุรี และจังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 10,141 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 398 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และกาญจนบุรี) จำนวน 938 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 910 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 486 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 3 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รมรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน <i>Anagyrus lopezi</i> แผลงข้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน ให้หว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณีแสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าระบาดรุนแรงมากโดยใช้สารเคมีฟอสฟิอิล อลูมิเนียม และ สารจืดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด - จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเกษตร จังหวัดและรายงานผลการสำรวจติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์ - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณะชนเกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	8. แมลงนูน	ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี และ ลพบุรี) จำนวน 65,669 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 9,773 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาด - ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงหัวขาวพญาไรไคโบดำนสำหรับหลัง - ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และควบคุมการระบาด - ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาดจัดทำโครงการณรงค์เพื่อควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดณรงค์
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ดั๋งหนวดยาว 3. แมลงนูนหลวง 4. จักจั่น 5. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 115 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> ไม่มีการระบาด <u>การระบาดลดลง</u> 4,423 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และดั๋งหนวดยาว และใช้เชื้อราบีวเวเรีย และเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใส่พร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกกลลงในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้นหรือหนอนเจาะฝัก 2. หนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) 3. โรคราน้ำค้าง	ไม่พบการระบาด พื้นที่ระบาด 46 จังหวัด จำนวน 1,302,268 ไร่ ได้แก่ พื้นที่ระบาดรุนแรงมาก จำนวน 440,036 ไร่ พื้นที่ระบาดรุนแรงน้อย จำนวน 863,232 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1,025 ไร่ ไม่พบการระบาด	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการระบาดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาดของหนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และภูเก็ต) จำนวน 452 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 55 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและขุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรค - รณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนเจาะผล 3. เพลี้ยแป้ง 4. โรครากรเน่าโคนเน่า 5. โรคราดำ 6. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 34 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> ไม่พบการระบาด พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และชุมพร) จำนวน 10,792 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1,009 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 18 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 17 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- <u>โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน</u> แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - <u>หนอนเจาะลำต้นทุเรียน และหนอนเจาะผล</u> แนะนำให้สังเกตรอยแผลจากการวางไข่ และร่องรอยการทำลายของหนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะผล เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด ทำการกำจัดตัวเต็มวัยของดั๋งหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลุมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนเจาะลำต้นทุเรียนรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึม เช่น อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะเซทาไมพริด 20% เอสพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% ดับบลิวจี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นอัตรา 5 ลิตรต่อต้น พ่นให้ชุ่มเฉพาะ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			บริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน หรือ อาจต้องพ่นสารทุก ๆ 3 เดือน - โรคราดำ โรคใบไหม้ และโรคราสีชมพู ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำ และโรคใบไหม้ ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำ และโรคใบไหม้ ไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ - เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่มีเพลี้ยแป้ง เพื่อให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป หรือใช้น้ำผสมไวท์ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง เนื่องจากเพลี้ยแป้งแพร่ระบาดโดยมีมดพาไป การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไอออน (มาลาไอออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน หรือการพ่นสารฆ่าแมลงไปที่โคนต้นจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งได้

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 14 ต.ค. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 14 ต.ค. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 364 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 30 จุด ในพื้นที่ 17 จังหวัด คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สระบุรี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด หนองคาย เพชรบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย 2 ครั้ง ในโคเนื้อ ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง

7.3 โรค布鲁เซลโลซิส 3 ครั้ง ในโคเนื้อ ที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกำแพงเพชร

7.4 โรคคอบวม 1 ครั้ง ในกระบือ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

7.5 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

7.6 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 21 – 27 ก.ย. 62) พบการระบาด 4 โรค ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 55 ครั้ง ที่ประเทศติมอร์-เลสเต โรมาเนีย ลัตเวีย เกาหลีใต้ ยูเครน ฮังการี จีน รัสเซีย และประเทศบัลแกเรีย

- โรคพิษสุนัขบ้า 1 ครั้ง ในสุนัข ที่ประเทศเมียนมาร์
- โรคไข้หวัดนก (H5N5) ในนก 2 ครั้ง ที่ประเทศไต้หวัน
- โรค West Nile ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศเยอรมนี