



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา


ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2562)" ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนได้แล้ว และคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 29-31 ตุลาคม 2562 ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง และอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีคลื่นสูง 1-2 เมตร และตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ แล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามในช่วงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 27 ต.ค. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 28 ต.ค. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.ท่าชนะ	สุราษฎร์ธานี	34.5	ฝนตกปานกลาง
2.	อ.บางละมุง	ชลบุรี	34.0	ฝนตกปานกลาง
3.	อ.กระเสีสิทธิ์	สงขลา	32.0	ฝนตกปานกลาง
4.	อ.ร้อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	27.0	ฝนตกปานกลาง
5.	อ.เมือง	ประจวบคีรีขันธ์	25.0	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค. 62)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 50,728 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 26,800 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (61,401 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 10,673 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 74.18 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 94.37 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 25,339 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 47,560 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 24,018 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (57,723 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 10,162 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 52.40 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 69.29 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 23,339 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	12,177	49	5,432	30	75	1,001	515	51	415	46	83	25,825	12,692	49	5,847	31	13,134
ตอน.	12	8,368	4,993	60	3,342	50	218	1,998	1,358	68	1,209	65	230	10,367	6,351	61	4,552	53	4,016
กลาง	3	1,419	481	34	421	31	22	369	201	54	177	51	25	1,788	682	38	598	35	1,106
ตะวันตก	2	26,605	23,394	88	10,117	76	7	140	86	61	77	58	9	26,745	23,480	88	10,194	76	3,266
ตะวันออก	6	1,515	941	62	842	59	51	964	637	66	586	64	57	2,479	1,578	64	1,428	61	901
ใต้	4	8,194	5,575	68	3,864	60	39	668	371	56	318	52	43	8,863	5,946	67	4,182	59	2,917
รวม	35	70,926	47,560	67	24,018	51	412	5,140	3,168	62	2,782	59	447	76,067	50,728	67	26,800	51	25,339

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 12,099 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 5,403 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 17.34 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 18.13 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,772 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,931	44	2,131	22	8.83	7.05	6.90	6.90	7,531
สิริกิตี	5,310	56	2,460	37	7.74	7.56	9.06	8.89	4,200
ภูมิพล+สิริกิตี	11,241	49	4,591	28	16.57	14.61	15.96	15.79	11,731
แควน้อยฯ	498	53	455	51	0.77	0.77	1.30	1.30	441
ป่าสักชลสิทธิ์	360	38	357	37	0.00	0.00	0.87	0.87	600
รวมทั้งหมด	12,099	49	5,403	30	17.34	15.38	18.13	17.96	12,772

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 10 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (22%) อ่างฯแม่กงอุดมธรา (23%) อ่างฯแม่มอก (27%) อ่างฯจุฬารามณ์ (11%) อ่างฯอุบลรัตน์ (1%) อ่างฯลำพระเพลิง (20%) อ่างฯลำนางรอง (19%) อ่างฯทับเสลา (14%) อ่างฯกระเสียว (17%) และอ่างฯคลองสียัด (30%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 4 อ่าง ได้แก่ อ่างฯสิรินธร (91%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (82%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (94%) และอ่างฯนฤปดินทรจินดา (93%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสึง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 216 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 223 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.31 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.89 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 75 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.12 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.32 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.58 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.64 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 95 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 95 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 91 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 2 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 2 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหกปิด (เมื่อวาน ปิด) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 39 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 39 ลบ.ม./วินาที) ผ่าน คลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลป์) 8 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 21 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 64 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 66 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุททอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุททอง) ปิด แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 30 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 30 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 4 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 169 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 169 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม								เกณฑ์	หมายเหตุ
	21 ต.ค.	22 ต.ค.	23 ต.ค.	24 ต.ค.	25 ต.ค.	26 ต.ค.	27 ต.ค.	28 ต.ค.		
ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.17	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
ทำนายนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา ไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
ทำนากกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 26 ต.ค. 62	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.40	-10.40
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.06	-11.94
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.26	-10.94
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.62	-10.38
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.97	-10.53
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.67	-11.83

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 19 หน่วย ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว ระยอง หัวหิน สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16-27 ตุลาคม 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	พิษณุโลก (1) เชียงราย (1) เพชรบูรณ์ (1) อุดรดิตถ์ (1)
กลาง	กาญจนบุรี (1) นครสวรรค์ (6) ลพบุรี (3) สิงห์บุรี (1) สุพรรณบุรี (1) อุทัยธานี (2)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์ (1) ขอนแก่น (2) นครราชสีมา (1) บุรีรัมย์ (1) อำนาจเจริญ (1) อุดรธานี (1) อุบลราชธานี (2) ชัยภูมิ (1) นครพนม (1)
ตะวันออก	สระแก้ว (1)
ใต้	-
รวม	รวม 20 จังหวัด (30 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม 2562 มีการปฏิบัติการฝนหลวง 14 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก ดังนี้

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	1	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.เชียงราย(เทิง) และพื้นที่ ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)
2. พิษณุโลก	2	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่มอก จ.ลำปาง(เถิน)
3. ตาก	1	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก(สามเงา)
4. ลพบุรี	5	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.อุทัยธานี(บ้านไร่) จ.นครสวรรค์(แม่วงก์ แม่เปิน) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสือ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
5. กาญจนบุรี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสนามบินติดภารกิจ
6. นครราชสีมา	1	มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์(ละหานทราย โนนดินแดง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำนางรอง อ่างเก็บน้ำลำจังหัน จ.บุรีรัมย์ เขื่อนลำแชะ อ่างเก็บน้ำปลายมาศ จ.นครราชสีมา
7. ขอนแก่น	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศทรงตัวทำให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
8. สุรินทร์	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศทรงตัวทำให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
9. ระยอง	3	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ในพื้นที่การเกษตร จ.ฉะเชิงเทรา(ท่าตะเกียบ) จ.ระยอง(เขาชะเมา วังจันทร์ ปลวกแดง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา อ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง
10. สุราษฎร์ธานี	1	มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จ.ภูเก็ต
11. สงขลา	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมชั้นบนมีกำลังแรง ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว ประกอบกับช่วงบ่ายมีฝนตกบริเวณสนามบินและพื้นที่ใกล้เคียง

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 27 ตุลาคม 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 229 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 89.41 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 6,199 เที่ยวบิน (8,795:26 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 59 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยาแพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส และสตูล

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 2,139 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค จำนวน 298 เครื่อง ในพื้นที่ 38 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 217 เครื่อง ในพื้นที่ 30 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 81 เครื่อง ในพื้นที่ 17 จังหวัด

เตรียมพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 106 คัน ได้แก่ ภาคนเหนือ 24 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน ภาคใต้ 14 คัน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 18 คัน

- ช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 2 จังหวัด ได้แก่ 1) ตาก (ปริมาณน้ำรวม 1,050,000 ลิตร) 2)แพร่ (ปริมาณน้ำรวม 12,000 ลิตร)

สนับสนุนพืชอาหารสัตว์

- สนับสนุนพื้นที่ประสบภาวะฝนแล้ง 3 จังหวัด 81,860 กิโลกรัม
- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 15 จังหวัด 1,024,300 กิโลกรัม

สนับสนุนอาหารสัตว์ (อาหารอื่นๆ) 18,200 กิโลกรัม

สนับสนุนถุงยังชีพสำหรับสัตว์

- สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย 13 จังหวัด 2,746 ถุง
- อพยพสัตว์ 127,119 ตัว ปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายสัตว์กลับคืนสู่เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว
- สร้างเสริมสุขภาพสัตว์ 25,010 ตัว รักษาสัตว์ 18,643 ตัว

สนับสนุนเรือประมงน้ำจืดและรถยนต์

- ให้การสนับสนุนรถยนต์ 11 คัน และเรือ 22 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 95 นาย

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 62)

5.1 ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ นครราชสีมา กำแพงเพชร สระแก้ว สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร ขอนแก่น อุทัยธานี เชียงราย พัทลุง น่าน สระบุรี สุโขทัย ลพบุรี บุรีรัมย์ และจังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน 148 อำเภอ 1,050 ตำบล 5 เทศบาล 142 ชุมชน 11,417 หมู่บ้าน และได้ประกาศยุติสถานการณ์ในบางพื้นที่ 15 จังหวัด 63 อำเภอ 416 ตำบล 3,961 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 44 ชุมชน ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี 2 อำเภอ เพชรบูรณ์ 10 อำเภอ

นครสวรรค์ 9 อำเภอ ศรีสะเกษ 2 อำเภอ กำแพงเพชร 4 อำเภอ สระแก้ว 3 อำเภอ สุรินทร์ 1 อำเภอ พิษณุโลก 3 อำเภอ พิจิตร 9 อำเภอ อุทัยธานี 8 อำเภอ เชียงราย 5 อำเภอ พัทลุง 1 อำเภอ น่าน 1 อำเภอ สระบุรี 3 อำเภอ และจังหวัดสุโขทัย 2 อำเภอ

ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง) จำนวน 8 จังหวัด 89 อำเภอ 652 ตำบล 4 เทศบาล 98 ชุมชน 7,654 หมู่บ้าน

ด้านพืช พบความเสียหายแล้ว 19 จังหวัด เกษตรกร 430,239 ราย พื้นที่ 4,933,085 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4,121,179 ไร่ พืชไร่ 808,052 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 3,855 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 5,521.03 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 17,350 ราย พื้นที่ 212,474 ไร่ เป็นเงิน 242.32 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 4,184.86 ล้านบาท (อยู่ระหว่างขยายวงเงินทดรองฯ 6 จังหวัด คือ จังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก อุทัยธานี ขอนแก่น สระแก้ว และจังหวัดนครสวรรค์ 624.98 ล้านบาท)
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 971.85 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 122.00 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

5.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 24 ส.ค. – ปัจจุบัน

จังหวัดมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 30 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก พิจิตร แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ สุโขทัย ลำปาง ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครพนม สุรินทร์ ตราด หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ กาญจนบุรี ราชบุรี หนองคาย และจังหวัดสระแก้ว

สำรวจพบความเสียหายแล้วรวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ตราด สระแก้ว กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี จำแนกเป็นดังนี้

ด้านพืช สำรวจพบความเสียหายแล้ว 27 จังหวัด เกษตรกร 240,591 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิงรวม 2,029,417 ไร่ แยกเป็น ข้าว 1,825,458 ไร่ พืชไร่ 196,141 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 7,818 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 2,270.12 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 4,875 ราย พื้นที่ 31,760 ไร่ เป็นเงิน 35.68 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 1,248.43 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 464.89 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 354.74 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างบันทึกประชาคม 166.38 ล้านบาท

ด้านประมง สำรวจพบความเสียหายแล้ว 20 จังหวัด เกษตรกร 13,165 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิงรวม 12,716 ไร่ (บ่อปลา 11,703 ไร่ และบ่อกุ้ง 1,013 ไร่) กระชัง 3,037 ตารางเมตร คิดเป็นวงเงิน 61.47 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 4,095 ราย พื้นที่ (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 4,786 ไร่ เป็นเงิน 21.84 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 0.94 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 10.93 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 27.70 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างบันทึกประชาคม 0.06 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 12 จังหวัด เกษตรกร 805 ราย สัตว์ตายหรือสูญหายรวม 45,434 ตัว แยกเป็น โค-กระบือ 26 ตัว สุกร 49 ตัว และสัตว์ปีก 45,359 ตัว คิดเป็นวงเงิน 2.67 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 17 ราย สัตว์ตายหรือสูญหาย 2,723 ตัว เป็นเงิน 0.24 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 0.21 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 0.43 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 1.79 ล้านบาท

5.3 ศัตรูพืชระบาด ช่วงภัยเดือน ม.ค. 62 – ปัจจุบัน

พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) เพชรบูรณ์ (โรคราน้ำค้าง) เกษตรกร 7,919 ราย พื้นที่ 54,624.25 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ 54,176.25 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 448 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 2 จังหวัด เกษตรกร 2,326 ราย พื้นที่ 17,056 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 19.58 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว (พะเยา) 2,316 ราย พื้นที่ 16,940 ไร่ เป็นเงิน 19.45 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด เกษตรกร 10 ราย พื้นที่ 116 ไร่ 0.13 ล้านบาท

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 2. โรคไหม้ข้าว 3. โรคขอบใบแห้ง 4. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 5. แมลงล่า 6. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (แพร่และสุโขทัย) จำนวน 790 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี มุกดาหาร มหาสารคาม สุรินทร์ สงขลา แพร่ และลำพูน) จำนวน 7,442 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 607 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 2 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (อ่างทอง สุพรรณบุรี แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร และลำปาง) จำนวน 18,141 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5,536 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 70 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 100 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 7 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และศัตรูข้าวอื่นๆ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีวเวเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวต้านทานแมลงเพลี้ยจักจั่นสีเขียว เช่น กข 1 กข 3 กำจัดวัชพืช และพืชอาศัยของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะนำโรค - แนะนำเกษตรกรให้ตัดหวานปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และแนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ข้าว เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ข้าวเจ้าหอม พิษณุโลก 1 ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 สันป่าตอง 1 ทางยี่ 71 เป็นต้น - ในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจำควรปลูกข้าว 2 พันธุ์ขึ้นไป โดยปลูกสลับพันธุ์กัน จะช่วยลดความรุนแรงของการระบาด พร้อมทั้งกำจัดพืชอาศัย เช่น หญ้าข้าวคน หญ้ากลีสมพู หญ้าปล้อง เป็นต้น และเมื่อเริ่มมีการระบาดของหนอนห่อใบในแปลงข้าว ไม่ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเกิน 5 กิโลกรัม/ไร่ หรือปุ๋ยยูเรียไม่เกิน 10 กิโลกรัม/ไร่
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก 3. ตัวแรด 4. ตัวงูหลาบ 5. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 15 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กระบี่และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 59 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 670 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 19 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 100 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 125 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของตัวแรด และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนหน้าแมวทำลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย - ใช้กาดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อรามेटาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกตัวแรด และตัวงูหลาบทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรค ลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ สงขลา สตูล นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี และพิจิตร) จำนวน 6,139 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก มหาสารคาม สกลนคร มุกดาหาร บุรีรัมย์ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร)	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูมะพร้าว - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนพาราซ่าทำลายไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของตัวแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปลอญแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว - ปลอญแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรามेटาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแรด - ส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของตัวแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. ตัวแตร	จำนวน 25,216 ไร่ การระบาดลดลง 33 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ตรัง ฉะเชิงเทรา นครนายก บุรีรัมย์ สงขลา สตูล ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 9,189 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วง 3. โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 1,200 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 67 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 95 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วง และโรคเส้นดำที่ก่อให้เกิดความเสียหายช่วงฤดูฝน - ให้เกษตรกรชดเชยพื้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของ - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผิบนพื้นดินที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีโปรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไรแดงมันสำปะหลัง 3. เพลี้ยหอย 4. โรคโคนเน่าหัวเน่า 5. โรคพุ่มแจ้ 6. โรคใบไหม้ 7. โรคใบด่างมันสำปะหลัง 8. แมลงนูน	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ลำปาง และสระแก้ว) จำนวน 646 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี นครราชสีมา ลำปาง และสระแก้ว) จำนวน 10,141 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชลบุรี นครราชสีมา และสระแก้ว) จำนวน 398 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และกาญจนบุรี) จำนวน 934 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 497 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 11 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 3 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (กาญจนบุรี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มหาสารคาม ระยอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และอุบลราชธานี) จำนวน 65,675 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน <i>Anagyrus lopezi</i> แผลงข้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน ให้หว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณีแสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าระบาดรุนแรงมากโดยใช้สารเคมีฟอสฟิไทล อลูมิเนียม และ สารจืดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด - จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและรายงานผลการสำรวจติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์ - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ - วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาด - ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงหิวขาพาหนะโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และควบคุมการระบาด - ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาดจัดทำโครงการณรงค์เพื่อควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดรณรงค์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 43 จังหวัด จำนวน 1,272,016 ไร่ ได้แก่ พื้นที่ระบาดรุนแรงมาก จำนวน 440,011 ไร่ พื้นที่ระบาดรุนแรงน้อย จำนวน 832,005 ไร่ การระบาดลดลง 30,252 ไร่	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการระบาดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนวดยาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และตัวหนวดยาว และใช้เชื้อราบีบาเวเรีย และเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใช้พร้อมท่อนพันธุ์ขณะ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. แมลงนูนหลวง 4. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 115 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	ปลูกหรือคลุมกลลงในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรเฝ้าดินชุดต่อทั้งไม้ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และภูเก็ต) จำนวน 452 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและขุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ - รมรวงศ์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรครากเน่าโคนเน่า 4. โรคราดำ 5. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 34 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 14 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และชุมพร) จำนวน 10,792 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 16 ไร่ <u>การระบาดลดลง 2 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 17 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- <u>โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน</u> แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวัง โดยหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - <u>หนอนเจาะลำต้นทุเรียน และหนอนเจาะผล</u> แนะนำให้สังเกตรอยแผลจากการวางไข่ และร่องรอยการทำลายของหนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะผล เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด ทำการกำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลุมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนเจาะลำต้นทุเรียนรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึม เช่น อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะเซตามิพริด 20% เอสพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไทอะมีโทแซม 25% ดับบลิวจี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นอัตรา 5 ลิตรต่อต้น พ่นให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน หรือทุกๆ 3 เดือน - <u>โรคราดำ โรคใบไหม้ และโรคราสีชมพู</u> ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำและโรคใบไหม้ ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำ และโรคใบไหม้ ไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ - <u>เพลี้ยแป้ง</u> ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่มีเพลี้ยแป้งเพื่อให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป หรือใช้น้ำผสมไวท์ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไธออน (มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไว้ตามกิ่ง สามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 23 ต.ค. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 23 ต.ค. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 364 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 22 จุด ในพื้นที่ 19 จังหวัด คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สระบุรี นนทบุรี ชัยนาท จันทบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เพชรบุรี สมุทรสาคร ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย 2 ครั้ง ในโคนมและกระบือ 1 ครั้ง ที่จังหวัดมหาสารคาม และในโคนม 1 ครั้ง ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.3 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 12 – 18 ต.ค. 62) พบการระบาด 5 โรค ดังนี้

● โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 40 ครั้ง ที่ประเทศบัลแกเรีย จีน ฮังการี ลัตเวีย โปแลนด์ โรมาเนีย สโลวาเกีย เกาหลีใต้ และประเทศยูเครน

- โรคแอนแทรกซ์ 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศภูฏาน
- โรคพิษสุนัขบ้าเทียม (Aujeszky's disease) 1 ครั้ง ในสุกร ที่ประเทศเม็กซิโก
- โรคนิวคาสเซิล 1 ครั้ง ในสัตว์ปีก ที่ประเทศรัสเซีย
- โรคไชร์ฟต์แวลลีย์ 1 ครั้ง ในแพะ ที่ประเทศชูดาน