



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เวลา ๑๕.๐๐ น.)

๑. สภาพอากาศ

๑.๑ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)" ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณพื้นราบของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

๑.๒ ปริมาณน้ำฝน เวลา ๐๗.๐๐ น. วันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒ ถึง เวลา ๐๗.๐๐ น. วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๒



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	66.0	ฝนตกหนัก
2.	อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	20.5	ฝนตกปานกลาง
3.	อ.ระโนด	สงขลา	19.0	ฝนตกปานกลาง
4.	อ.กระแสสินธุ์	สงขลา	16.0	ฝนตกปานกลาง
5.	อ.เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช	12.0	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

๒. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๒)

๒.๑ สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 50,037 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 26,127 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (61,118 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 11,081 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 52.47 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 91.07 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 26,030 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 46,900 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 23,374 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (57,487 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 10,587 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 37.74 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 77.07 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 24,026 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	12,018	48	5,273	29	75	1,001	501	50	402	45	83	25,825	12,519	48	5,675	30	13,306
ตอน.	12	8,368	4,852	58	3,218	48	218	1,998	1,303	65	1,155	63	230	10,367	6,155	59	4,373	51	4,211
กลาง	3	1,419	424	30	364	27	22	369	186	50	162	48	25	1,788	610	34	526	31	1,178
ตะวันออก	2	26,605	23,097	87	9,820	74	7	140	81	58	72	56	9	26,745	23,178	87	9,892	73	3,568
ตะวันออก	6	1,515	922	61	822	58	51	964	672	70	620	69	57	2,479	1,594	64	1,442	62	885
ใต้	4	8,194	5,587	68	3,876	60	39	668	394	59	342	55	43	8,863	5,981	67	4,218	59	2,882
รวม	๓๕	๗๖,๔๒๖	๔๖,๙๖๐	๖๖	๒๓,๓๗๕	๔๙	๔๑๒	๕,๕๔๐	๓,๕๓๗	๖๑	๒,๗๕๕	๕๕	๔๘๗	๗๖,๐๖๗	๔๖,๐๓๗	๖๖	๒๓,๑๒๗	๕๐	๒๖,๐๓๐

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 11,912 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 5,216 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 29) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 10.96 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 24.04 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,959 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,887	44	2,087	22	6.84	9.40	10.00	10.00	7,575
สิริกิตี	5,215	55	2,365	36	3.22	6.94	12.22	12.08	4,295
ภูมิพล+สิริกิตี	๑๑,๑๐๒	๔๘	๔,๔๕๒	๒๗	๑๐.๐๖	๑๖.๓๔	๒๒.๒๒	๒๒.๐๘	๑๑,๘๗๐
แควน้อยฯ	487	52	444	50	0.90	0.30	1.12	1.12	452
ป่าสักชลสิทธิ์	324	35	321	34	0.00	0.60	0.70	0.27	636
รวมทั้งหมด	๑๑,๙๑๒	๔๘	๕,๒๑๖	๒๙	๑๐.๙๖	๑๗.๒๔	๒๔.๐๔	๒๓.๔๗	๑๒,๙๕๖

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 9 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (22%) อ่างฯแม่กวางอุดมธรา (23%) อ่างฯแม่มอก (22%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (10%) อ่างฯอุบลรัตน์ (-1%) อ่างฯลำพระเพลิง (18%) อ่างฯลำนางรอง (18%) อ่างฯทับเสลา (14%) อ่างฯกระเสียว (9%) และอ่างฯคลองสิียด (28%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 5 อ่าง ได้แก่ อ่างฯสิรินธร (93%) อ่างฯศรีนครินทร์ (87%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (86%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (91%) และอ่างฯนฤปดินทรจินดา (93%)

๒.๒ สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ
แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 230 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 232 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.39 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.81 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.00 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.12 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.51 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.51 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 73 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 74 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 70 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 3 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหกปิด (เมื่อวาน ปิด) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 38 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 41 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลย์) 5 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 23 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 53 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 53 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) ปิด แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 25 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 25 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 3 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 104 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 102 ลบ.ม./วินาที)

๒.๓ คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม								เกณฑ์	หมายเหตุ
		๘ พ.ย.	๙ พ.ย.	๑๐ พ.ย.	๑๑ พ.ย.	๑๒ พ.ย.	๑๓ พ.ย.	๑๔ พ.ย.	๑๕ พ.ย.		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแฉะ จ.ปทุมธานี	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มน้ำ จ.นนทบุรี	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

๒.๔ สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ ๑๔ พ.ย. ๖๒	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.84	-10.96
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.06	-11.94
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.18	-11.02
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	0.90	-11.10
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.45	-11.05
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.02	-12.48

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

๓. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 19 หน่วย ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว ระยอง หัวหิน สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา ปัจจุบันปิดหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 18 หน่วย คงเหลือหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 1 หน่วย คือ หน่วยปฏิบัติการฯ สุราษฎร์ธานี

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (ระหว่างวันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร(1) พะเยา(3) พิษณุโลก(1) สุโขทัย(1) เชียงราย(1) แพร่(1)
กลาง	ไม่มีการขอรับบริการ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น(1) ชัยภูมิ(1) มหาสารคาม(13) หนองบัวลำภู(1) อำนาจเจริญ(7)
ตะวันออก	สระแก้ว(1)
ใต้	ราชบุรี(1) เพชรบุรี(1)
รวม	รวม ๑๔ จังหวัด (๓๔ อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไม่มีปฏิบัติการฝนหลวง

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. สุราษฎร์ธานี	-	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศมีลักษณะทรงตัว ส่งผลให้เมฆมีความสูงในพี นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ ๑ มีนาคม - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 241 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 89.20 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 6,280 เที่ยวบิน (8,925:26 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 59 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส และสตูล

๔ การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 2,139 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุบโศกบริโศก จำนวน 304 เครื่อง ในพื้นที่ 38 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 225 เครื่อง ในพื้นที่ 30 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 79 เครื่อง ในพื้นที่ 16 จังหวัด

เตรียมพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 106 คัน ได้แก่ ภาคเหนือ 24 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน ภาคใต้ 14 คัน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 18 คัน

๕ ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒)

๕.๑ ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยเดือน มิ.ย. ๖๒ - ปัจจุบัน

จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ นครราชสีมา กำแพงเพชร สระแก้ว สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร ขอนแก่น อุทัยธานี เชียงราย พัทลุง น่าน สระบุรี สุโขทัย ลพบุรี บุรีรัมย์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 148 อำเภอ 1,050 ตำบล 5 เทศบาล 142 ชุมชน 11,417 หมู่บ้าน และได้ประกาศยุติสถานการณ์ในบางพื้นที่ 15 จังหวัด 63 อำเภอ 416 ตำบล 3,961 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 44 ชุมชน ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี 2 อำเภอ เพชรบูรณ์ 10 อำเภอ นครสวรรค์ 9 อำเภอ ศรีสะเกษ 2 อำเภอ กำแพงเพชร 4 อำเภอ สระแก้ว 3 อำเภอ สุรินทร์ 1 อำเภอ พิษณุโลก 3 อำเภอ พิจิตร 9 อำเภอ อุทัยธานี 8 อำเภอ เชียงราย 5 อำเภอ พัทลุง 1 อำเภอ น่าน 1 อำเภอ สระบุรี 3 อำเภอ และจังหวัดสุโขทัย 2 อำเภอ

ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง) จำนวน ๘ จังหวัด ๘๙ อำเภอ ๖๕๒ ตำบล ๔ เทศบาล ๙๘ ชุมชน ๗,๖๕๔ หมู่บ้าน

ด้านพืช พบความเสียหายแล้ว 19 จังหวัด เกษตรกร 430,964 ราย พื้นที่ 4,935,633 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4,120,963 ไร่ พืชไร่ 810,806 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 3,865 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 5,523.97 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 61,610 ราย พื้นที่ 722,329 ไร่ เป็นเงิน 811.48 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 4,330.67 ล้านบาท (อยู่ระหว่างขยายวงเงินทดรองฯ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา กำแพงเพชร ลพบุรี และจังหวัดน่าน 1,546.58 ล้านบาท)
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 208.19 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 173.63 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

๕.๒ อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ ๒๔ ส.ค. - ปัจจุบัน

จังหวัดมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 30 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก พิจิตร แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ สุโขทัย ลำปาง ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครพนม สุรินทร์ ตราด หนองบัวลำภู ชุมพร บุรีรัมย์ กาญจนบุรี ราชบุรี หนองคาย และจังหวัดสระแก้ว

สำรวจพบความเสียหายแล้วรวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ตราด สระแก้ว กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี จำแนกเป็นดังนี้

ด้านพืช สํารวจพบความเสียหายแล้ว 30 จังหวัด เกษตรกร 242,660 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิงรวม 2,034,562 ไร่ แยกเป็น ข้าว 1,823,759 ไร่ พืชไร่ 202,750 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 8,053 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 2,276.21 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 8,828 ราย พื้นที่ 47,393 ไร่ เป็นเงิน 54.03 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 2,156.60 ล้านบาท (อยู่ระหว่างขยายวงเงินทดรองฯ 6 จังหวัด คือ จังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี 1,409.25 ล้านบาท)
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 60.53 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 5.05 ล้านบาท

ด้านประมง สํารวจพบความเสียหายแล้ว 24 จังหวัด เกษตรกร 13,520 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิงรวม 12,286 ไร่ (บ่อปลา 11,285 ไร่ และบ่อกุ้ง 1,002 ไร่) กระชัง 5,117 ตารางเมตร คิดเป็นวงเงิน 60.23 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 6,051 ราย พื้นที่ (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 6,303 ไร่ กระชัง 4,082 ตรม. เป็นเงิน 29.51 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 25.01 ล้านบาท (อยู่ระหว่างขยายวงเงินทดรองฯ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร หนองคาย 6.10 ล้านบาท อยู่ระหว่างจังหวัดสงกรม 18.91 ล้านบาท)
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 5.70 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ สํารวจพบความเสียหายแล้ว 13 จังหวัด เกษตรกร 1,070 ราย สัตว์ตายหรือสูญหายรวม 55,714 ตัว แยกเป็น โค-กระบือ 25 ตัว สุกร 56 ตัว และสัตว์ปีก 55,633 ตัว คิดเป็นวงเงิน 3.07 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 110 ราย สัตว์ตายหรือสูญหาย 7,301 ตัว เป็นเงิน 0.48 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 0.05 ล้านบาท (อยู่ระหว่างจังหวัดสงกรม 0.05 ล้านบาท)
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 1.88 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 0.66 ล้านบาท

๖. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคไหม้ข้าว 2. โรคขอบใบแห้ง 3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 4. แมลงดำ 5. หนอนห่อใบข้าว 6. แมลงบัว	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี เลย มุกดาหาร มหาสารคาม ศรีสะเกษ สุรินทร์ สงขลา แพร่ ลำพูน ลำปาง และปราจีนบุรี) จำนวน 396,570 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 37,706 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ พิจิตร ลำปาง พิจิตร มหาสารคาม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี) จำนวน 7,342 ไร่ การระบาดลดลง 10,991 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 50 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่ สัปดาห์นี้ไม่มีพื้นที่ระบาด การระบาดลดลง 100 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เลย) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และศัตรูข้าวอื่นๆ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีวเวเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 60 ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 2 ชัยนาท 1 ชัยนาท 2 กข29 และ กข31 และไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก และควบคุม ระดับน้ำในนาได้ หลังปักดำหรือหว่าน 2-3 สัปดาห์จนถึงระยะตั้งท้องควบคุมน้ำในแปลงนา 7-10 วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล - แนะนำเกษตรกรให้จดหว่านปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และแนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ข้าว เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ข้าวเจ้าหอม พิษณุโลก 1 ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 สันป่าตอง 1 หางยี่ 71 เป็นต้น - ประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไหม้คอรวง ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอได้รับสารชีวภัณฑ์และแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ ในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง ขอให้อำเภอพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 9 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนหน้าแมว

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. ดั้วแรด 4. ดั้วกุหลาบ 5. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (พังงา สุราษฎร์ธานี จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 666 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 100 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 80 ไร่ การระบาดคงที่	ทำลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย - ใช้กาดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกตัวแรด และตัวกุหลาบทำลาย ระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซพวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรค ลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว พิจิตร อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ สงขลา สตูล นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต) จำนวน 6,219 ไร่ การระบาดลดลง 11 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก มหาสารคาม สกลนคร มุกดาหาร บุรีรัมย์ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร) จำนวน 25,254 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก บุรีรัมย์ สงขลา สตูล ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 9,328 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 60 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูมะพร้าว - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนพาราซ่าทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของตัวแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปลอຍแดนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนผลิต ขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของ หนอนหัวดำมะพร้าว - ปลอຍแดนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัย มาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแรด - ส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืช ไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของตัวแรดและ ศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วง 3. โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชุมพร และตรัง) จำนวน 1,299 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 90 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ยะลา ตรัง และนราธิวาส) จำนวน 365,850 ไร่ การระบาดลดลง 10,589 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 4 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วง และโรคเส้นดำที่ก่อให้เกิดความเสียหายช่วงฤดูฝน - ให้เกษตรกรกำจัดวัชพืชรอบต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้ โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของ - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีฟิโพรฟิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น - สำหรับต้นยางพาราที่พบว่าเป็นโรคใบร่วงระยะรุนแรง ให้ เกษตรกรใช้สารเคมีโดยวิธีฉีดพ่นลงดินด้วยสาร thiophanate methyl และพ่นทรงพุ่มยางด้วยสาร benomyl, hexaconazole, thiophanate methyl, triadimefon, difenoconazole
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. โรคเน่ามันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา และสระแก้ว) จำนวน 638 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชลบุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ ลำปาง และสระแก้ว) จำนวน 8,878 ไร่ การระบาดลดลง 128 ไร่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน <i>Anagyrus lopezi</i> แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน ให้หว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. เพลี้ยหอย 4. โรคโคนเน่าหัวเน่า 5. โรคพุ่มแจ้ 6. โรคใบไหม้ 7. โรคใบด่างมันสำปะหลัง 8. แมลงนูน	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชลบุรี นครราชสีมา และสระแก้ว) จำนวน 332 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และปราจีนบุรี) จำนวน 76 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 484 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 4 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (กาญจนบุรี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ ปราจีนบุรี มหาสารคาม ระยอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และอุบลราชธานี) จำนวน 69,977 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 458 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่	หรือกรณีแสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าระบาดรุนแรงมากโดยใช้สารเคมี ฟอสฟิไทล อลูมิเนียม และ สารกำจัดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณะชนเกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ - จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและรายงานผลการสำรวจติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์ - วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาด - ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงห้ำหาวพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และควบคุมการระบาด - ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาดจัดทำโครงการณรงค์เพื่อควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดณรงค์
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ดั้วหนวดยาว 3. แมลงนูนหลวง 4. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 115 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และดั้วหนวดยาว และใช้เชื้อราบีวเวอเรีย และเชื้อราเมตาตาไรเซียมควบคุม โดยใส่พร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูกาลปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 42 จังหวัด จำนวน 1,076,622 ไร่ พื้นที่ระบาดรุนแรงมาก จำนวน 362,613 ไร่ พื้นที่ระบาดรุนแรงน้อย จำนวน 714,009 ไร่ การระบาดลดลง 24,364 ไร่	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการระบาดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตราด) จำนวน 432 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและขุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ - รมรณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรครากรเน่าโคนเน่า 4. โรคคราดำ 5. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 34 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 6 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และชุมพร) จำนวน 8,654 ไร่ การระบาดลดลง 2,136 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 6 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 17 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	- โรครากรเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดโรครากรเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - หนอนเจาะลำต้นทุเรียน และหนอนเจาะผล แนะนำให้สังเกตรอยแผลจากการวางไข่ และร่องรอยการทำลายของหนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะผล เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด ทำการกำจัดตัวเต็มวัยของดั้วหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลุมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนเจาะลำต้น

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			ทุเรียนรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึม เช่น อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะเซตามิพริด 20% เอสพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไทอะมีโทแซม 25% ดับบลิวจี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นอัตรา 5 ลิตรต่อต้น พ่นให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน หรือทุกๆ 3 เดือน - โรคราดำ โรคใบไหม้ และโรคราสีชมพู ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำและโรคใบไหม้ ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำ และโรคใบไหม้ ไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ - เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่มีเพลี้ยแป้งเพื่อให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป หรือใช้น้ำผสมไวท์ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไอออน (มาลาไอออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน

๗ สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 5 พ.ย. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 5 พ.ย. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 364 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 17 จุด ในพื้นที่ 14 จังหวัด คือ สระบุรี ชัยนาท จันทบุรี ชลบุรี สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สมุทรสาคร ตรัง นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (ช่วงวันที่ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 62) 20 ครั้ง ในโคเนื้อ (ไพบ์โอ) 3 ครั้ง ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ลำปาง และจังหวัดนครราชสีมา ในโคเนื้อ (ไม่ได้เก็บตัวอย่างรอยโรค) 2 ครั้ง ที่จังหวัดสงขลา และในโคเนื้อและกระบือ (อยู่ระหว่างรอผลแยกชนิด) 15 ครั้ง ที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เชียงราย ตาก พิชณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช

7.3 โรค布鲁เซลลา (ช่วงวันที่ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 62) ในแพะเนื้อ 3 ครั้ง ที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดพิจิตร ในแกะ 1 ครั้ง ที่จังหวัดพิษณุโลก

7.4 โรคพี อาร์ อาร์ เอส และอหิวาต์สุกร (ช่วงวันที่ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 62) 1 ครั้ง ที่จังหวัดพิษณุโลก

7.5 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

7.6 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 62) พบการระบาด 2 โรค ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 37 ครั้ง ที่ประเทศเกาหลีใต้ จีน ฟิลิปปินส์ บัลแกเรีย ฮังการี ลัตเวีย โรมาเนีย และประเทศสโลวาเกีย
- โรคบลูทังก์ ในโค แกะ และแพะ 1 ครั้ง ที่ประเทศแอลจีเรีย