



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา


ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 4 (โซนร้อน) "นากรี" (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562)" ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น.

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้ (8 พ.ย. 2562) พายุระดับ 4 (โซนร้อนรุนแรง) "นากรี" มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 12.3 องศาเหนือ ลองจิจูด 116.5 องศาตะวันออก พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงใต้อย่างช้าๆ มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 10-11 พ.ย. 2562 ขอให้ผู้ที่เดินทางไปประเทศเวียดนามตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วย พายุนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยในระยะนี้ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป

สำหรับ พายุระดับ 4 (โซนร้อนรุนแรง) "บุลบูล" ในอ่าวเบงกอลเคลื่อนตัวทางเหนือ คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าประเทศอินเดีย ตอนบนและบังคลาเทศในช่วงวันที่ 10-11 พ.ย. 2562 ขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วย พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 13-15 พ.ย. 2562 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยมีอากาศเย็นลง และมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 7 พ.ย. 62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 8 พ.ย. 62



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1.	อ.ตะโหนด	พัทลุง	63.0	ฝนตกหนัก
2.	อ.ศรีนครินทร์	พัทลุง	54.5	ฝนตกหนัก
3.	อ.ท้ายเหมือง	พังงา	53.5	ฝนตกหนัก
4.	อ.เมือง	กระบี่	46.5	ฝนตกหนัก
5.	อ.นบพิตำ	นครศรีธรรมราช	44.5	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 62)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 50,315 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 26,389 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (61,181 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 10,866 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 71.80 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 96.39 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 25,752 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 47,145 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 23,606 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (57,571 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 10,426 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 55.19 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 81.14 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 23,782 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	12,064	49	5,319	29	75	1,001	507	51	407	45	83	25,825	12,571	49	5,726	30	13,255
ตอน.	12	8,368	4,886	58	3,239	48	218	1,998	1,320	66	1,171	63	230	10,367	6,206	60	4,410	51	4,161
กลาง	3	1,419	436	31	376	28	22	369	191	52	167	48	25	1,788	627	35	543	32	1,161
ตะวันออก	2	26,605	23,245	87	9,968	75	7	140	83	59	74	56	9	26,745	23,328	87	10,041	75	3,418
ตะวันออก	6	1,515	938	62	838	59	51	964	683	71	631	69	57	2,479	1,621	65	1,469	63	858
ใต้	4	8,194	5,577	68	3,867	60	39	668	386	58	333	54	43	8,863	5,963	67	4,200	59	2,899
รวม	35	70,926	47,145	66	23,606	50	412	5,140	3,170	62	2,783	59	447	76,067	50,315	66	26,389	51	25,752

(หน่วย : ล้าน ลบ.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 11,969 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 5,273 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 29) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 7.37 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 34.02 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,902 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,888	44	2,088	22	1.22	1.27	23.00	23.00	7,574
สิริกิตี	5,256	55	2,406	36	5.63	3.80	8.85	8.96	4,254
ภูมิพล+สิริกิตี	11,144	49	4,494	28	6.85	5.07	31.85	31.96	11,828
แควน้อยฯ	491	52	448	50	0.52	0.60	1.12	1.12	448
ป่าสักชลสิทธิ์	334	35	331	35	0.00	0.00	1.05	1.04	626
รวมทั้งหมด	11,969	48	5,273	29	7.37	5.67	34.02	34.12	12,902

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 10 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (22%) อ่างฯแม่กงอุดมธรา (22%) อ่างฯแม่มอก (22%) อ่างฯจุฬารักษ์ (11%) อ่างฯอุบลรัตน์ (0%) อ่างฯลำพระเพลิง (20%) อ่างฯลำน้ำรอง (18%) อ่างฯทับเสลา (14%) อ่างฯกระเสียว (10%) และอ่างฯคลองสิียด (29%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 5 อ่าง ได้แก่ อ่างฯสิรินธร (94%) อ่างฯศรีนครินทร์ (88%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (87%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (93%) และอ่างฯนฤปดินทรจินดา (94%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
แม่น้ำบางปะกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ
แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 233 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 230 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.41 ม.รทก.ต่ำกว่าตลิ่ง 8.79 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.38 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.36 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.51 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.38 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 69 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 72 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 65 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 3 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 1 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหกปิด (เมื่อวาน ปิด) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 43 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 42 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 5 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 24 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 51 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 51 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมทอง) ปิด แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 25 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 25 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 1 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 107 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 122 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม								เกณฑ์	หมายเหตุ
		1 พ.ย.	2 พ.ย.	3 พ.ย.	4 พ.ย.	5 พ.ย.	6 พ.ย.	7 พ.ย.	8 พ.ย.		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนายนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนากกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 7 พ.ย. 62	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.89	-10.91
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	3.97	-12.03
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.12	-11.08
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.14	-10.86
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.71	-10.79
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.40	-12.10

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 19 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิชณุโลก ตาก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว ระยอง หัวหิน สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2562)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	พะเยา(1) พิชณุโลก(1) สุโขทัย(1) เชียงราย(1) แพร่(1)
กลาง	ไม่มีการขอรับบริการ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น(1) ชัยภูมิ(1) มหาสารคาม(13) หนองบัวลำภู(1) อำนาจเจริญ(7)
ตะวันออก	สระแก้ว (1)
ใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	รวม 11 จังหวัด (29 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 มีปฏิบัติการฝนหลวง 1 เที่ยวบิน คือ

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. สุราษฎร์ธานี	1	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 มีนาคม – 7 พฤศจิกายน 2562)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 238 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 89.18 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 6,274 เที่ยวบิน (8,909:51 ชั่วโมงบิน) จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 59 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยาแพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ชัยนาท สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง โยธาทบุรี อยุธยา ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นราธิวาส และสตูล

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 2,139 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค จำนวน 297 เครื่อง ในพื้นที่ 38 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 225 เครื่อง ในพื้นที่ 33 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 72 เครื่อง ในพื้นที่ 15 จังหวัด

เตรียมพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 106 คัน ได้แก่ ภาคเหนือ 24 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน ภาคใต้ 14 คัน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 18 คัน

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 62)

5.1 ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยเดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน

จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ นครราชสีมา กำแพงเพชร สระแก้ว สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร ขอนแก่น อุทัยธานี เชียงราย พัทลุง น่าน สระบุรี สุโขทัย ลพบุรี บุรีรัมย์ และจังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน 148 อำเภอ 1,050 ตำบล 5 เทศบาล 142 ชุมชน 11,417 หมู่บ้าน และได้ประกาศยุติสถานการณ์ในบางพื้นที่ 15 จังหวัด 63 อำเภอ 416 ตำบล 3,961 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 44 ชุมชน ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี 2 อำเภอ เพชรบูรณ์ 10 อำเภอ นครสวรรค์ 9 อำเภอ ศรีสะเกษ 2 อำเภอ กำแพงเพชร 4 อำเภอ สระแก้ว 3 อำเภอ สุรินทร์ 1 อำเภอ พิษณุโลก 3 อำเภอ พิจิตร 9 อำเภอ อุทัยธานี 8 อำเภอ เชียงราย 5 อำเภอ พัทลุง 1 อำเภอ น่าน 1 อำเภอ สระบุรี 3 อำเภอ และจังหวัดสุโขทัย 2 อำเภอ

ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง) จำนวน 8 จังหวัด 89 อำเภอ 652 ตำบล 4 เทศบาล 98 ชุมชน 7,654 หมู่บ้าน

ด้านพืช พบความเสียหายแล้ว 19 จังหวัด เกษตรกร 431,216 ราย พื้นที่ 4,937,144 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4,122,467 ไร่ พืชไร่ 810,813 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 3,865 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 5,525.65 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 57,887 ราย พื้นที่ 666,808 ไร่ เป็นเงิน 749.20 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 3,701.43 ล้านบาท (อยู่ระหว่างขยายวงเงินทดรองฯ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี นครราชสีมา และจังหวัดกำแพงเพชร 1,473.00 ล้านบาท)
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 900.99 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 174.04 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง ยังไม่มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ

5.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 24 ส.ค. – ปัจจุบัน

จังหวัดมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 30 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก พิจิตร แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ สุโขทัย ลำปาง ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด โยธาทบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครพนม สุรินทร์ ตราด ระนอง ชุมพร บุรีรัมย์ กาญจนบุรี ราชบุรี หนองคาย และจังหวัดสระแก้ว

สำรวจพบความเสียหายแล้วรวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร โยธาทบุรี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ตราด สระแก้ว กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี จำแนกเป็นดังนี้

ด้านพืช สสำรวจพบความเสียหายแล้ว 28 จังหวัด เกษตรกร 241,254 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิงรวม 2,032,099 ไร่ แยกเป็น ข้าว 1,827,687 ไร่ พืชไร่ 196,528 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 7,884 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 2,273.15 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 6,387 ราย พื้นที่ 38,525 ไร่ เป็นเงิน 42.77 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 2,023.19 ล้านบาท (อยู่ระหว่างขยายวงเงินทดรองฯ 4 จังหวัด คือ จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดสุโขทัย 424.01 ล้านบาท)
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 169.89 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 33.49 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างบันทึกประมาณ 3.81 ล้านบาท

ด้านประมง สสำรวจพบความเสียหายแล้ว 21 จังหวัด เกษตรกร 13,588 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิงรวม 12,577 ไร่ (บ่อปลา 11,563 ไร่ และบ่อกุ้ง 1,014 ไร่) กระชัง 5,117 ตารางเมตร คิดเป็นวงเงิน 61.54 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 5,675 ราย พื้นที่ (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 6,047 ไร่ กระชัง 4,054 ตรม. เป็นเงิน 28.42 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 15.09 ล้านบาท (อยู่ระหว่างขยายวงเงินทดรองฯ 0.13 ล้านบาท อยู่ระหว่างจังหวัดสงครม 14.96 ล้านบาท)
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 18.03 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ สสำรวจพบความเสียหายแล้ว 13 จังหวัด เกษตรกร 841 ราย สัตว์ตายหรือสูญหายรวม 50,075 ตัว แยกเป็น โค-กระบือ 24 ตัว สุกร 49 ตัว และสัตว์ปีก 50,002 ตัว คิดเป็นวงเงิน 2.83 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 30 ราย สัตว์ตายหรือสูญหาย 3,951 ตัว เป็นเงิน 0.31 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินทดรองฯ ปลัด 0.22 ล้านบาท (อยู่ระหว่างจังหวัดสงครม 0.22 ล้านบาท)
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.จ. 0.53 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเสนอ ก.ช.ภ.อ. 1.77 ล้านบาท

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 62)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 2. โรคไหม้ข้าว 3. โรคขอบใบแห้ง 4. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 5. แมลงดำ 6. หนอนห่อใบข้าว 7. แมลงบัว	สืบตาค้นไม่มีพื้นที่ระบาด การระบาดลดลง 789 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี เลย มุกดาหาร มหาสารคาม ศรีสะเกษ สุรินทร์ สงขลา แพร่ ลำพูน และ ปราจีนบุรี) จำนวน 358,864 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 69,240 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (อ่างทอง สุพรรณบุรี แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร ลำปาง และ อุบลราชธานี) จำนวน 18,333 ไร่ การระบาดลดลง 259 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา และเลย) จำนวน 58 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (บึงกาฬ) จำนวน 100 ไร่ การระบาดลดลง 100 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เลย) จำนวน 8 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และศัตรูข้าวอื่นๆ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีวเวเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 60 ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 2 ชัยนาท 1 ชัยนาท 2 กข29 และ กข31 และไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก และควบคุม ระดับน้ำในนาได้ หลังปักดำหรือหว่าน 2-3 สัปดาห์จนถึงระยะตั้งท้องควบคุมน้ำในแปลงนา 7-10 วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล - แนะนำเกษตรกรให้ตรวจหาหนอนใยอาหารที่มากไป และแนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ข้าว เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ข้าวเจ้าหอม พิษณุโลก 1 ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 สุรินทร์ 1 เหนียวบูล 2 สันป่าตอง 1 หางยี 71 เป็นต้น - ประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไหม้คอรวง ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอได้รับสารชีวภัณฑ์และแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ ในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง ขอให้อำเภอพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 9 ไร่ การระบาดลดลง 50 ไร่	- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. ดั้วแรด 4. ดั้วกุหลาบ 5. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (พังงา สุราษฎร์ธานี จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 667 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 100 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 80 ไร่ การระบาดลดลง 45 ไร่	- ให้ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนหน้าแมว ทำลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย - ใช้กาดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกุหลาบทำลาย ระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรค ลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว พิจิตร รอุดรธานี บุรีรัมย์ สงขลา สตูล นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต) จำนวน 6,230 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 70 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรด ฉะเชิงเทรา นครนายก มหาสารคาม สกลนคร มุกดาหาร บุรีรัมย์ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร) จำนวน 25,247 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 67 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ตรด ฉะเชิงเทรา นครนายก บุรีรัมย์ สงขลา สตูล ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 9,268 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 156 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูมะพร้าว - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนพาราซ่าทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปลอຍแต่นเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุม การระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนผลิต ขยายแต่นเบียนบราคอน เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของ หนอนหัวดำมะพร้าว - ปลอຍแต่นเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัย มาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรด - ส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืช ไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดและ ศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วง 3. โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 1,209 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนราธิวาส) จำนวน 376,439 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 99,349 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 9 ไร่ การระบาดลดลง 72 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วง และโรคเส้นดำที่ก่อให้เกิดความเสียหายช่วงฤดูฝน - ให้เกษตรกรชุดคู่มือบริเวณต้นที่เป็นโรค เพื่อป้องกันไม่ให้ โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของ - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด - สำหรับระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีฟิโพรโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 3 ลิตรต่อต้น
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. โรคเน่ามันสำปะหลัง 3. เพลี้ยหอย 4. โรคโคนเน่าหัวเน่า 5. โรคพุ่มแจ้	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ลำปาง และสระแก้ว) จำนวน 646 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชลบุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ ลำปาง และสระแก้ว) จำนวน 9,006 ไร่ การระบาดลดลง 1,135 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชลบุรี นครราชสีมา และสระแก้ว) จำนวน 332 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และ ปราจีนบุรี) จำนวน 76 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 51 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 487 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแต่นเบียน <i>Anagyrus lopezi</i> แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักแด้แมลงนูลหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน ให้หว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก หรือกรณีแสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าระบาดรุนแรงมากโดยใช้สารเคมี ฟอสอีทิล อลูมิเนียม และ สารจืดดินตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคไวรัส ใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	6. โรคใบไหม้ 7. โรคใบด่างมันสำปะหลัง 8. แมลงนูน	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 4 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (กาญจนบุรี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ ปราจีนบุรี มหาสารคาม ระยอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และอุบลราชธานี) จำนวน 69,519 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3,843 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ - จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและรายงานผลการสำรวจติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์ - วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์หรือการผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระบาด - ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงหิวขาพาหนะโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และควบคุมการระบาด - ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาดจัดทำโครงการณรงค์เพื่อควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดรณรงค์
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ดั้วหนวดยาว 3. แมลงนูนหลวง 4. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 115 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และดั้วหนวดยาว และใช้เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตตาโรเซียมควบคุม โดยใส่พร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดินหรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูกาลปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 42 จังหวัด จำนวน 1,100,986 ไร่ พื้นที่ระบาดรุนแรงมาก จำนวน 398,179 ไร่ พื้นที่ระบาดรุนแรงน้อย จำนวน 702,807 ไร่ การระบาดลดลง 68,820 ไร่	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการระบาดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตราด) จำนวน 436 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและซุพหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคฯ - รณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
ทุเรียน	1. หนอนเจาะลำต้น 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรครากเน่าโคนเน่า 4. โรคราดำ 5. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 34 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 14 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และชุมพร) จำนวน 10,790 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2,238 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 16 ไร่ การระบาดคงที่	- โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา - หนอนเจาะลำต้นทุเรียน และหนอนเจาะผล แนะนำให้สังเกตรอยแผลจากการวางไข่ และร่องรอยการทำลายของหนอนเจาะลำต้นและหนอนเจาะผล เก็บไข่และหนอนไปทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด ทำการกำจัดตัวเต็มวัยของดั้วหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลุมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้ง สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนเจาะลำต้นทุเรียนรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึม เช่น อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะเซตามิพริด 20% เอสพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไทอะมีโทแซม 25% ดับบลิวจี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			โดยพ่นอัตรา 5 ลิตรต่อต้น พ่นให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน หรือทุกๆ 3 เดือน - โรคราดำ โรคใบไหม้ และโรคราสีชมพู ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราดำและโรคใบไหม้ ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคราดำ และโรคใบไหม้ ไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ - เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดบริเวณผลสุกให้น้ำพ่นบริเวณที่มีเพลี้ยแป้งเพื่อให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป หรือใช้น้ำผสมไวท์ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไอออน (มาลาไอออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไว้ตามกิ่ง สามารถป้องกันไม่ให้แมดคาบเพลี้ยแป้งเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 5 พ.ย. 62)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 5 พ.ย. 62 รายงานพบโรคทั้งหมด 48 จังหวัด 364 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 17 จุด ในพื้นที่ 14 จังหวัด คือ สระบุรี ชัยนาท จันทบุรี ชลบุรี สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สมุทรสาคร ตรัง นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย 2 ครั้ง ในโคนมและกระบือ 1 ครั้ง ที่จังหวัดมหาสารคาม และในโคนม 1 ครั้ง ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.3 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 12 – 18 ต.ค. 62) พบการระบาด 5 โรค ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 40 ครั้ง ที่ประเทศบัลแกเรีย จีน ฮังการี ลัตเวีย โปแลนด์ โรมาเนีย สโลวาเกีย เกาหลีใต้ และประเทศยูเครน

- โรคแอนแทรกซ์ 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศภูฏาน
- โรคพิษสุนัขบ้าเทียม (Aujeszky's disease) 1 ครั้ง ในสุกร ที่ประเทศเม็กซิโก
- โรคนิวคาสเซิล 1 ครั้ง ในสัตว์ปีก ที่ประเทศรัสเซีย
- โรคไข้รพต์แวลลีย์ 1 ครั้ง ในแพะ ที่ประเทศชูดาน