




รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งในระยะนี้ ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 19 ส.ค. 64 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 20 ส.ค. 64



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	ภูเก็ต	95.5	ฝนตกหนักมาก
2	อ.เมือง	นครสวรรค์	89.5	ฝนตกหนัก
3	อ.เมือง	พะเยา	61.2	ฝนตกหนัก
4	อ.เมือง	สกลนคร	36.8	ฝนตกหนัก
5	อ.ฝาง	เชียงใหม่	32.0	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 64)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 38,698 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 14,768 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (34,215 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 45) มากกว่าปี 2563 จำนวน 4,483 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 127.97 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 91.77 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 37,369 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ปริมาณน้ำในอ่างฯ 36,304 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 12,762 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (32,230 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45) มากกว่าปี 2563 จำนวน 4,074 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 109.15 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 70.80 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 34,622 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	8,494	34	1,749	10	75	1,001	409	41	311	34	83	25,825	8,903	34	2,060	11	16,922
ตอน.	12	8,368	3,602	43	1,951	29	218	1,999	957	48	806	44	230	10,367	4,559	44	2,758	32	5,809
กลาง	3	1,419	166	12	106	8	22	369	143	39	119	34	25	1,788	309	17	225	13	1,479
ตะวันตก	2	26,605	18,377	69	5,100	38	7	140	87	61	78	59	9	26,745	18,464	69	5,178	38	8,281
ตะวันออก	6	1,515	711	47	612	43	51	964	457	47	405	44	57	2,479	1,168	47	1,017	44	1,311
ใต้	4	8,194	4,955	60	3,244	50	39	668	341	51	288	47	43	8,863	5,296	60	3,532	50	3,567
รวม	35	70,926	36,304	51	12,762	27	412	5,141	2,394	47	2,006	42	447	76,068	38,698	50	14,768	28	37,369

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,280 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 1,584 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 9) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 41.52 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 21.89 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,591 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	4,462	33	662	7	14.69	8.36	5.00	5.00	9,000
สิริกิตี	3,525	37	675	10	22.94	28.76	10.84	10.92	5,985
ภูมิพล+สิริกิตี	7,987	35	1,337	8	37.63	37.12	15.84	15.92	14,985
แควน้อยฯ	247	26	204	23	3.78	3.78	4.32	4.32	692
ป่าสักชลสิทธิ์	46	5	43	4	0.12	0.00	1.73	1.73	914
รวมทั้งหมด	8,280	33	1,584	9	41.53	40.90	21.89	21.97	16,591

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 15 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (7%) อ่างฯสิริกิตี (10%) อ่างฯแม่กวางอุดมธารา (10%) อ่างฯกึ่งคอกหมา (25%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (23%) อ่างฯแม่มอก(29%) อ่างฯห้วยหลวง(30%) อ่างฯน้ำพุง(29%) อ่างฯอุบลรัตน์ (8%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (4%) อ่างฯทับเสลา (10%) อ่างฯกระเสียว (19%) อ่างฯศรีนครินทร์ (27%) อ่างฯคลองสียัด (7%) และอ่างฯบางพระ (24%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิธิ แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 221 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 225 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.44 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.76 ม. เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.02 ม.รทก. (เมื่อวาน +13.77 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.31 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.44 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 52 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 38 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 46 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 6 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 1 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 30 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 31 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 3 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 7 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 62 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 6 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 26 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 31 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 62 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 64 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
	14 ส.ค.64	15 ส.ค.64	16 ส.ค.64	17 ส.ค.64	18 ส.ค.64	19 ส.ค.64	20 ส.ค.64		
ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.17	0.16	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาเกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
ทำนบกั้นทพรี จ.นนทบุรี	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.31	0.30	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
ทำนบกั้นชลประทานสามเสน กทม.	0.30	0.32	0.30	0.31	0.29	0.33	0.30	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 19 ส.ค. 64	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	4.60	-8.20
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	8.84	-7.16
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	5.65	-6.55
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	6.86	-5.14
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	6.76	-5.74
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	7.41	-7.09

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dmw.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 13 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา สระแก้ว หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16-19 สิงหาคม 2564)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	พิษณุโลก(1) ลำปาง(3) เชียงใหม่(2) ตาก(1) พะเยา(1) พิจิตร(1) ลำพูน(1)
กลาง	นครสวรรค์(3) สุพรรณบุรี(1)
ตะวันออก/เฉียงเหนือ	ขอนแก่น(2) นครราชสีมา(3) บุรีรัมย์(2) ศรีสะเกษ(9) อุตรดิตถ์(1) อุบลราชธานี(2) หนองบัวลำภู(1) ร้อยเอ็ด(5) สุรินทร์(1)
ตะวันออก	ชลบุรี(3) สระแก้ว(2) ฉะเชิงเทรา(7)
ใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	21 จังหวัด (52 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	2	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.เชียงใหม่(ฮอด)
2. ตาก	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มที่ 2 (AZ)
3. พิษณุโลก	5	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พิจิตร (ตงเจริญ ทับคล้อ) จ.นครสวรรค์(หนองบัว ไผ่ศาลี) จ.ชัยภูมิ(บ้านเขว้า หนองบัวแดง หนองบัวระเหว) จ.กำแพงเพชร(คลองลาน) จ.เพชรบูรณ์(บึงสามพัน วังโป่ง ชนแดน) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล จ.กำแพงเพชร
4. ลพบุรี	8	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สระบุรี (วังม่วง มวกเหล็ก) จ.ลพบุรี(พัฒนานิคม ท่าหลวง ชัยบาดาล ลำสนธิ โคกเจริญ) จ.นครสวรรค์(พยุหะคีรี เมือง ไผ่ศาลี ท่าตะโก หนองบัว ตากฟ้า ตาคลี) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี อ่างเก็บน้ำ มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร จ.ลพบุรี บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
5. กาญจนบุรี	8	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี(เลาขวัญ หนองปรือ ศรีสวัสดิ์ บ่อพลอย) จ.สุพรรณบุรี(ด่านช้าง) จ.อุทัยธานี(บ้านไร่) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน จ.กาญจนบุรี อ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี
6. ขอนแก่น	2	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น(ภูผาม่าน สีชมพู ชุมแพ กระนวน เวียงเก่า) จ.กาฬสินธุ์(ท่าคันโท) จ.เลย (ภูกระดึง ผาขาว) จ.หนองบัวลำภู(ศรีบุญเรือง) จ.ชัยภูมิ (คอนสาร)

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
7. อุบลราชธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเข้ารอสนับสนุนเครื่องบินกองทัพอากาศ ประกอบกับช่วงบ่ายเมฆชั้นสูงปกคลุม ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสไม่พัฒนาตัวในพื้นที่ เป้าหมาย
8. นครราชสีมา	3	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา(เสิงสาง ครบุรี วังน้ำเขียว ปากช่อง ปักธงชัย สีคิ้ว สูงเนิน แก้งสนามนาง บ้านเหลื่อม)
9. สุรินทร์	4	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ร้อยเอ็ด(เกษตรวิสัย) จ.สุรินทร์(สังขะ จอมพระ) จ.บุรีรัมย์(พลับพลาชัย ชำนิ ประโคนชัย เฉลิมพระเกียรติ เมืองบุรีรัมย์)
10. สระแก้ว	4	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ฉะเชิงเทรา (แปลงยาว พนมสารคาม สนาบชัยเขต ราชสาส์น บางคล้า) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองระบม จ.ฉะเชิงเทรา
11. หัวหิน	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากกลุ่มเมฆคิวมูลัส มีการก่อตัวใกล้บริเวณแนวชายแดน
12. สุราษฎร์ธานี	1	ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
13. สงขลา	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีเมฆชั้นกลาง-ชั้นสูง ปกคลุมในพื้นที่เป้าหมายตลอดทั้งวัน ส่งผลให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายสลายตัวเร็ว ประกอบกับมีแจ้งเตือน สภาพอากาศบริเวณสนามบินและพื้นที่ใกล้เคียง
รวม	37	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 19 สิงหาคม 2564)

ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 173 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 94.55 ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 3,396 เที่ยวบิน (5,020:12 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 3,008.175 ตัน พลุสารพัดความขึ้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 259 นัด พลุสารพัดความขึ้นแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน 259 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 934 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตก รวม 64 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาแพร่ ตาก แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม ศรีสะเกษ สกลนคร ร้อยเอ็ด เลย สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง หนองสงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีนาปรัง พืชไร่ อุบโศกบริโภค และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 230 เครื่อง แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 97 เครื่อง ในพื้นที่ 13 จังหวัด
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 51 เครื่อง ในพื้นที่ 7 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 82 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด

เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 64)

5.1 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก เชียงราย พิษณุโลก อุดรดิตถ์ เลย และจันทบุรี เกษตรกร 4,174 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 19,239 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,590 ไร่ พืชไร่ 11,171 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 478 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 65 ราย พื้นที่ 293 ไร่ คิดเป็นเงิน 0.34 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 8 ราย พื้นที่ 16 ไร่ วงเงิน 19,739 บาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สระบุรี เลย และจังหวัดตรัง เกษตรกร 586 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ (บ่อปลา) 444 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 136 ราย พื้นที่ 44 ไร่ วงเงิน 0.18 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 134 ราย พื้นที่ 39 ไร่ วงเงิน 0.16 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.2 วาดภัย ช่วงภัยวันที่ 4 ก.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 3,230 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 9,442 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ 118 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 9,324 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 79 ราย พื้นที่ 207 ไร่ คิดเป็นเงิน 0.35 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 2 ราย พื้นที่ 4 ไร่ วงเงิน 6,760 บาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.3 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 10,160 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 96,718 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 12,604 ไร่ พืชไร่ 84,307 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 7 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 3,049 ราย พื้นที่ 31,822 ไร่ คิดเป็นเงิน 36.42 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.4 อุทกภัย วาดภัย ช่วงภัยวันที่ 7 ก.พ. – 17 มิ.ย. 64

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย กำแพงเพชร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำปาง น่าน ตาก พะเยา พิจิตร แพร่ เลย ศรีสะเกษ สระบุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม สระแก้ว ปทุมธานี ราชบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 4,036 ราย พื้นที่ 13,517 ไร่ คิดเป็นเงิน 18.36 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 4,032 ราย พื้นที่ 13,509 ไร่ วงเงิน 18.35 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ยังไม่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 64)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. หนอนห่อใบข้าว 3. โรคไหม้ข้าว 4. แมลงสิง 5. หนอนกอข้าว 6. หนอนกัดใบข้าว 7. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (น่าน) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่ 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กระบี่ นครศรีธรรมราช และสงขลา) จำนวน 315 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 251 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (น่าน แพร่ ลำปาง อุทัยธานี นครราชสีมา มุกดาหาร สกลนคร อุบลราชธานี จันทบุรี ปัตตานี และสงขลา) จำนวน 1,233 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 96 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กระบี่) จำนวน 11 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 73 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (แพร่ ลำปาง อุทัยธานี นครราชสีมา สกลนคร และสงขลา) จำนวน 612 ไร่ การระบาดลดลง 67 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและชีวเวอเรีย รมรวงให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรรดหวานปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรคไหม้ข้าว - ประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไหม้คอรวง และคำแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง - แนะนำให้เกษตรกรดูแลแปลงข้าวหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ และเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้น ในข้าวอายุ 6-7 วัน ให้น้ำเข้าแปลงนาจนระดับน้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน แต่หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไธออน เซฟวิน เป็นต้น
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 9,184 ไร่ การระบาดลดลง 29 ไร่ พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (มหาสารคาม สกลนคร จันทบุรี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์	- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ ทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุม การระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. ดั้วแรด	เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 19,648 ไร่ การระบาดลดลง 304 ไร่	- ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรด - โรสี้ขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในหัวผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สมารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่น จนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสี้ขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยให้สลักกลุ่มสารฆ่าไรตามลักษณะกลไกการออกฤทธิ์โดย IRAC
	4. ดั้ววงง	พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง นครปฐม สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี ภูเก็ต ยะลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 7,789 ไร่ การระบาดลดลง 29 ไร่	
	5. โรสี้ขา	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ราชบุรี ชุมพร พังงา ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 998 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	
	6. หนอนกินใบมะพร้าว	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,109 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	
		พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นราธิวาส และปัตตานี) จำนวน 814 ไร่ การระบาดลดลง 130 ไร่	
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด(ระยอง ชลบุรี ตราด สงขลา สตูล ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,832 ไร่ การระบาดลดลง 32 ไร่	- รมรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มให้สะอาด กำจัดวัชพืช เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย และแนะนำใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - ใช้กาดักไฟโรโมนและใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียมกำจัดด้วงและตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรดทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี)
	2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สตูล ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 808 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	
ยางพารา	1. โรครากขาว	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต นราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,112 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาด - ให้เกษตรกรขุดคุ้ยบริเวณต้นที่เป็นโรคกว้าง 30 ซม.ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกิ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันการระบาด - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว และโรคใบร่วง
	2. โรคใบร่วง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด(ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 95,653 ไร่ การระบาดลดลง 730 ไร่	
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (แพร่ อุทัยธานี ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู มุกดาหาร มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 752 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 39 ไร่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แผลงข้างปีกใส่ และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักด้แมลงวันทอง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - รมรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด
	2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สีชมพู	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว และเพชรบุรี) จำนวน 2,561 ไร่ การระบาดลดลง 43 ไร่	
	3. โรแดงมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด(พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย บุรีรัมย์ นครราชสีมา มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สทบุรี จันทบุรี ชลบุรี และระยอง) จำนวน 21,014 ไร่ การระบาดลดลง 542 ไร่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. เพลี้ยหอย 5. แมลงงูหนวล 6. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และชลบุรี) จำนวน 428 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (อุทัยธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา มุกดาหาร อุบลราชธานี ลพบุรี ชลบุรี ระยอง และเพชรบุรี) จำนวน 107,566 ไร่ การระบาดลดลง 91,389 ไร่	- ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แผลงข้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักแด้แมลงงูหนวล รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนวดยาว 3. จักจั่น	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เลย สระแก้ว และชลบุรี) จำนวน 462 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) จำนวน 828 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง และใช้เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูปลูกต่อไปและให้ชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อย
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลำปาง นครราชสีมา ยะลา และบุรีรัมย์) จำนวน 26 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 29 จังหวัด (ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา เลยหนองบัวลำภู อุบลราชธานี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 63,026 ไร่ การระบาดลดลง 4,373 ไร่	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด - ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และแจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm
สับปะรด	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 8 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่	- ให้เกษตรกรสำรวจและทำความสะอาดแปลงอย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชข้างเคียง เพื่อทำลายพืชอาศัย - หากพบการระบาดระยะรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมี
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรครากเน่าโคนเน่า 4. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 731 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 140 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร และยะลา) จำนวน 443 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 50 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ ชุมพร ปัตตานี นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,628 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 11 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จังหวัดตราด กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 97 ไร่ การระบาดคงที่	- เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หนอนเจาะผลทุเรียน เมื่อพบรอยทำลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทำลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไปโดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือกิ่งไม้กั้นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าทำลายหลบอาศัย อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
เงาะ	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินช่อดอก	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 23 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 3 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการระบาดของให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งจะทำให้เพลี้ยไฟต้านทานสารฆ่าแมลงได้
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรคน้ำจุด	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร กระบี่ ยะลา ระนอง และนครศรีธรรมราช) จำนวน 382 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และชุมพร) จำนวน 44 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และยะลา) จำนวน 135 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการระบาดของโรคใบจุดให้ตัดแต่งกิ่งหรือใบที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. โรคราดำ 3. เพลี้ยแป้ง 4. มวนลำไย 5. เพลี้ยหอย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 668 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 18 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 187 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 18 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดลดลง 5,415 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เลย) จำนวน 37 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ลำพูน) จำนวน 2,400 ไร่ การระบาดคงที่ 2,400 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งลำไยไม่ให้ต้นหนาจนเกินไป จับตัวเต็มวัยตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย ถ้าพบระบาดปริมาณมากใช้ยาฆ่าแมลง โดยพ่นในช่วงเวลาที่ลำไยกำลังเกิดช่อดอกและติดผล - หากพบต้นลำไยที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดกิ่งลำไยออกไปทิ้งนอกแปลง แล้วเผาทำลายในทันที และพ่นต้นลำไยด้วยสารป้องกันกำจัดโร 2 ครั้ง

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 64)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 8 สิงหาคม 2564 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 35 จังหวัด 179 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 15 จุด ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรดิตถ์ พัทลุง และสงขลา ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย ประจำวันที่ 9 ส.ค. 64

วันนี้ ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อย ดังนี้

ที่	วันที่เริ่มป่วย	ชนิดสัตว์ *กรร1	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ประวัติวัคซีน	ป่วย	ตาย	เสี่ยง	ผลตรวจ
-ไม่มี-											

ตารางแสดงสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี 2564 การกระจายและการเปรียบเทียบ

จังหวัดที่สถานะโรคยังไม่สงบ (จำนวนสถานะควบคุมโรค/เฝ้าระวังโรค)		นครปฐม (4/0) นครราชสีมา(3/9) สระบุรี(2/0) มหาสารคาม(1/0) นครสวรรค์(1/0) เชียงใหม่(0/1) นครศรีธรรมราช(0/1) นครพนม(0/1)			
ช่วงเวลา	พบโรค (ครั้ง)	สัตว์ป่วย (ตัว)	ตาย (ตัว)	จังหวัด (จังหวัด)	สูงสุด 10 จังหวัดแรก (จำนวนครั้ง รายงานการพบโรค/จำนวนสัตว์ป่วยสะสม)
30 วันย้อนหลัง	0	0	0	0	-
ปี 2564	14	233	9	10	นครราชสีมา(3/15) กระบี่(2/45) ลำพูน(2/7) เชียงใหม่(1/76) ตาก(1/59) สระบุรี(1/19) เชียงราย(1/11) ลพบุรี(1/0) พังงา(1/1) นครศรีธรรมราช(1/1)
ปี 2563	218	7,547	212	41	นครราชสีมา(34/455) สงขลา(19/818) นครศรีธรรมราช(17/376) ขอนแก่น(10/79) มหาสารคาม(9/265) สระบุรี(8/938) ลพบุรี(8/136) พิษณุโลก(8/8) ราชบุรี(7/789) ชัยภูมิ(7/156)
รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครั้ง)			Type A(0) Type O(8) Type O และ A(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค (0) ไม่ทราบ Type(4) และรอผล Lab(2)		
ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม *กรร 1			โคนม(4/109) โคเนื้อ(10/124) กระบือ(0/0) แพะนม(0/0) สุกร(0/0) ไม่ทราบ(0/0)		

หมายเหตุ : *กรร1 คือ รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น

7.3 โรคลัมปีสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค. 2564)

1) พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 10 ส.ค. 2564 รวม 62 จังหวัด 783 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 557,870 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 183,036 ตัว สัตว์ตายสะสม 41,970 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคเนื้อ	กรุงเทพฯ (102/17) ชัยนาท(1,981/319) ปทุมธานี(289/4) อุดรธานี(106/12) ลพบุรี(513/33) สระบุรี(63/3) สิงห์บุรี(70/8) อ่างทอง(533/95) ฉะเชิงเทรา(447/4) ชลบุรี(221/10) ปราจีนบุรี(119/8) สมุทรปราการ(4/0) สระแก้ว(6,851/326) จันทบุรี(6/0) ชัยภูมิ(5,677/613) นครราชสีมา (47,179/1,638) บุรีรัมย์(61,929/4,083) ยโสธร(2,672/116) ศรีสะเกษ(31,838/1,316) สุรินทร์(50,336/3,358) อำนาจเจริญ(11,486/1,453) อุบลราชธานี(40,689/4,301) กาฬสินธุ์(20,192/2,197) ขอนแก่น(30,665/3,036) นครพนม(8,392/640) บึงกาฬ(2,055/243) มหาสารคาม (33,965/4,010) มุกดาหาร(25,301/825) ร้อยเอ็ด(55,581/4,043) เลย(3,555/180) สกลนคร(21,895/2,139) หนองคาย(4,310/396) หนองบัวลำภู(3,730/380) อุดรธานี(14,399/1,417) เชียงราย(809/19) เชียงใหม่(90/0) น่าน(1,241/43) พะเยา(246/5)แพร่(476/19) ลำปาง (2,616/130) ลำพูน(82/3) ตาก(20,015/689) นครสวรรค์(346/29) พิจิตร(33/23) พิษณุโลก(3,477/108) เพชรบูรณ์(1,212/68) สุโขทัย (2,349/342) อุดรดิตถ์ (352/53) อุทัยธานี(245/27) กำแพงเพชร(80/8) กาญจนบุรี(8,552/740) นครปฐม(332/33) ประจวบคีรีขันธ์ (3,392/264) เพชรบุรี(4,925/507) ราชบุรี(1,821/62) สุพรรณบุรี(6,151/733) สมุทรสาคร(49/1) สมุทรสงคราม(153/0) ชุมพร(401/25) กระบี่(25/0) ยะลา(11/1) สงขลา(97/0)
โคนม	กรุงเทพฯ (3/2) ชัยนาท(33/0) ลพบุรี(72/0) สระบุรี(4/0) สระแก้ว(111/2) จันทบุรี(2/0) ชัยภูมิ(125/10) นครราชสีมา(974/23) บุรีรัมย์ (867/37) ศรีสะเกษ(80/4) สุรินทร์(84/9) กาฬสินธุ์(17/0) ขอนแก่น(659/109) นครพนม(2/0) มหาสารคาม(282/27) เลย(249/7) สกลนคร (670/47) หนองบัวลำภู(44/2) อุดรธานี(361/39) เชียงราย(711/48) เชียงใหม่(135/4)แพร่(1/0) ลำปาง(19/3) ลำพูน(146/20) พิจิตร(69/1) เพชรบูรณ์(14/2) สุโขทัย (229/11) กาญจนบุรี(177/17) นครปฐม(94/0) ประจวบคีรีขันธ์(592/37) เพชรบุรี(225/6) ราชบุรี(689/6) สุพรรณบุรี(36/9)
กระบือ	กรุงเทพฯ (2/2) ชัยนาท(3/0) ลพบุรี(2/0) สระแก้ว(7/5) ชัยภูมิ(13/2) นครราชสีมา(45/4) บุรีรัมย์(377/36) ศรีสะเกษ(49/6) สุรินทร์ (222/17) อำนาจเจริญ(1/2) อุบลราชธานี(219/22) กาฬสินธุ์(72/24) ขอนแก่น(329/95) นครพนม(81/0) บึงกาฬ(14/2) มหาสารคาม (153/37) มุกดาหาร(32/5) ร้อยเอ็ด(974/33) เลย(10/0) สกลนคร(285/32) หนองคาย(38/7) หนองบัวลำภู(32/4) อุดรธานี(50/6) น่าน (2/0) ตาก(7/2) พิษณุโลก(27/1) สุโขทัย (2/0) กาญจนบุรี(1/1) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี(10/0)
กระทิง	ประจวบคีรีขันธ์(4/0)

2) วันนี้พบสัตว์ป่วยเพิ่มขึ้น 1,060 ตัว ตาย 238 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วย/จำนวนสัตว์ตาย
โคเนื้อ	ชัยนาท(35/14) ปทุมธานี(10/0) ลพบุรี(19/1) สระบุรี(3/0) สิงห์บุรี(0/2) ฉะเชิงเทรา(1/0) ปราจีนบุรี(8/0) สระแก้ว(48/6) จันทบุรี(4/0) ชัยภูมิ(28/12) บุรีรัมย์(0/9) สุรินทร์(5/2) อำนาจเจริญ(12/8) อุบลราชธานี(125/41) กาฬสินธุ์(13/5) ขอนแก่น(74/16) นครพนม(3/4) บึงกาฬ(0/1) มหาสารคาม(77/38) มุกดาหาร(1/3) เลย(4/0) สกลนคร(35/4) หนองคาย(3/3) หนองบัวลำภู(4/2) อุดรธานี(3/8) เชียงราย (11/0) น่าน(25/2) พะเยา(5/2)แพร่(16/0) ลำปาง(181/6) ลำพูน(3/0) นครสวรรค์(31/3) พิษณุโลก(10/2) สุโขทัย (49/15) อุดรดิตถ์ (9/3) นครปฐม(2/0) ประจวบคีรีขันธ์(36/5) เพชรบุรี(8/0) ราชบุรี(8/1) สุพรรณบุรี(13/5) ชุมพร(17/3)
โคนม	ลพบุรี(11/0) สระแก้ว(78/0) สกลนคร(7/2)) ลำปาง(0/1) ลำพูน(10/4) สุโขทัย(1/0) ประจวบคีรีขันธ์(12/2) ราชบุรี(1/0)
กระบือ	บุรีรัมย์(0/1) อำนาจเจริญ(1/1) อุบลราชธานี(0/1)

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 171,119 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 32,618 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 125,303 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 145,434 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 116,096 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 335,318 ราย

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2564) พบการระบาด 26 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 22 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสุกร 9 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย เยอรมัน ยูเครน โดมินิกัน ภูฏาน
 - ในหมูป่า 13 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย รัสเซีย ฮังการี
- โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 4 ครั้ง แบ่งเป็น
 - โรคบลูทังจีในโคเนื้อ/แกะ 1 ครั้ง ที่ประเทศสเปน
 - โรค SARS-CoV ในสิงโต 1 ครั้ง ที่ประเทศแอฟริกาใต้
 - โรคไข้ฟัดวาลเลย์ในโคเนื้อ 1 ครั้ง ที่ประเทศเคนยา
 - โรคนิวคาสเซิลในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย