



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 29 สิงหาคม 2564 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก เนื่องจากร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้

สำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 28 ส.ค. 64 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 29 ส.ค. 64



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.บางพลี	สมุทรปราการ	120.6	ฝนตกหนักมาก
2	อ.แม่สอด	ตาก	108.8	ฝนตกหนักมาก
3	อ.อุ้มผาง	ตาก	80.9	ฝนตกหนัก
4	อ.เมือง	นครนายก	62.8	ฝนตกหนัก
5	อ.สัตหีบ	ชลบุรี	57.8	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 64)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 39,161 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 15,230 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 29) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (35,961 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47) มากกว่าปี 2563 จำนวน 3,200 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 217.95 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 84.11 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 36,907 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 36,723 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 13,180 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (33,801 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48) มากกว่าปี 2563 จำนวน 2,922 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 175.48 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 68.61 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 34,204 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	8,656	35	1,911	11	75	1,001	428	43	329	37	83	25,825	9,084	35	2,240	12	16,742
ตอน.	12	8,368	3,567	43	1,916	29	218	1,999	945	47	794	43	230	10,367	4,512	44	2,710	32	5,856
กลาง	3	1,419	169	12	109	8	22	369	142	38	118	34	25	1,788	311	17	227	13	1,477
ตะวันตก	2	26,605	18,505	70	5,228	39	7	140	87	61	78	60	9	26,745	18,592	70	5,306	39	8,154
ตะวันออก	6	1,515	817	54	718	51	51	964	499	52	447	49	57	2,479	1,316	53	1,164	50	1,162
ใต้	4	8,194	5,009	61	3,299	51	39	668	337	50	284	46	43	8,863	5,346	60	3,583	50	3,516
รวม	35	70,926	36,723	52	13,182	28	412	5,141	2,438	47	2,050	43	447	76,068	39,161	50	15,230	29	36,907

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,423 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 1,727 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 10) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 48.46 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 14.78 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,449 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	4,529	34	729	8	24.88	18.75	3.00	5.00	8,933
สิริกิติ์	3,603	38	753	11	14.93	16.38	7.03	7.01	5,907
ภูมิพล+สิริกิติ์	8,132	35	1,482	9	39.81	35.13	10.03	12.01	14,840
แควน้อยฯ	247	26	204	23	7.12	7.69	4.32	4.32	692
ป่าสักชลสิทธิ์	43	4	40	4	1.53	1.36	0.43	0.43	917
รวมทั้งหมด	8,423	34	1,727	10	48.46	44.18	14.78	16.76	16,449

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 15 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (8%) อ่างฯสิริกิติ์ (11%) อ่างฯแม่กวอดมธรา (12%) อ่างฯก๊วคหมา (29%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (23%) อ่างฯแม่มอก (29%) อ่างฯห้วยหลวง (30%) อ่างฯอุบลรัตน์ (5%) อ่างฯลำปาว (28%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (4%) อ่างฯทับเสลา (12%) อ่างฯกระเสียว (20%) อ่างฯศรีนครินทร์ (28%) อ่างฯคลองสิียด (15%) และอ่างฯบางพระ (25%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำบางปะกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 180 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 167 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.16 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 9.04 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 50 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 50 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.20 ม.รทก.

(เมื่อวาน +14.24 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.17 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.17 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 61 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 62 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก

(ปตร.มโนรมย์) 53 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 7 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 1 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 1 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 28 ลบ.ม./วินาที

(เมื่อวาน 26 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 3 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้

(ปตร.พระศรีเสาวภาค) 7 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 69 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร

(ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 5 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 25 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 30 ลบ.ม./วินาที และคลองอื่นๆ

9 ลบ.ม./วินาที

อบางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
	23 ส.ค.64	24 ส.ค.64	25 ส.ค.64	26 ส.ค.64	27 ส.ค.64	28 ส.ค.64	29 ส.ค.64		
ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	0.19	0.19	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
ทำนบกม.ทพ. จ.นนทบุรี	0.29	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	ปกติ	
ทำนบกม.ชลประทานสามเสน กทม.	0.30	0.32	0.32	0.31	0.30	0.28	0.28	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 28 ส.ค. 64	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	3.86	-8.94
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	8.26	-7.74
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	5.73	-6.47
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	6.31	-5.69
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	6.02	-6.48
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	6.80	-7.70

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 13 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา สระแก้ว หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16-28 สิงหาคม 2564)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	พิษณุโลก(2) ลำปาง(4) เชียงใหม่(3) ตาก(2) พะเยา(1) พิจิตร(3) ลำพูน(3) อุตรดิตถ์(1) เพชรบูรณ์(1) สุโขทัย(1)
กลาง	นครสวรรค์(6) สุพรรณบุรี(3) ชัยนาท(3) อุทัยธานี(1) ลพบุรี(2) กาญจนบุรี(2)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น(8) นครราชสีมา(7) บุรีรัมย์(2) ศรีสะเกษ(12) อุตรดิตถ์(13) อุบลราชธานี(12) หนองบัวลำภู(2) ร้อยเอ็ด(8) สุรินทร์(3) มหาสารคาม(3) กาฬสินธุ์(3) เลย(1) ชัยภูมิ(1) สกลนคร(1)
ตะวันออก	ชลบุรี(3) สระแก้ว(3) ฉะเชิงเทรา(7)
ใต้	พัทลุง(1) ประจวบคีรีขันธ์(1) เพชรบุรี(1)
รวม	36 จังหวัด (130 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2564

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	3	1.การกักป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.เชียงใหม่(สันกำแพง)จ. พะเยา(เมืองพะเยา เชียงม่วน ดอกคำใต้ แม่ใจ)จ.ลำปาง(เมืองลำปาง) 2.การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ จ.พะเยา
2. ตาก	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากท้องฟ้าปิดมีฝนตกบริเวณสนามบินเป็นระยะตลอดทั้งวัน
3. พิษณุโลก	4	การกักป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พิจิตร(ตะพานหิน ดงเจริญ โพธิ์ประทับช้าง บางมูลนาก) จ.พิษณุโลก(วังทอง)
4. ลพบุรี	3	1.การกักป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ (แม่เปิน แม่वंก ชุมตาบง ลาดยาว) จ.อุทัยธานี(ลานสัก ห้วยคตสว่างอารมณ์) จ.กำแพงเพชร(ขาณุวรลักษบุรี) 2.การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสลา อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว จ.อุทัยธานี อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์จ.นครสวรรค์
5. กาญจนบุรี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากนักบินเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
6. ขอนแก่น	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเครื่องบินขัดข้อง (cover assay power hyd. acces hing ชำรุดไม่สามารถปิดใช้งานได้)
7. อุบลราชธานี	1	การกักป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ศรีสะเกษ(ไพรบึง ศรีรัตน ชู ชันธิ์ ปรารักษ์) ขุนหาญ กันทรลักษณ์ เบญจลักษณ์)
8. นครราชสีมา	4	1.การกักป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา(โนนสูง ขาม สะแกแสง ประทาย ห้วยแถลง พิมาย จักราช บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง เฉลิมพระเกียรติ) จ.บุรีรัมย์(ขามเมือง ลำปลายมาศ หนองหงส์ บ้านด่าน พลับพลาชัย นางรอง เมืองบุรีรัมย์) จ.ขอนแก่น(หนองสองห้อง)

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
		2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อ่างเก็บน้ำห้วยจะเข้ปาก จ.บุรีรัมย์
9. สุรินทร์	3	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ศรีสะเกษ(ศีลาลาด)
10. สระแก้ว	2	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ฉะเชิงเทรา(บางคล้า แปลงยาว สนามชัยเขต) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองระบม จ.ฉะเชิงเทรา
11. หัวหิน	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเจ้าหน้าที่(นักบิน) เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2
12. สุราษฎร์ธานี	2	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สุราษฎร์ธานี(ดอนสัก)2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ ลุ่มรับน้ำเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
13. สงขลา	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศมีเสถียรภาพประกอบกับมีเมฆชั้นกลาง-ชั้นสูงปกคลุมในพื้นที่เป้าหมาย ตลอดทั้งวัน ส่งผลให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
รวม	25	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 28 สิงหาคม 2564)

ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 182 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 94.78 ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 3,729 เที่ยวบิน (5,475:03 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 3,312.075 ตัน พลุสารพัดความขึ้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 295 นัด พลุสารพัดความขึ้นแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน 295 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 940 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตก รวม 64 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาแพร่ ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม ศรีสะเกษ สกลนคร ร้อยเอ็ด เลย สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง หนองสงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีนาปรัง พืชไร่ ไร่ ไร่โพด ไร่โพด และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 230 เครื่อง แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 97 เครื่อง ในพื้นที่ 13 จังหวัด
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 51 เครื่อง ในพื้นที่ 7 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 82 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด

เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค. 64)

5.1 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก เชียงราย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เลย และ จันทบุรี เกษตรกร 4,385 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 19,263 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,547 ไร่ พืชไร่ 11,237 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 478 ไร่ สรรพพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 732 ราย พื้นที่ 4,504 ไร่ คิดเป็นเงิน 5.23 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 207 ราย พื้นที่ 1,322 ไร่ วงเงิน 1.54 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก สระบุรี เลย และจังหวัดตรัง เกษตรกร 501 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ ได้แก่ บ่อปลา 315 ไร่ กระชัง 1,200 ตร.ม. สรรพพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 136 ราย พื้นที่ 44 ไร่ วงเงิน 0.18 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 134 ราย พื้นที่ 39 ไร่ วงเงิน 0.16 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.2 วาดภัย ช่วงภัยวันที่ 4 ก.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 3,239 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 9,463 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ 118 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 9,345 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 95 ราย พื้นที่ 255 ไร่ คิดเป็นเงิน 0.41 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 14 ราย พื้นที่ 34 ไร่ วงเงิน 41,200 บาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.3 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 10,160 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 96,918 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 12,604 ไร่ พืชไร่ 84,307 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 7 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 3,143 ราย พื้นที่ 32,539 ไร่ คิดเป็นเงิน 37.24 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.4 อุทกภัย วาดภัย ช่วงภัยวันที่ 7 ก.พ. – 17 มิ.ย. 64

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย กำแพงเพชร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำปาง น่าน ตาก พะเยา พิจิตร แพร่ เลย ศรีสะเกษ สระบุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม สระแก้ว ปทุมธานี ราชบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 4,036 ราย พื้นที่ 13,517 ไร่ คิดเป็นเงิน 18.36 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 4,032 ราย พื้นที่ 13,509 ไร่ วงเงิน 18.35 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ยังไม่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 64)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. หนอนทอใบข้าว 3. โรคไหม้ข้าว 4. แมลงสิง 5. หนอนกอข้าว 6. หนอนกัดใบข้าว 7. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (น่าน) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กระบี่ นครศรีธรรมราชและสงขลา) จำนวน 318 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง อุทัยธานี นครราชสีมา สกลนคร อุบลราชธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช ปัตตานี และสงขลา) จำนวน 1,299 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 66 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลาและสุราษฎร์ธานี) จำนวน 109 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาฬสินธุ์ และกระบี่) จำนวน 39 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 28 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 73 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (แพร่ ลำปาง อุทัยธานี นครราชสีมา สกลนคร และสงขลา) จำนวน 619 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอเรีย รมรวงให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรงดหว่านปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไปและให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรคไหม้ข้าว - ประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไหม้คอรวง และคำแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง - แนะนำให้เกษตรกรดูแลแปลงข้าวหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ และเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวอายุ 6-7 วัน ให้นำน้ำเข้าแปลงนาจนระดับน้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน แต่หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไอออน เซฟวิน เป็นต้น
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 9,268 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 84 ไร่ พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต	- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ ทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุม การระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคโดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับตัวแมลงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาโรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแมลง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. ตัวแตร	ยลสา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 19,552 ไร่ <u>การระบาดลดลง 96 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี ภูเก็ต ยลสา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี)จำนวน 7,778 ไร่ <u>การระบาดลดลง 11 ไร่</u>	- ไรสีขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในช่วงผลมะพร้าวทำให้ การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการ ป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจัน จนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็น ระยะที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำ ของกรมวิชาการเกษตร โดยให้สลับกลุ่มสารฆ่าไรตาม ลักษณะกลไกการออกฤทธิ์โดย IRAC
	4. ตัวงวง	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประ จวบคีรีขันธ์ ราชบุรี พังงา ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 995 ไร่ <u>การระบาดลดลง 3 ไร่</u>	
	5. ไรสีขา	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,109 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	
	6. หนอนกินใบมะพร้าว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นราธิวาส ปัตตานี และสุ ราษฎร์ธานี) จำนวน 964 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 150 ไร่</u>	
ปาล์มน้ำมัน	1. ตัวแตร	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ระยอง ชลบุรี ตราด สงขลา สตูล ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,808 ไร่ <u>การระบาดลดลง 23 ไร่</u>	- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มให้สะอาด กำจัดวัชพืช เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย และแนะนำให้ใช้ยาไตรโคเดอร์มา - ใช้กาคักฟีโรโมนและใช้ตาข่ายดักจับตัวแตรในระยะตัวเต็มวัย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียมกำจัดด้งและตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกตัวแตรทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี)
	2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช) จำนวน 822 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 14 ไร่</u>	
ยางพารา	1. โรครากขาว	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ชุมพร ภูเก็ต นราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,083 ไร่ <u>การระบาดลดลง 9 ไร่</u>	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาด - ให้เกษตรกรหยุดคู่ออมบริเวณต้นที่เป็นโรคกว้าง 30 ซม. ถึง 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกิ่งกลางระหว่าง แถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันการระบาด - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว และโรคใบร่วง
	2. โรคใบร่วง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง สงขลา และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 95,603 ไร่ <u>การระบาดลดลง 50 ไร่</u>	
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (แพร่ อุทัยธานี ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 693 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 59 ไร่</u>	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แผลงข้างปีกใส และ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และ ดักด้งแมลงมูลหอย รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบ ดำมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แผลงข้างปีกใส และ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง
	2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สีชมพู	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้วและเพชรบุรี) จำนวน 2498 ไร่ <u>การระบาดลดลง 63 ไร่</u>	
	3. ไรแดงมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (พะเยา พิจนุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร เลย ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ลพบุรี จันทบุรี ชลบุรี และระยอง) จำนวน 19,906 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1,108 ไร่</u>	
	4. เพลี้ยหอย		

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	5. แมลงนูนหลวง 6. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และชลบุรี) จำนวน 428 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ลพบุรี ชลบุรี สระแก้วและเพชรบุรี) จำนวน 103,821 ไร่ การระบาดลดลง 3,745 ไร่	- ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และ ดักด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนวดยาว 3. จักจั่น	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เล สระแก้ว และชลบุรี) จำนวน 462 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) จำนวน 828 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง และใช้เชื้อรา บิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูปลูกต่อไปและให้ ขุดตอทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อย
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลำปาง นครราชสีมา ยะลา และบุรีรัมย์) จำนวน 26 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 29 จังหวัด ได้แก่ (ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 79,306 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 16,280 ไร่	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลัง ประสบปัญหาและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด - ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริม การเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และแจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm
สับปะรด	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 11 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	- แนะนำให้เกษตรกรสำรวจและทำความสะอาดแปลง อย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชข้างเคียง เพื่อทำลายพืชอาศัย - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งระยะรุนแรง แนะนำ ให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรครากเน่าโคนเน่า 4. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 728 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร และยะลา) จำนวน 553 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 110 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,696 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 68 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จังหวัดตราด กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 97 ไร่ การระบาดคงที่	- เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบ การระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกร หมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หนอนเจาะผลทุเรียน เมื่อพบรอยทำลายของหนอนให้ใช้ ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลาย ผลทุเรียนที่เน่า และร่วงเพราะถูกหนอนทำลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัด แต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไปโดยเฉพาะผลที่อยู่ ติดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือกิ่งไม้กั้นระหว่างผล เพื่อ ป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าทำลายหลบ อาศัย อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ
เงาะ	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 23 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการระบาดให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควร พ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งจะทำเพลี้ยไฟ ต้านทานสารฆ่าแมลงได้
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร กระบี่ ยะลา ระนอง และนครศรีธรรมราช) จำนวน 382 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ตัดแต่งกิ่งหรือใบที่เป็น โรคนำออกไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้ สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. เพลี้ยแป้ง 3. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และชุมพร) จำนวน 44 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ยะลา) จำนวน 131 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. โรคราดำ 3. เพลี้ยแป้ง 4. มวนลำไย 5. เพลี้ยหอย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 675 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 291 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 104 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 19,899 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 19,874 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เลย) จำนวน 37 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ลำพูน) จำนวน 2,400 ไร่ การระบาดคงที่ 2,400 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งลำไยไม่ให้ต้นหนาจนเกินไป จับตัวเต็มวัยตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย ถ้าพบระบาดปริมาณมากใช้ยาฆ่าแมลง โดยพ่นในช่วงเวลาที่ลำไยกำลังเกิดช่อดอกและติดผล - หากพบต้นลำไยที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดกิ่งลำไยออกไปทิ้งนอกแปลง แล้วเผาทำลายในทันที และพ่นต้นลำไยด้วยสารป้องกันกำจัดโร 2 ครั้ง

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 64)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 25 สิงหาคม 2564 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 35 จังหวัด 179 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 16 จุด ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สุรินทร์ เชียงใหม่ อุดรดิตถ์ และสงขลา ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย ประจำวันที่ 9 ส.ค. 64

วันนี้ **ไม่มี**รายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อย ดังนี้

ที่	วันที่เริ่มป่วย	ชนิดสัตว์ *กรร	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ประวัติวัคซีน	ป่วย	ตาย	เสี่ยง	ผลตรวจ
-ไม่มี-											

ตารางแสดงสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี 2564 การกระจายและการเปรียบเทียบ

จังหวัดที่สถานะโรคยังไม่สงบ (จำนวนสถานะควบคุมโรค/เฝ้าระวังโรค)		นครปฐม (4/0) นครราชสีมา(3/9) สระบุรี(2/0) มหาสารคาม(1/0) นครสวรรค์(1/0) เชียงใหม่(0/1) นครศรีธรรมราช(0/1) นครพนม(0/1)			
ช่วงเวลา	พบโรค (ครั้ง)	สัตว์ป่วย (ตัว)	ตาย (ตัว)	จังหวัด (จังหวัด)	สูงสุด 10 จังหวัดแรก (จำนวนครั้ง รายงานการพบโรค/จำนวนสัตว์ป่วยสะสม)
30 วันย้อนหลัง	0	0	0	0	-
ปี 2564	14	233	9	10	นครราชสีมา(3/15) กระบี่(2/45) ลำพูน(2/7) เชียงใหม่(1/76) ตาก(1/59) สระบุรี(1/19) เชียงราย(1/11) ลพบุรี(1/0) พังงา(1/1) นครศรีธรรมราช(1/1)
ปี 2563	218	7,547	212	41	นครราชสีมา(34/455) สงขลา(19/818) นครศรีธรรมราช(17/376) ขอนแก่น(10/79) มหาสารคาม(9/265) สระบุรี(8/938) ลพบุรี(8/136) พิษณุโลก(8/8) ราชบุรี(7/789) ชัยภูมิ(7/156)
รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครั้ง)		Type A(0) Type O(8) Type O และ A(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค (0) ไม่ทราบ Type(4) และรอผล Lab(2)			
ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม *กรร 1		โคนม(4/109) โคเนื้อ(10/124) กระบือ(0/0) แพะนม(0/0) สุกร(0/0) ไม่ทราบ(0/0)			

หมายเหตุ : *กรร1 คือ รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น

7.3 โรคลัมปีสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค. 2564)

1) พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 10 ส.ค. 2564 รวม 62 จังหวัด 783 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 557,870 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 183,036 ตัว สัตว์ตายสะสม 41,970 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคเนื้อ	กรุงเทพฯ (102/17) ชัยนาท(1,981/319) ปทุมธานี(289/4) อุดรธานี(106/12) สบู่บุรี(513/33) สระบุรี(63/3) สิงห์บุรี(70/8) อ่างทอง(533/95) ฉะเชิงเทรา(447/4) ชลบุรี(221/10) ปราจีนบุรี(119/8) สมุทรปราการ(4/0) สระแก้ว(6,851/326) จันทบุรี(6/0) ชัยภูมิ(5,677/613) นครราชสีมา (47,179/1,638) บุรีรัมย์(61,929/4,083) ยโสธร(2,672/116) ศรีสะเกษ(31,838/1,316) สุรินทร์(50,336/3,358) อำนาจเจริญ(11,486/1,453) อุบลราชธานี(40,689/4,301) กาฬสินธุ์(20,192/2,197) ขอนแก่น(30,665/3,036) นครพนม(8,392/640) บึงกาฬ(2,055/243) มหาสารคาม (33,965/4,010) Mukdahan(25,301/825) ร้อยเอ็ด(55,581/4,043) เลย(3,555/180) สกลนคร(21,895/2,139) หนองคาย(4,310/396) หนองบัวลำภู(3,730/380) อุดรธานี(14,399/1,417) เชียงราย(809/19) เชียงใหม่(90/0) น่าน(1,241/43) พะเยา(246/5) แพร่(476/19) ลำปาง (2,616/130) ลำพูน(82/3) ตาก(20,015/689) นครสวรรค์(346/29) พิจิตร(33/23) พิษณุโลก(3,477/108) เพชรบูรณ์(1,212/68) สุโขทัย (2,349/342) อุดรดิตถ์ (352/53) อุทัยธานี(245/27) กำแพงเพชร(80/8) กาญจนบุรี(8,552/740) นครปฐม(332/33) ประจวบคีรีขันธ์ (3,392/264) เพชรบุรี(4,925/507) ราชบุรี(1,821/62) สุพรรณบุรี(6,151/733) สมุทรสาคร(49/1) สมุทรสงคราม(153/0) ชุมพร(401/25) กระบี่(25/0) ยะลา(11/1) สงขลา(97/0)
โคนม	กรุงเทพฯ (3/2) ชัยนาท(33/0) สบู่บุรี(72/0) สระบุรี(4/0) สระแก้ว(111/2) จันทบุรี(2/0) ชัยภูมิ(125/10) นครราชสีมา(974/23) บุรีรัมย์ (867/37) ศรีสะเกษ(80/4) สุรินทร์(84/9) กาฬสินธุ์(17/0) ขอนแก่น(659/109) นครพนม(2/0) มหาสารคาม(282/27) เลย(249/7) สกลนคร (670/47) หนองบัวลำภู(44/2) อุดรธานี(361/39) เชียงราย(711/48) เชียงใหม่(135/4) แพร่(1/0) ลำปาง(19/3) ลำพูน(146/20) พิจิตร(69/1) เพชรบูรณ์(14/2) สุโขทัย (229/11) กาญจนบุรี(177/17) นครปฐม(94/0) ประจวบคีรีขันธ์(592/37) เพชรบุรี(225/6) ราชบุรี(689/6) สุพรรณบุรี(36/9)
กระบือ	กรุงเทพฯ (2/2) ชัยนาท(3/0) สบู่บุรี(2/0) สระแก้ว(7/5) ชัยภูมิ(13/2) นครราชสีมา(45/4) บุรีรัมย์(377/36) ศรีสะเกษ(49/6) สุรินทร์ (222/17) อำนาจเจริญ(1/2) อุบลราชธานี(219/22) กาฬสินธุ์(72/24) ขอนแก่น(329/95) นครพนม(81/0) บึงกาฬ(14/2) มหาสารคาม (153/37) Mukdahan(32/5) ร้อยเอ็ด(974/33) เลย(10/0) สกลนคร(285/32) หนองคาย(38/7) หนองบัวลำภู(32/4) อุดรธานี(50/6) น่าน (2/0) ตาก(7/2) พิษณุโลก(27/1) สุโขทัย (2/0) กาญจนบุรี(1/1) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี(10/0)
กระทิง	ประจวบคีรีขันธ์(4/0)

2) วันนี้พบสัตว์ป่วยเพิ่มขึ้น 1,060 ตัว ตาย 238 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วย/จำนวนสัตว์ตาย
โคเนื้อ	ชัยนาท(35/14) ปทุมธานี(10/0) สบู่บุรี(19/1) สระบุรี(3/0) สิงห์บุรี(0/2) ฉะเชิงเทรา(1/0) ปราจีนบุรี(8/0) สระแก้ว(48/6) จันทบุรี(4/0) ชัยภูมิ(28/12) บุรีรัมย์(0/9) สุรินทร์(5/2) อำนาจเจริญ(12/8) อุบลราชธานี(125/41) กาฬสินธุ์(13/5) ขอนแก่น(74/16) นครพนม(3/4) บึงกาฬ(0/1) มหาสารคาม(77/38) Mukdahan(1/3) เลย(4/0) สกลนคร(35/4) หนองคาย(3/3) หนองบัวลำภู(4/2) อุดรธานี(3/8) เชียงราย (11/0) น่าน(25/2) พะเยา(5/2) แพร่(16/0) ลำปาง(181/6) ลำพูน(3/0) นครสวรรค์(31/3) พิษณุโลก(10/2) สุโขทัย (49/15) อุดรดิตถ์ (9/3) นครปฐม(2/0) ประจวบคีรีขันธ์(36/5) เพชรบุรี(8/0) ราชบุรี(8/1) สุพรรณบุรี(13/5) ชุมพร(17/3)
โคนม	สบู่บุรี(11/0) สระแก้ว(78/0) สกลนคร(7/2)) ลำปาง(0/1) ลำพูน(10/4) สุโขทัย (1/0) ประจวบคีรีขันธ์(12/2) ราชบุรี(1/0)
กระบือ	บุรีรัมย์(0/1) อำนาจเจริญ(1/1) อุบลราชธานี(0/1)

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคโคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 171,119 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 32,618 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 125,303 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 145,434 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 116,096 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 335,318 ราย

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2564) พบการระบาด 26 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 22 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสุกร 9 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย เยอรมัน ยูเครน โดมินิกัน ภูฏาน
 - ในหมูป่า 13 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย รัสเซีย ฮังการี
- โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 4 ครั้ง แบ่งเป็น
 - โรคบลูทั้งจีในโคเนื้อ/แกะ 1 ครั้ง ที่ประเทศสเปน
 - โรค SARS-CoV ในสิงโต 1 ครั้ง ที่ประเทศแอฟริกาใต้
 - โรคไข้ฟัดวาลเลย์ในโคเนื้อ 1 ครั้ง ที่ประเทศเคนยา
 - โรคนิวคาสเซิลในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย