



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุโซนร้อน ลูปีต" ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 06 สิงหาคม 2564 เวลา 05.00 น.

เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (6 ส.ค. 64) พายุโซนร้อน “ลูปีต” มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ หรือที่ละติจูด 24.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 117.7 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่างช้าๆ คาดว่าจะเคลื่อนไปทางเกาะไหหลำในช่วงวันที่ 6-7 ส.ค. 64 พายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 5 ส.ค. 64 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 6 ส.ค. 64



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	นครนายก	84.7	ฝนตกหนัก
2	อ.เมือง	กระบี่	36.8	ฝนตกหนัก
3	อ.เมือง	ระนอง	32.0	ฝนตกปานกลาง
4	อ.เมือง	ภูเก็ต	29.3	ฝนตกปานกลาง
5	อ.โชคชัย	นครราชสีมา	27.0	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ส.ค. 64)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 37,895 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 13,966 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (32,641 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43) มากกว่าปี 2563 จำนวน 5,254 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 314.36 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 101.84 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 38,173 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 35,397 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 11,854 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 25) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (30,931 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44) มากกว่าปี 2563 จำนวน 4,466 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 298.36 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 80.88 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 35,530 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม.)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	8,374	34	1,629	9	75	1,001	414	41	315	35	83	25,825	8,788	34	1,943	10	17,038
ตอน.	12	8,368	3,717	44	2,066	31	218	1,999	1,020	51	870	47	230	10,367	4,737	46	2,936	34	5,631
กลาง	3	1,419	204	14	144	11	22	369	162	44	138	40	25	1,788	366	20	282	17	1,422
ตะวันตก	2	26,605	17,562	66	4,285	32	7	140	92	66	83	63	9	26,745	17,654	66	4,368	32	9,092
ตะวันออก	6	1,515	663	44	563	40	51	964	464	48	412	45	57	2,479	1,127	45	975	42	1,352
ใต้	4	8,194	4,877	60	3,167	49	39	668	346	52	293	48	43	8,863	5,223	59	3,460	49	3,640
รวม	35	70,926	35,397	50	11,854	25	412	5,141	2,498	49	2,112	44	447	76,067	37,895	49	13,966	27	38,173

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แคว้นน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8,178 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 1,482 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 8) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 66.44 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 28.95 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,693 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	4,418	33	618	6	17.88	13.27	5.00	5.00	9,044
สิริกิตี	3,422	36	572	9	40.05	41.84	17.04	12.01	6,088
ภูมิพล+สิริกิตี	7,840	34	1,190	7	57.93	55.11	22.04	17.01	15,132
แคว้นน้อยฯ	268	29	225	25	6.08	6.72	5.62	5.62	671
ป่าสักชลสิทธิ์	70	7	67	7	2.43	0.00	1.30	0.35	890
รวมทั้งหมด	8,178	33	1,482	8	66.44	55.11	28.95	22.98	16,693

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 14 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (6%) อ่างฯสิริกิตี (8%) อ่างฯแม่กวงอุดมธารา (11%) อ่างฯกึ่งคอกหมา (28%) อ่างฯแคว้นน้อยบำรุงแดน (25%) อ่างฯน้ำพุ (30%) อ่างฯอุบลรัตน์ (11%) อ่างฯสิรินธร (30%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (7%) อ่างฯทับเสลา (10%) อ่างฯกระเสียว (25%) อ่างฯศรีนครินทร์ (21%) อ่างฯคลองสิียด (8%) และอ่างฯบางพระ (27%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสวึง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 154 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 162 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +16.86 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 9.34 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 75 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +13.85 ม.รทก.

(เมื่อวาน +13.99 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.49 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.54 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 51 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 54 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 40 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 9 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 1 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 34 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 30 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 3 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีสวภาค) 8 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 62 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 63 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 6 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 26 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 25 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 5 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 103 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 102 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		31 ก.ค.64	1 ส.ค.64	2 ส.ค.64	3 ส.ค.64	4 ส.ค.64	5 ส.ค.64	6 ส.ค.64		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.33	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 5 ส.ค. 64	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	3.43	-9.37
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	9.08	-6.92
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	6.04	-6.16
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	6.51	-5.49
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	6.78	-5.72
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	7.83	-6.67

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dmw.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 13 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิชณุโลก ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา สระแก้ว หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1-5 สิงหาคม 2564)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร(1) ลำปาง(2) พิจิตร(1) เพชรบูรณ์(1)
กลาง	นครสวรรค์(3) อุทัยธานี(1) สระบุรี(1)
ตะวันออก/เฉียงเหนือ	หนองคาย(9) นครราชสีมา(3) บุรีรัมย์(3) ร้อยเอ็ด(1) ศรีสะเกษ(3) สุรินทร์(1) อุตรดิตถ์(1) อำนาจเจริญ(1) กาฬสินธุ์(1) หนองบัวลำภู(1) ขอนแก่น(2)
ตะวันออก	ชลบุรี(2) ระยอง(1) สระแก้ว(1) นครนายก(1)
ใต้	นครศรีธรรมราช(3) ประจวบคีรีขันธ์(5) เพชรบุรี(2)
รวม	24 จังหวัด (57 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	2	ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่
2. ตาก	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆชั้นกลาง-ชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้าก็มีฝนตกบริเวณสนามบินและพื้นที่โดยรอบเป็นระยะ
3. พิชณุโลก	3	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กำแพงเพชร(บึงสามัคคี) จ.พิจิตร(เมือง โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง วังทรายพูน สากเหล็ก ทับคล้อ) จ.พิษณุโลก(บางกระทุ่ม วังทอง เนินมะปราง) จ.เพชรบูรณ์(วังโป่ง)
4. ลพบุรี	4	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.อ่างทอง(เมืองป่าโมก โพธิ์ทอง ไชโย สามโก้) จ.สระบุรี(เมือง บ้านหมอ ดอนพุด หนองโดน พระพุทธบาท เสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ แก่งคอย วังม่วง มวกเหล็ก) จ.ลพบุรี(เมือง ท่าวังพัฒนานิคม) จ.อุทัยธานี(สว่างอารมณ์) จ.นครสวรรค์ (เมือง ลาดยาว ชุมแสง ท่าตะโก) จ.พระนครศรีอยุธยา(บ้านแพรก महाराช บางปะหัน ท่าเรือ) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
5. กาญจนบุรี	3	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สุพรรณบุรี(อุทองดอนเจดีย์ ศรีประจันต์ สามชุก เมือง)

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
6. ขอนแก่น	1	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สกลนคร (เจริญศิลป์ วานรนิวาส วาชิภุมิ)
7. อุบลราชธานี	1	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ศรีสะเกษ(วังหิน เมือง พยุห์ น้ำเกลี้ยง กันทรารมย์) จ.อุบลราชธานี(ลำโรง วารินชำราบ เดชอุดม นาเยีย พิบูลมังสาหาร สิรินคร บუნทริก)
8. นครราชสีมา	2	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา(หนองบุญมาก จักราช ห้วยแถลง พิมาย) จ.บุรีรัมย์(หนองกี่ หนองหงส์ ชานี ลาปลายมาศ โนนสุวรรณ นางรอง เฉลิมพระเกียรติ บ้านด่าน ห้วยราช กระสัง เมือง) จ.สุรินทร์(พนมดงรัก กาบเชิง จอมพระ เขวาสินรินทร์ ท่าตูม สังขะ เมือง)
9. สุรินทร์	3	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์(ประโคนชัย พลับพลาชัย) จ.สุรินทร์(ปราสาท ลำดวน ศีขรภูมิ ศรีณรงค์ เมือง) จ.ร้อยเอ็ด(สุวรรณภูมิ โพนทราย หนองฮี) จ.ยโสธร(คำเขื่อนแก้ว เมือง) จ.ศรีสะเกษ(ปรางค์กู่ ขุขันธ์)
10. สระแก้ว	2	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สระแก้ว(วัฒนานคร ตาพระยา) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จ.สระแก้ว
11. หัวหิน	1	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
12. สุราษฎร์ธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเข้านอนสนับสนุนเครื่องบินที่เข้าที่ตั่ง บน.7 ช่วงบ่ายลมมีระดับปฏิบัติการ มีกำลังแรงส่งผลให้เมฆคิวมูลัสเคลื่อนตัวออกนอกพื้นที่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว
13. สงขลา	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมชั้นบนมีกำลังแรง ส่งผลให้กลุ่มเมฆเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว
รวม	22	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 5 สิงหาคม 2564)

• ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 159 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 94.23 ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 3,11 เที่ยวบิน (4,469:07 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 2,656.875 ตัน พลุสารดูดความชื้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 217 นัด พลุสารดูดความชื้นแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน 218 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 926 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 64 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาแพร่ ตาก แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม ศรีสะเกษ สกลนคร ร้อยเอ็ด เลย สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชบุรี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ระนอง สงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีนาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 221 เครื่อง แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 90 เครื่อง ในพื้นที่ 13 จังหวัด
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 49 เครื่อง ในพื้นที่ 6 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 82 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด

เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ส.ค. 64)

5.1 อุทกภัย วาตภัย ช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก เชียงราย แพร่ พิจิตร โลก เลย จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี เกษตรกร 6,991 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 27,073 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 6,125 ไร่ พืชไร่ 11,270 ไร่ พืชสวน และอื่นๆ 9,677 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 22 ราย พื้นที่ 36 ไร่ คิดเป็นเงิน 0.06 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 2 ไร่ คิดเป็นเงิน 3,380 บาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.2 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร และจังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกร 8,125 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 68,800 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 12,604 ไร่ พืชไร่ 56,189 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 7 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,830 ราย พื้นที่ 18,965 ไร่ คิดเป็นเงิน 21.75 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.3 อุทกภัย วาตภัย ช่วงภัยวันที่ 7 ก.พ. – 17 มิ.ย. 64

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย กำแพงเพชร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำปาง น่าน ลำพูน พิจิตร โลก ตาก พะเยา พิจิตร แพร่ เลย ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแก้ว ปทุมธานี ราชบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 4,008 ราย พื้นที่ 13,427 ไร่ คิดเป็นเงิน 18.22 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,823 ราย พื้นที่ 13,067 ไร่ วงเงิน 17.61 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ยังไม่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ค. 64)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. หนอนห่อใบข้าว 3. โรคไหม้ข้าว 4. แมลงสิง 5. หนอนกอข้าว 6. หนอนกัดใบข้าว 7. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (น่าน) จำนวน 2 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กระบี่ และสงขลา) จำนวน 35 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (น่าน พะเยา อุทัยธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ อุดรธานี อุบลราชธานี จันทบุรี ปัตตานี) จำนวน 1,254 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 55 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 81 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กระบี่) จำนวน 10 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 68 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (แพร่ อุทัยธานี และ สกลนคร) จำนวน 612 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและชีวเวเรีย รมรวงศ์ ให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรรดหวานปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรคไหม้ข้าว - ประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไหม้คอรวง และคำแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง - แนะนำให้เกษตรกรดูแลแปลงข้าวหลังหวาน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ และเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้น ในข้าวอายุ 6-7 วัน ให้น้ำเข้าแปลงนาจนระดับน้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน แต่หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไอออน เซฟวิน เป็นต้น
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 9,435 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 34 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ ทำลาย ไปเผาทิ้ง นอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย - ปลอ้ยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม การระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 20,287 ไร่ <u>การระบาดลดลง 65 ไร่</u>	- ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัย มาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรด - ไล่สัตรูพืชจะเข้าทำลายอยู่ภายในช่วงผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สมารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไล่สัตรูพืชเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยให้สลับกลุ่มสารฆ่าไรตามลักษณะกลไกการออกฤทธิ์โดย IRAC
	3. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพฯ อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี ชุมพร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช ปัตตานี ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 7,843 ไร่ <u>การระบาดลดลง 94 ไร่</u>	
	4. ด้วงวง	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ราชบุรีชุมพร พังงา ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,001 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่</u>	
	5. ไรสีขา	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,108 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	
	6. หนอนกินใบมะพร้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นราธิวาส และปัตตานี) จำนวน 944 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	
ปาล์มน้ำมัน	1. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ระยอง ชลบุรี ราชบุรี สงขลา สตูล ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,867 ไร่ <u>การระบาดลดลง 42 ไร่</u>	- รมรังค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มให้สะอาด กำจัดวัชพืช เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย และแนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - ใช้กาดักไฟโรโมนและใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียมกำจัดด้วงแรดและตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรดทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับลิฟฟิ)
	2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช) จำนวน 809 ไร่ <u>การระบาดลดลง 10 ไร่</u>	
ยางพารา	1. โรครากขาว	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต นราธิวาสตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,102 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาด - ให้เกษตรกรขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคกว้าง 30 ซม ลึก 60 ซม. ไถทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันการระบาด - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว และโรคใบร่วง
	2. โรคใบร่วง	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส พังงา พัทลุง ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 96,436 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 3,161 ไร่</u>	
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้น	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลำปาง นครราชสีมา บุรีรัมย์ และยะลา) จำนวน 26 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด - ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และแจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall ammyworm
	2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall ammyworm)	พื้นที่ระบาด 30 จังหวัด (ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ อุทัยธานี อุดรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
		นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 76,720 ไร่ <u>การระบาดลดลง 21,425 ไร่</u>	
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สีชมพู 3. ไรแดงมันสำปะหลัง 4. เพลี้ยหอย 5. แมลงงูหนหลวง 6. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (แพร่ อุทัยธานี ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 771 ไร่ <u>การระบาดลดลง 75 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา ปราจีนบุรี อุบลราชธานี จันทบุรี ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว) จำนวน 2,564 ไร่ <u>การระบาดลดลง 151 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (นครสวรรค์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง ลำพูน อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร เลย ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ลพบุรี จันทบุรี ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 22,383 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1,168 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และชลบุรี) จำนวน 498 ไร่ <u>การระบาดลดลง 40 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 2 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 30 จังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว เพชรบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 199,932 ไร่ <u>การระบาดลดลง 5,313 ไร่</u>	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้างปีกใส และ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และ ดักแด้แมลงงูหนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบ ด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้างปีกใส และ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และ ดักแด้แมลงงูหนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบ ด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนวดยาว 3. จักจั่น	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เลย สระแก้ว ชลบุรี และสงขลา) จำนวน 468 ไร่ <u>การระบาดลดลง 4 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 5 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) จำนวน 828 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง และใช้เชื้อรา บิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูปลูกต่อไปและให้ ชุดต่อทั้งไม่ให้ปนแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อย
สับปะรด	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1 ไร่</u>	- แนะนำให้เกษตรกรสำรวจและทำความสะอาดแปลง อย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชข้างเคียง เพื่อทำลายพืชอาศัย - หากพบการระบาดระยะรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมี ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
เงาะ	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินช่อดอก	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 23 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 3 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หากพบการระบาดให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควร พ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งจะทำให้เพลี้ยไฟ ต้านทานสารฆ่าแมลงได้

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2 เพลี้ยแป้ง 3. โรครากเน่าโคนเน่า 4. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 614 ไร่ <u>การระบาดลดลง 9 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร และยะลา) จำนวน 303 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,613 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,162 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จังหวัดตราด กระบี่ ตรัง ปัตตานี พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 104 ไร่ <u>การระบาดลดลง 2 ไร่</u>	- เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจกเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หนอนเจาะผลทุเรียน เมื่อพบรอยทำลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทำลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไปโดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือกิ่งไม้กั้นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าทำลายหลบอาศัย อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2 เพลี้ยแป้ง 3. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร กระบี่ ยะลา ระนอง และนครศรีธรรมราช) จำนวน 382 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 51 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และยะลา) จำนวน 135 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หากพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ตัดแต่งกิ่งหรือใบที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. โรคราดำ 3. เพลี้ยแป้ง 4. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 643 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 163 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 18 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เลย) จำนวน 37 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ตัดแต่งกิ่งลำไยไม่ให้ต้นหนาจนเกินไป จับตัวเต็มวัยตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย ถ้าพบระบาดปริมาณมากใช้ยาฆ่าแมลง โดยพ่นในช่วงเวลาที่ลำไยกำลังเกิดช่อดอกและติดผล - หากพบต้นลำไยที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดกิ่งลำไยออกไปทิ้งนอกแปลง แล้วเผาทำลายในทันที และพ่นต้นลำไยด้วยสารป้องกันกำจัดโร 2 ครั้ง

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ส.ค. 64)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 1 สิงหาคม 2564 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 35 จังหวัด 179 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 9 จุด ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ นครนายก สุรินทร์ พัทลุง กระบี่ และสงขลา ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย ประจำวันที่ 2 ส.ค. 64

วันนี้ **ไม่มี**รายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อย ดังนี้

ที่	วันที่เริ่มป่วย	ชนิดสัตว์ *กรณี	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ประวัติวัคซีน	ป่วย	ตาย	เสี่ยง	ผลตรวจ
-ไม่มี-											

ตารางแสดงสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี 2564 การกระจายและการเปรียบเทียบ

จังหวัดที่สถานะโรคยังไม่สงบ (จำนวนสถานะควบคุมโรค/เฝ้าระวังโรค)				นครปฐม (4/0) นครราชสีมา(3/9) สระบุรี(2/0) มหาสารคาม(1/0) นครสวรรค์(1/0) ตาก(1/0) เชียงใหม่(0/1) นครศรีธรรมราช(0/1) นครพนม(0/1)	
ช่วงเวลา	พบโรค (ครั้ง)	สัตว์ป่วย (ตัว)	ตาย (ตัว)	จังหวัด (จังหวัด)	สูงสุด 10 จังหวัดแรก (จำนวนครั้ง รายงานการพบโรค/จำนวนสัตว์ป่วยสะสม)
30 วันย้อนหลัง	0	0	0	0	-
ปี 2564	14	233	9	10	นครราชสีมา(3/15) กระบี่(2/45) ลำพูน(2/7) เชียงใหม่(1/76) ตาก(1/59) สระบุรี(1/19) เชียงราย(1/11) ลพบุรี(1/0) พังงา(1/1) นครศรีธรรมราช(1/1)
ปี 2563	218	7,547	212	41	นครราชสีมา(34/455) สงขลา(19/818) นครศรีธรรมราช(17/376) ขอนแก่น(10/79) มหาสารคาม(9/265) สระบุรี(8/938) ลพบุรี(8/136) พิษณุโลก(8/8) ราชบุรี(7/789) ชัยภูมิ(7/156)
รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครั้ง)				Type A(0) Type O(8) Type O และ A(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค (0) ไม่ทราบ Type(4) และรอผล Lab(2)	
ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม *กรร 1				โคนม(4/109) โคเนื้อ(10/124) กระบือ(0/0) แพะนม(0/0) สุกร(0/0) ไม่ทราบ(0/0)	

หมายเหตุ : *กรร1 คือ รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น

7.3 โรคล้มปัสกีน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค. 2564)

1) พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 1 ส.ค. 2564 รวม 62 จังหวัด 783 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 544,075 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 235,565 ตัว สัตว์ตายสะสม 308,510 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคเนื้อ	กรุงเทพฯ (102/5) ชัยนาท(1,735/245) ปทุมธานี(270/3) อุดรธานี(89/11) ลพบุรี(222/13) สระบุรี(58/2) สิงห์บุรี(63/8) อ่างทอง(463/39) ฉะเชิงเทรา(277/4) ชลบุรี(157/7) ปราจีนบุรี(108/4) สมุทรปราการ(4/0) สระแก้ว(6,333/260) จันทบุรี(1/0) ชัยภูมิ(5,250/490) นครราชสีมา (47,179/1,638) บุรีรัมย์(61,719/3,829) ยโสธร(2,671/116) ศรีสะเกษ(31,838/1,316) สุรินทร์(49,364/3,041) อำนาจเจริญ(11,164/1,247) อุบลราชธานี(39,386/3,674) กาฬสินธุ์(20,143/2,156) ขอนแก่น(29,126/2,723) นครพนม(8,355/610) บึงกาฬ(1,992/222) มหาสารคาม (33,427/3,757) มุกดาหาร(25,298/802) ร้อยเอ็ด(55,373/3,887) เลย(3,511/170) สกลนคร(21,514/2,056) หนองคาย(4,247/350) หนองบัวลำภู(3,600/367) อุดรธานี(14,328/1,319) เชียงราย(664/17) เชียงใหม่(75/0) น่าน(874/26) พะเยา(241/0) แพร่(171/10) ลำปาง (2,181/91) ลำพูน(34/2) ตาก(19,604/500) นครสวรรค์(151/5) พิจิตร(247/18) พิษณุโลก(3,317/97) เพชรบูรณ์(826/48) สุโขทัย (2,052/270) อุตรดิตถ์ (231/28) อุทัยธานี(193/18) กำแพงเพชร(69/8) กาญจนบุรี(6,912/546) นครปฐม(330/31) ประจวบคีรีขันธ์ (3,230/243) เพชรบุรี(4,803/485) ราชบุรี(1,754/54) สุพรรณบุรี(5,966/687) สมุทรสาคร(28/1) สมุทรสงคราม(153/0) ชุมพร(337/11) กระบี่(37/0) ยะลา(11/1) สงขลา(97/0)
โคนม	กรุงเทพฯ (3/2) ชัยนาท(33/0) ลพบุรี(38/0) สระบุรี(4/0) สระแก้ว(33/0) จันทบุรี(2/0) ชัยภูมิ(125/10) นครราชสีมา(974/23) บุรีรัมย์ (812/33) ศรีสะเกษ(80/4) สุรินทร์(85/9) กาฬสินธุ์(17/0) ขอนแก่น(659/100) นครพนม(2/0) มหาสารคาม(280/25) เลย(249/7) สกลนคร (647/44) หนองบัวลำภู(39/2) อุดรธานี(361/39) เชียงราย(669/34) เชียงใหม่(29/1) แพร่(1/0) ลำปาง(19/1) ลำพูน(94/5) พิจิตร(69/1) เพชรบูรณ์(14/1) สุโขทัย (226/7) กาญจนบุรี(172/14) นครปฐม(94/0) ประจวบคีรีขันธ์(488/29) เพชรบุรี(205/6) ราชบุรี(633/3) สุพรรณบุรี(36/9)
พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
กระบือ	กรุงเทพฯ (2/0) ชัยนาท(3/0) ลพบุรี(1/0) สระแก้ว(4/4) ชัยภูมิ(13/1) นครราชสีมา(45/4) บุรีรัมย์(315/32) ศรีสะเกษ(49/6) สุรินทร์ (219/16) อุบลราชธานี(214/19) กาฬสินธุ์(68/22) ขอนแก่น(315/90) นครพนม(81/0) บึงกาฬ(13/1) มหาสารคาม(148/33) มุกดาหาร(32/5) ร้อยเอ็ด(964/36) เลย(6/0) สกลนคร(271/32) หนองคาย(38/7) หนองบัวลำภู(31/4) อุดรธานี(43/4) น่าน(2/0) ตาก (6/1) พิษณุโลก(26/1) สุโขทัย (2/0) กาญจนบุรี(1/1) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี(10/0)
กระทิง	ประจวบคีรีขันธ์(4/0)

2) วันนี้พบสัตว์ป่วยเพิ่มขึ้น 749 ตัว ตาย 285 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วย/จำนวนสัตว์ตาย
โคเนื้อ	กรุงเทพฯ(0/3) ชัยนาท(29/4) ปราจีนบุรี(3/0) บุรีรัมย์(47/0) สุรินทร์(69/15) อำนาจเจริญ(155/30) อุบลราชธานี(162/149) กาฬสินธุ์ (0/1) ขอนแก่น(63/19) นครพนม(0/1) มหาสารคาม(21/1) ร้อยเอ็ด(0/11) เลย(20/0) สกลนคร(12/8) เชียงราย(9/1) แพร่(2/0) ลำปาง (34/2) ตาก(35/22) ประจวบคีรีขันธ์(3/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี(36/7)
โคนม	สกลนคร(7/3) ลำพูน(6/1) เพชรบุรี(20/0) ราชบุรี(2/0)
กระบือ	อุบลราชธานี(5/3) ขอนแก่น(2/0) กาญจนบุรี(1/1)

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจรอยโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย

164,875 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 32,390 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 120,746 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 137,117 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 112,643 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 304,324 ราย

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2564) พบการระบาด 27 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 21 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสุกร 10 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย เยอรมัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย พม่า
 - ในหมูป่า 11 ครั้ง ที่ประเทศลาว เวียดนาม รัสเซีย อังกฤษ
- โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง 3 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสัตว์ปีก 1 ครั้ง ที่ประเทศจีน
 - ในหงส์ขาว 1 ครั้ง ที่ประเทศเซอร์เบีย
 - ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศแอลเบเนีย
- โรคไข้หวัดนก 1 ครั้ง ในสัตว์ปีก ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์(1)
- โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 2 ครั้ง แบ่งเป็น
 - โรคปากและเท้าเปื่อย 1 ครั้งในโคเนื้อ ที่ประเทศเกาหลีใต้
 - โรคล้มปัสสาวะ 1 ครั้งในโคเนื้อ ที่ประเทศกัมพูชา