



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 9 กันยายน 2564 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุโซนร้อน "โกนเซิน" ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 09 กันยายน 2564 เวลา 05.00 น.

เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (9 ก.ย. 64) พายุโซนร้อน "โกนเซิน" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน หรือมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 15.8 องศาเหนือ ลองจิจูด 118.8 องศาตะวันออก กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 85 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ยในช่วงวันที่ 12-13 กันยายน 2564 ในขณะนี้พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 8 ก.ย. 64 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 9 ก.ย. 64



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.สตึก	ชลบุรี	89.2	ฝนตกหนัก
2	อ.เมือง	ระนอง	81.0	ฝนตกหนัก
3	อ.เมือง	พิษณุโลก	72.2	ฝนตกหนัก
4	อ.ศรีสำโรง	สุโขทัย	72.0	ฝนตกหนัก
5	อ.เถิน	ลำปาง	64.5	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 64)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 41,383 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 17,453 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (36,229 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48) มากกว่าปี 2563 จำนวน 5,154 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 403.13 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 77.10 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 34,685 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ปริมาณน้ำในอ่างฯ 38,577 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 15,034 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (34,015 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48) มากกว่าปี 2563 จำนวน 4,561 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 314.31 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 49.45 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 32,350 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	9,129	37	2,384	13	75	1,001	484	48	385	43	83	25,825	9,613	37	2,768	15	16,212
ตอน.	12	8,368	3,816	46	2,166	32	218	1,999	1,100	55	949	51	230	10,367	4,916	47	3,115	36	5,451
กลาง	3	1,419	320	23	260	19	22	369	183	50	159	46	25	1,788	503	28	418	25	1,285
ตะวันตก	2	26,605	19,242	72	5,965	45	7	140	93	66	84	64	9	26,745	19,335	72	6,049	45	7,410
ตะวันออก	6	1,515	961	63	862	61	51	964	605	63	553	61	57	2,479	1,566	63	1,414	61	913
ใต้	4	8,194	5,108	62	3,397	52	39	668	341	51	289	47	43	8,863	5,449	61	3,687	52	3,414
รวม	35	70,926	38,577	54	15,034	32	412	5,141	2,806	55	2,419	51	447	76,068	41,383	54	17,453	33	34,685

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,965 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 36 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 2,269 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 12) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 90.47 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 8.02 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 15,906 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
3659	4,734	35	934	10	24.76	16.48	1.00	1.00	8,728
สิริกิตี	3,693	39	843	13	20.64	16.02	4.98	4.93	5,817
ภูมิพล+สิริกิตี	8,428	37	1,778	10	45.40	32.50	5.98	5.93	14,544
แควน้อยฯ	381	41	338	38	24.84	20.38	2.04	1.12	558
ป่าสักชลสิทธิ์	156	16	153	16	20.23	14.26	0.00	0.26	804
รวมทั้งหมด	8,965	36	2,269	12	90.47	67.14	8.02	7.32	15,906

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 9 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (9%) อ่างฯสิริกิตี (12%) อ่างฯแม่กงอุดมธารา (13%) อ่างฯอุบลรัตน์ (8%) อ่างฯลำปาว(28%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (14%) อ่างฯทับเสลา (19%) อ่างฯกระเสียว (30%) และอ่างฯคลองสิียด (22%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำบางปะกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 841 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 932 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +19.61 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.59 ม. เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 751 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 751 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.11 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.42 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +9.60 ม.รทก. (เมื่อวาน +9.60 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 203 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 205 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 161 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 36 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 65 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 138 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 2 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 20 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลา) ปิด และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้(ปตร.พระศรีเสาวภาค) ปิด

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 261 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 266 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 33 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 60 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 140 ลบ.ม./วินาที และคลองอื่นๆ 28 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 632 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 452 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		3 ก.ย.64	4 ก.ย.64	5 ก.ย.64	6 ก.ย.64	7 ก.ย.64	8 ก.ย.64	9 ก.ย.64		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.22	0.21	0.21	0.22	0.20	0.16	0.13	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าบ้านนพบุรี จ.นนทบุรี	0.27	0.32	0.32	0.30	0.30	0.29	0.25	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.27	0.32	0.32	0.30	0.30	0.29	0.25	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 8 ก.ย. 64	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	3.23	-9.57
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	8.18	-7.82
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	5.25	-6.95
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	5.64	-6.36
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	5.51	-6.99
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	6.64	-7.86

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 13 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิชณุโลก ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา สระแก้ว หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1-8 กันยายน 2564)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ตาก(1) ลำปาง(2) สุโขทัย(1) พะเยา(1) เชียงราย(1) เชียงใหม่(3) พิจิตร(3)
กลาง	กาญจนบุรี(2) นครสวรรค์(2) ลพบุรี(1) สระบุรี(1) อ่างทอง(5)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์(1) นครพนม(1) นครราชสีมา(3) บึงกาฬ(1) ศรีสะเกษ(1) อุบลราชธานี(4) อุตรดิตถ์(1)
ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา(2)
ใต้	ราชบุรี(3)
รวม	21 จังหวัด (40 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ที่ 8 กันยายน 2564

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	2	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ลำปาง(แจ้ห่ม วังเหนือ) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง
2. ตาก	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆในพื้นที่เป้าหมายก่อตัวเล็กน้อยและสลายตัวเร็ว
3. พิชณุโลก	3	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พิจิตร (เมือง สากเหล็ก วังทรายพูน ทับคล้อ) จ.เพชรบูรณ์(วังโป่ง)
4. ลพบุรี	4	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ (หนองบัว ไผ่ศาลี ท่าตะโก ตากฟ้า ตาคลี) จ.ลพบุรี(โคกเจริญ วัฒนาคมน ท่าวุ้ง บ้านหมี่ ท่าหลวง ชัยบาดาล) จ.สระบุรี(วังม่วง แก่งคอย มวกเหล็ก) จ.สิงห์บุรี(เมือง พรหมบุรี ท่าช้าง) จ.อ่างทอง(แสวงหา โพธิ์ทอง ไชโย) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จ.ลพบุรี อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี
5. กาญจนบุรี	2	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี (เลาขวัญ บ่อพลอย ห้วยกระเจา เมือง พนมทวน) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเหียน จ.กาญจนบุรี
6. ขอนแก่น	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสภาพอากาศปิด เมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้า มีฝนตกบริเวณสนามบินและพื้นที่โดยรอบเป็นระยะตลอดทั้งวัน
7. อุบลราชธานี	1	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ศรีสะเกษ (โนนคูณ เบญจลักษณ์ กันทรลักษณ์) จ.อุบลราชธานี(วารินช าราบ นาเยี่ย เดชอุดม พุ่งศรีอุดม)

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
8. นครราชสีมา	3	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา(บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม พระทองคำ ขามสะแกแสง คง โนนแดง พิมาย ชุมพวง ห้วยแถลง จักราช เฉลิมพระเกียรติ) จ.ชัยภูมิ(เนินสง่า) จ.บุรีรัมย์(คูเมือง บ้านด่าน ลำปลายมาศ ชำนิ หนองหงส์ หนองกี่ นางรอง เมือง) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจะเข้มาก จ.บุรีรัมย์
9. สุรินทร์	3	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ร้อยเอ็ด (อาจสามารถ สุวรรณภูมิ โพนทราย) จ.สุรินทร์(ท่าตูม รัตนบุรี สนม โนนารายณ์ จอมพระ เขวาสินรินทร์ ศีขรภูมิ ลำดวน ปราสาท เมือง)
10. สระแก้ว	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสภาพอากาศปิด มีฝนตกบริเวณสนามบินและพื้นที่ โดยรอบเป็นระยะ
11. หัวหิน	1	ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
12. สุราษฎร์ธานี	1	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง
13. สงขลา	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศมีเสถียรภาพประกอบกับมีเมฆชั้นกลาง-ชั้นสูงปกคลุมในพื้นที่ เป้าหมายตลอดทั้งวัน ส่งผลให้เมฆในพื้นที่เป้าหมาย สลายตัวเร็ว
รวม	20	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 8 กันยายน 2564)

ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 193 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 94.90 ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 4,014 เที่ยวบิน (5,895:28 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 3,573.20 ตัน พลุสารดูดความชื้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 340 นัด พลุสารดูดความชื้นแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน 340 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์สำหรับการกำจัดปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 940 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตก รวม 64 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาแพร่ ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม ศรีสะเกษ สกลนคร ร้อยเอ็ด เลย สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ระนอง สงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีนาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 230 เครื่อง แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 97 เครื่อง ในพื้นที่ 13 จังหวัด
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 51 เครื่อง ในพื้นที่ 7 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 82 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด

เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 64)

5.1 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก พิจิตร โลก แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี อุดรดิตถ์ เลย จันทบุรี ระยอง และจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกร 4,863 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 22,533 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 9,550 ไร่ พืชไร่ 12,268 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 716 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,013 ราย พื้นที่ 5,565 ไร่ คิดเป็นเงิน 6.42 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 240 ราย พื้นที่ 1,485 ไร่ วงเงิน 1.74 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก เลย สระบุรี สมุทรปราการ และจังหวัดตรัง เกษตรกร 727 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ (บ่อปลา) 371 ไร่ กระชัง 1,200 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 225 ราย พื้นที่ 123 ไร่ วงเงิน 0.90 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 136 ราย พื้นที่ 44 ไร่ วงเงิน 0.18 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจิตร โลก และจังหวัดน่าน เกษตรกร 109 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 3,963 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 223 ตัว สุกร 416 ตัว สัตว์ปีก 3,324 ตัว แผลงหญ้า 10 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

5.2 วาตภัย ช่วงภัยวันที่ 4 ก.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ เชียงใหม่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรัง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 3,831 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 9,635 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ 178 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 9,457 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 120 ราย พื้นที่ 297 ไร่ คิดเป็นเงิน 0.49 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 40 ราย พื้นที่ 125 ไร่ วงเงิน 0.20 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.3 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 11,827 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 122,205 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 37,891 ไร่ พืชไร่ 84,307 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 7 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 3,638 ราย พื้นที่ 39,420 ไร่ คิดเป็นเงิน 45.22 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 27 ราย พื้นที่ 489 ไร่ วงเงิน 0.54 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 64)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงราย น่าน แพร่ อุบลราชธานี) จำนวน 91 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและชีวเวอเรีย รมรวงให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
	2. หนอนทอใบข้าว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา กระบี่ นครศรีธรรมราชและสงขลา) จำนวน 84 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 234 ไร่	- แนะนำให้เกษตรกรงดหว่านปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไปและให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรคไหม้ข้าว
	3. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (น่าน พะเยา แพร่ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช และปัตตานี) จำนวน 265 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1,049 ไร่	- ประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไหม้คอรวง และคำแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง
	4. แมลงสิง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลาและ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 191 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 80 ไร่	- แนะนำให้เกษตรกรดูแลแปลงข้าวหลังหว่าน 7 วัน อย่าน้ำขาดน้ำ และเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้น ในข้าวอายุ 6-7 วัน ให้น้ำน้ำเข้าแปลงนาจนระดับน้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้
	5. หนอนกอข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาฬสินธุ์ และกระบี่) จำนวน 39 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2 ไร่	1-2 วัน แต่หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไอออน เซฟวิน เป็นต้น
	6. หนอนกัดใบข้าว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 154 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	
	7. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (แพร่ อุทัยธานี นครราชสีมา สกลนคร และสงขลา) จำนวน 580 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 8 ไร่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ตัวงแตร 4. ตัวงวง 5. ไรสีขา 6. หนอนกินใบมะพร้าว	พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 9,179 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 51 ไร่ พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 18,526 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 639 ไร่ พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร ปัตตานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 7612 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 180 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี พังงา ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,011 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,104 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นราธิวาส ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 964 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ ทำลาย ไปเผาทิ้ง นอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย - ปลอยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุม การระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับตัวงแตรในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวงแตร - ไรสีขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในหัวผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามรถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยให้สลักกลุ่มสารฆ่าไรตามลักษณะกลไกการออกฤทธิ์โดย IRAC
ปาล์มน้ำมัน	1. ตัวงแตร 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ระยอง ตราด สงขลา สตูล ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,792 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 22 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช) จำนวน 823 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่	- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มให้สะอาด กำจัดวัชพืช เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย และแนะนำให้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - ใช้กาดักไฟโรโมนและใช้ตาข่ายดักจับตัวงแตรในระยะตัวเต็มวัย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียมกำจัดด้แและตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกตัวงแตรทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับลิฟฟิ)
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วง	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร ภูเก็ต นราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,079 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 112,067 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1,148 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาด - ให้เกษตรกรขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกิ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันการระบาด - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว และโรคใบร่วง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สีชมพู 3. ไรแดงมันสำปะหลัง 4. เพลี้ยหอย 5. แมลงงูหนหลวง 6. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (แพร่ อุทัยธานี ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 693 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว และเพชรบุรี) จำนวน 2,570 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด (พะเยา พิจิตร โลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ลพบุรี จันทบุรี ชลบุรี และ ระยอง) จำนวน 17,633 ไร่ การระบาดลดลง 76 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และชลบุรี) จำนวน 349 ไร่ การระบาดลดลง 75 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ลพบุรี ชลบุรี สระแก้ว และเพชรบุรี) จำนวน 88,951 ไร่ การระบาดลดลง 3,872 ไร่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แผลงข้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักแด้แมลงงูหนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แผลงข้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักแด้แมลงงูหนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนวดยาว 3. จักจั่น	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (พิจิตร โลก อุดรดิตถ์ สระแก้ว และชลบุรี) จำนวน 420 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) จำนวน 64,582 ไร่ การระบาดลดลง 608 ไร่	- ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง และใช้เชื้อราชีวเวเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูปลูกต่อไปและให้ชุดต่อที่ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลำปาง นครราชสีมา ยะลา และบุรีรัมย์) จำนวน 26 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 31 จังหวัด ได้แก่ (ตาก น่าน พะเยา พิจิตร โลก เพชรบูรณ์ ลำปาง อุทัยธานี อุดรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 78,961 ไร่ การระบาดลดลง 679 ไร่	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด - ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และแจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm
สับปะรด	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 9 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	- แนะนำให้เกษตรกรสำรวจและทำความสะอาดแปลงอย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชข้างเคียง เพื่อทำลายพืชอาศัย - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งระยะรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรครากเน่าโคนเน่า 4. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 595 ไร่ การระบาดลดลง 135 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร และยะลา) จำนวน 555 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,571 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จังหวัดตราด กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 101 ไร่ การระบาดคงที่	- เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจกเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หนอนเจาะผลทุเรียน เมื่อพบรอยทำลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือสวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทำลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไปโดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือกิ่งไม้กั้นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าทำลายหลบอาศัย อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ
เงาะ	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 23 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการระบาดให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งจะทำให้เพลี้ยไฟต้านทานสารฆ่าแมลงได้
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร กระบี่ ยะลา ระนอง และนครศรีธรรมราช) จำนวน 382 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และชุมพร) จำนวน 44 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ยะลา) จำนวน 131 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการระบาดของโรคใบจุดให้ตัดแต่งกิ่งหรือใบที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. โรคราดำ 3. เพลี้ยแป้ง 4. มวนลำไย 5. เพลี้ยหอย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 677 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 328 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 5,441 ไร่ การระบาดลดลง 12,466 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เลย) จำนวน 37 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ลำพูน) จำนวน 2,400 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งกิ่งลำไยไม่ให้ต้นหนาจนเกินไป จับตัวเต็มวัยตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย ถ้าพบระบาดปริมาณมากใช้ยาฆ่าแมลง โดยพ่นในช่วงเวลาที่ลำไยกำลังเกิดช่อดอกและติดผล - หากพบต้นลำไยที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดกิ่งลำไยออกไปทิ้งนอกแปลง แล้วเผาทำลายในทันที และพ่นต้นลำไยด้วยสารป้องกันกำจัดโร 2 ครั้ง

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 64)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2564 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 35 จังหวัด 179 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 11 จุด ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ชลบุรี สุรินทร์ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ และสงขลา ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย ประจำวันที่ 5 ก.ย. 64

วันนี้ ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อย ดังนี้

ที่	วันที่เริ่มป่วย	ชนิดสัตว์ *กรร1	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ประวัติวัคซีน	ป่วย	ตาย	เลี้ยง	ผลตรวจ
-ไม่มี-											

ตารางแสดงสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี 2564 การกระจายและการเปรียบเทียบ

จังหวัดที่สถานะโรคยังไม่สงบ (จำนวนสถานะควบคุมโรค/เฝ้าระวังโรค)			นครปฐม (4/0) นครราชสีมา(3/9) สระบุรี(2/0) มหาสารคาม(1/0) นครสวรรค์(1/0) เชียงใหม่(0/1) นครศรีธรรมราช(0/1) นครพนม(0/1)		
ช่วงเวลา	พบโรค (ครั้ง)	สัตว์ป่วย (ตัว)	ตาย (ตัว)	จังหวัด (จังหวัด)	สูงสุด 10 จังหวัดแรก (จำนวนครั้ง รายงานการพบโรค/จำนวนสัตว์ป่วยสะสม)
30 วันย้อนหลัง	1	2	0	1	ลำพูน(1/0)
ปี 2564	15	235	9	10	นครราชสีมา(3/15) กระบี่(2/45) ลำพูน(2/7) เชียงใหม่(1/76) ตาก(1/59) สระบุรี(1/19) เชียงราย(1/11) ลพบุรี(1/0) พังงา(1/1) นครศรีธรรมราช(1/1)
ปี 2563	218	7,547	212	41	นครราชสีมา(34/455) สงขลา(19/818) นครศรีธรรมราช(17/376) ขอนแก่น(10/79) มหาสารคาม(9/265) สระบุรี(8/938) ลพบุรี(8/136) พิษณุโลก(8/8) ราชบุรี(7/789) ชัยภูมิ(7/156)
รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครั้ง)			Type A(0) Type O(8) Type O และ A(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค (0) ไม่ทราบ Type(4) และรอผล Lab(3)		
ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม *กรร 1			โคนม(5/111) โคเนื้อ(10/124) กระบือ(0/0) แพะนม(0/0) สุกร(0/0) ไม่ทราบ(0/0)		

หมายเหตุ : *กรร1 คือ รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น

7.3 โรคล้มปัสสิน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย. 64)

1) พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 8 ก.ย.64 รวม 65 จังหวัด 812 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 582,009 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 87,235 ตัว สัตว์ตายสะสม 51,215 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคเนื้อ	กรุงเทพฯ (102/6) นนทบุรี (4/0) ชัยนาท(2,397/488) ปทุมธานี(304/8) อุทัยธานี(161/15) ลพบุรี(1,035/88) สระบุรี(191/10) สิงห์บุรี(78/11) อ่างทอง(545/104) ฉะเชิงเทรา(490/46) ชลบุรี(272/17) ปราจีนบุรี(153/15) สมุทรปราการ(4/0) สระแก้ว(7,427/442) จันทบุรี(15/1) นครนายก (2/0) ชัยภูมิ(6,392/893) นครราชสีมา(49,651/2,664) บุรีรัมย์(61,985/4,561) ยโสธร(2,673/116) ศรีสะเกษ(31,838/1,316) สุรินทร์(51,031/3,727) อำนาจเจริญ(11,628/1,674) อุบลราชธานี(42,192/5,063) กาฬสินธุ์(24,006/2,293) ขอนแก่น(31,434/3,365) นครพนม(8,441/675) บึงกาฬ(2,190/299) มหาสารคาม(35,048/5,594) มุกดาหาร(25,302/838) ร้อยเอ็ด(56,387/5,408) เลย(3,579/197) สกลนคร(22,597/2,329) หนองคาย(4,332/410) หนองบัวลำภู(3,881/398) อุดรธานี(14,532/1,526) เชียงราย(977/38) เชียงใหม่(203/10) น่าน(1,678/76) พะเยา(265/11)แพร่(780/63) ลำปาง(3,102/195) ลำพูน(212/21) ตาก(20,884/974) นครสวรรค์(1,012/123) พิจิตร (465/37) พิษณุโลก(3,716/129) เพชรบูรณ์(1,604/155) สุโขทัย (2,795/697) อุดรดิตถ์ (616/127) อุทัยธานี(283/42) กำแพงเพชร(114/16) กาญจนบุรี(9,548/859) นครปฐม(335/34) ประจวบคีรีขันธ์(4,102/328) เพชรบุรี(5,135/570) ราชบุรี(1,901/68) สุพรรณบุรี(6,389/815) สมุทรสาคร(49/1) สมุทรสงคราม(153/0) ชุมพร(733/58) กระบี่(25/0) สุราษฎร์ธานี(11/1) ยะลา(11/1) สงขลา(131/0)
โคนม	กรุงเทพฯ(3/2) ชัยนาท(36/2) ลพบุรี(132/2) สระบุรี(8/2) ชลบุรี(14/0) สระแก้ว(219/6) จันทบุรี(3/0) ชัยภูมิ(158/15) นครราชสีมา(1,179/82) บุรีรัมย์(902/38) ศรีสะเกษ(80/4) สุรินทร์(84/9) กาฬสินธุ์(17/2) ขอนแก่น(758/153) นครพนม(2/0) มหาสารคาม(283/28) เลย(249/9) สกลนคร(670/47) หนองบัวลำภู(47/3) อุดรธานี(367/45) เชียงราย(726/55) เชียงใหม่(146/30)แพร่(6/0) ลำปาง(92/8) ลำพูน(470/57) พิจิตร(69/1) พิษณุโลก(2/1) เพชรบูรณ์(27/6) สุโขทัย (301/17) กาญจนบุรี(184/19) นครปฐม(94/1) ประจวบคีรีขันธ์(808/50) เพชรบุรี(251/13) ราชบุรี(730/7) สุพรรณบุรี(37/9) ชุมพร(4/2)
กระบือ	กรุงเทพฯ (2/2) ชัยนาท(3/0) ปทุมธานี(1/1) ลพบุรี(2/0) สระแก้ว(18/8) ชัยภูมิ(17/5) นครราชสีมา(60/5) บุรีรัมย์(420/53) ศรีสะเกษ (49/6) สุรินทร์(225/25) อำนาจเจริญ(1/2) อุบลราชธานี(237/27) กาฬสินธุ์(83/31) ขอนแก่น(410/103) นครพนม(82/0) บึงกาฬ (17/4) มหาสารคาม(169/53) มุกดาหาร(32/5) ร้อยเอ็ด(981/46) เลย(10/0) สกลนคร(304/42) หนองคาย(44/9) หนองบัวลำภู(46/4) อุดรธานี(55/8) น่าน(2/0) ตาก(7/2) พิษณุโลก(27/1) สุโขทัย (2/0) กาญจนบุรี(1/1) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี(10/0)
กระทิง	ประจวบคีรีขันธ์(4/0)

2) วันนี้พบสัตว์ป่วยเพิ่มขึ้น 238 ตัว ตาย 135 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วย/จำนวนสัตว์ตาย
โคเนื้อ	ชัยนาท(2/1) ลพบุรี(12/2) สระบุรี(7/1) ชัยภูมิ(38/9) บุรีรัมย์(0/13) อุบลราชธานี(15/18) ขอนแก่น(4/3) นครพนม(4/0) มหาสารคาม (30/59) สกลนคร(13/6) หนองบัวลำภู(1/0) อุดรธานี(3/2) เชียงราย(5/0) น่าน(11/2) พะเยา(1/1) ลำปาง(1/0) ลำพูน(2/1) ตาก(6/1) เพชรบูรณ์(12/4) อุดรดิตถ์(3/4) กาญจนบุรี(5/1) ประจวบคีรีขันธ์(36/3) สุพรรณบุรี(9/4)
โคนม	ลพบุรี(5/0) อุดรธานี(0/3) ลำพูน(3/0)
กระบือ	นครพนม(1/0) สกลนคร(5/0)

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 178,179 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 33,393 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 208,162 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 149,409 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 120,006 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 369,817 ราย

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2564) พบการระบาด 26 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 25 ครั้ง แบ่งเป็น ที่ประเทศเยอรมัน อังการี ลัตเวีย โปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย แอฟริกา เกาหลีใต้
- โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 7 ครั้ง แบ่งเป็น
 - โรคนิวคาสเซิล ไนนก 1 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย
 - โรคปากและเท้าเปื้อน ในโค 2 ครั้ง ที่ประเทศแซมเบีย
 - โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง ในเป็ดน้ำ 1 ครั้ง ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
 - โรควัวบ้า ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศสเปน
 - โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสุนัข 1 ครั้ง ที่ประเทศอังกฤษ
 - โรคไข้กระต่าย ในกระต่าย 1 ครั้ง ที่ประเทศนอร์เวย์