



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 7 กันยายน 2564 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

อนึ่ง พายุโซนร้อน “โกนเซิน” (CONSON) ที่ปกคลุมตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่ 9 กันยายน 2564 และจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ย ในช่วงวันที่ 12-13 กันยายน 2564

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 6 ก.ย. 64 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 7 ก.ย. 64



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	ยโสธร	97.6	ฝนตกหนักมาก
2	อ.เมือง	จันทบุรี	81.5	ฝนตกหนัก
3	อ.เมือง	อุบลราชธานี	69.9	ฝนตกหนัก
4	อ.เมือง	ตาก	62.2	ฝนตกหนัก
5	อ.หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	41.9	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 64)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 40,817 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 16,886 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (36,187 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 48) มากกว่าปี 2563 จำนวน 4,630 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 277.32 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 69.13 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 35,250 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 38,112 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 14,570 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 31) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (33,992 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48) มากกว่าปี 2563 จำนวน 4,120 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 225.95 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 48.60 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 32,814 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	9,007	36	2,263	13	75	1,001	475	47	376	42	83	25,825	9,482	37	2,638	14	16,343
ตอน.	12	8,368	3,720	44	2,069	31	218	1,999	1,054	53	903	49	230	10,367	4,774	46	2,972	35	5,594
กลาง	3	1,419	282	20	222	16	22	369	175	47	151	44	25	1,788	457	26	372	22	1,331
ตะวันตก	2	26,605	19,113	72	5,836	44	7	140	92	66	83	63	9	26,745	19,205	72	5,919	44	7,540
ตะวันออก	6	1,515	899	59	800	57	51	964	572	59	520	57	57	2,479	1,471	59	1,319	57	1,008
ใต้	4	8,194	5,091	62	3,380	52	39	668	337	50	284	46	43	8,863	5,428	61	3,665	52	3,435
รวม	35	70,926	38,112	54	14,570	31	412	5,141	2,705	53	2,316	49	447	76,068	40,817	54	16,886	32	35,250

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,825 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 2,129 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 12) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 56.16 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 7.38 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,046 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
3659	4,696	35	896	9	19.09	13.63	1.00	1.00	8,766
สิริกิติ์	3,668	39	818	12	14.55	17.03	5.00	6.00	5,842
ภูมิพล+สิริกิติ์	8,364	36	1,714	10	33.64	30.66	6.00	7.00	14,608
แควน้อยฯ	339	36	296	33	18.66	14.75	1.12	1.12	600
ป่าสักชลสิทธิ์	122	13	119	12	3.86	16.31	0.26	0.26	838
รวมทั้งหมด	8,825	35	2,129	12	56.16	61.72	7.38	8.38	16,046

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 10 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (9%) อ่างฯสิริกิติ์ (12%) อ่างฯแม่กวงอุดมธารา (13%) อ่างฯอุบลรัตน์ (8%) อ่างฯลำปาว(28%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (12%) อ่างฯทับเสลา (18%) อ่างฯกระเสียว (29%) อ่างฯคลองสิียด (20%) และอ่างฯบางพระ (30%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำบางปะกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 983 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 936 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +20.02 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.18 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 700 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 633 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.50 ม.รทก.

(เมื่อวาน +16.50 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +9.37 ม.รทก. (เมื่อวาน +9.05 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 200 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 200 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 161 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 40 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 54 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 118 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 25 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 15 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลา) ปิด และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้(ปตร.พระศรีเสาวภาค) ปิด

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 267 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 269 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุม (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุม) 33 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 60 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 141 ลบ.ม./วินาที และคลองอื่นๆ 33 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 291 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 194 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		1 ก.ย.64	2 ก.ย.64	3 ก.ย.64	4 ก.ย.64	5 ก.ย.64	6 ก.ย.64	7 ก.ย.64		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	0.20	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.29	0.31	0.27	0.32	0.32	0.30	0.30	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.29	0.31	0.27	0.32	0.32	0.30	0.30	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 6 ก.ย. 64	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	3.22	-9.58
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	7.91	-8.09
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	5.31	-6.89
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	5.74	-6.26
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	5.55	-6.95
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	6.31	-8.19

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 13 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิชณุโลก ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา สระแก้ว หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1-6 กันยายน 2564)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ตาก(1) ลำปาง(2) สุโขทัย(1) พะเยา(1)
กลาง	กาญจนบุรี(1) นครสวรรค์(1) ลพบุรี(1) สระบุรี(1) อ่างทอง(5)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์(1) นครพนม(1) นครราชสีมา(2) บึงกาฬ(1) ศรีสะเกษ(1) อุบลราชธานี(4) อุตรดิตถ์(1)
ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา(2)
ใต้	ราชบุรี(2)
รวม	18 จังหวัด (29 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ที่ 6 กันยายน 2564

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	4	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ลำปาง(แจ้ห่ม) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่
2. ตาก	4	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ลำปาง(เสริมงาม เถิน) จ.ลำพูน(ทุ่งหัวช้าง) จ.เชียงใหม่(ดอยเต่า) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก เขื่อนแม่มอก จ.ลำปาง อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท่าแพ จ.สุโขทัย
3. พิชณุโลก	2	การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์
4. ลพบุรี	4	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์(หนองบัว ไผ่ศาลี ท่าตะโก) จ.ลพบุรี(ชัยบาดาล ท่าหลวง พัฒนานิคม โคกเจริญ ลำสนธิ) จ.สระบุรี(วังม่วง มวกเหล็ก) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จ.ลพบุรี
5. กาญจนบุรี	2	การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
6. ขอนแก่น	2	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาฬสินธุ์ (นามน เมืองกาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมเด็จ ห้วยผึ้ง คำม่วง สามชัย สหัสขันธ์ หนองกุงศรี ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัย ร่องคำ ห้วยเม็ก) จ.อุดรธานี(กุมภวาปี ศรีธาตุ หนองหาน กู่แก้ว ประจักษ์ศิลปาคม ไชยวาน วังสามหมอ) จ.สกลนคร(ส่องดาว วาริชภูมิ สว่างแดนดิน นิคมจำจาน) จ.ร้อยเอ็ด(โพธิ์ชัย โพนทอง)
7. อุบลราชธานี	1	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ศรีสะเกษ(โนนคูณ เบญจลักษณ์ ห้วยทับทัน ปรางค์กู๋ วังหิน ขุขันธ์ กันทรลักษณ์) จ.อุบลราชธานี(เดชอุดม ท่งศรีอุดม) จ.สุรินทร์ (สังขะ ศรีณรงค์ ลำดวน)
8. นครราชสีมา	4	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (บ้านเหลื่อม บัวใหญ่ คง สีดา โนนแดง ขามสะแกแสง โนนสูง ชุมพวง ห้วยแถลง จักราช เฉลิมพระเกียรติ เมืองนครราชสีมา) จ.บุรีรัมย์(กระสัง ห้วยราช บ้านด่าน ลำปลายมาศ คูเมือง หนองหงส์ เมืองบุรีรัมย์) จ.ชัยภูมิ(เนินสง่า)
9. สุรินทร์	6	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ร้อยเอ็ด (เสลภูมิ อาจสามารถ ท่งเขาหลวง เมืองสรวง จตุรพักตรพิมาน สุวรรณภูมิ ศรีสมเด็จ เกษตรวิสัย เมืองร้อยเอ็ด ปทุมรัตน์) จ.มหาสารคาม(นาเชือก กุดรัง วาปีปทุม พยัคฆภูมิพิสัย) จ.ขอนแก่น(บ้านไผ่ เปือยน้อย หนองสองห้อง โนนศิลา) จ.ยโสธร(เมืองยโสธร) จ.บุรีรัมย์(พุทไธสง แคนดง กระสัง พลับพลาชัย ประโคนชัย) จ.สุรินทร์(ท่าตูม รัตนบุรี ชุมพลบุรี สนม ศิขรภูมิ ลำดวน ปราสาท เมืองสุรินทร์)
10. สระแก้ว	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 48 ชม. หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19
11. หัวหิน	1	ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
12. สุราษฎร์ธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจาก ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ระดับปฏิบัติการมีค่าต่ำกว่า 60% ประกอบกับการยกตัวของอากาศระดับบนมีเสถียรภาพ ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
13. สงขลา	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเครื่องบินกองทัพอากาศตรวจพิเศษประจำสัปดาห์
รวม	30	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 6 กันยายน 2564)

ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 191 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 94.90 ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 3,968 เที่ยวบิน (5,824:30 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 3,536.30 ตัน พลุสารพัดความชื้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 330 นัด พลุสารพัดความชื้นแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน 329 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์สำหรับการกำจัดวัชพืช จำนวน 940 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตก รวม 64 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาแพร่ ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม ศรีสะเกษ สกลนคร ร้อยเอ็ด เลย สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ระนอง สงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีนาปรัง พืชไร่ อุบโภคบริโภค และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 230 เครื่อง แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 97 เครื่อง ในพื้นที่ 13 จังหวัด
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 51 เครื่อง ในพื้นที่ 7 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 82 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด

เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 64)

5.1 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี อุดรดิตถ์ เลย จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกร 4,817 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 22,489 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 9,546 ไร่ พืชไร่ 12,228 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 715 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 992 ราย พื้นที่ 5,484 ไร่ คิดเป็นเงิน 6.34 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 220 ราย พื้นที่ 1,366 ไร่ วงเงิน 1.60 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก เลย สระบุรี สมุทรปราการ และจังหวัดตรัง เกษตรกร 727 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ (บ่อปลา) 371 ไร่ กระชัง 1,200 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 225 ราย พื้นที่ 123 ไร่ วงเงิน 0.90 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 136 ราย พื้นที่ 44 ไร่ วงเงิน 0.18 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน เกษตรกร 6 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ (โค-กระบือ) 15 ตัว แปลงหญ้า 10 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

5.2 วาตภัย ช่วงภัยวันที่ 4 ก.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ เชียงใหม่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 3,831 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 9,635 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ 178 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 9,457 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 95 ราย พื้นที่ 255 ไร่ คิดเป็นเงิน 0.41 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 39 ราย พื้นที่ 125 ไร่ วงเงิน 0.19 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.3 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 11,827 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 122,205 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 37,891 ไร่ พืชไร่ 84,307 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 7 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 3,635 ราย พื้นที่ 39,403 ไร่ คิดเป็นเงิน 45.20 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 27 ราย พื้นที่ 489 ไร่ วงเงิน 0.54 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 64)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1.เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงราย น่าน แพร่ อุบลราชธานี) จำนวน 91 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและชีวเวอเรีย รมรวงคให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
	2. หนอนทอใบข้าว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา กระบี่ นครศรีธรรมราชและสงขลา) จำนวน 84 ไร่ การระบาดลดลง 234 ไร่	- แนะนำให้เกษตรกรงดหวานปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไปและให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรคไหม้ข้าว
	3. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (น่าน พะเยา แพร่ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช และปัตตานี) จำนวน 265 ไร่ การระบาดลดลง 1,049 ไร่	- ประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไหม้คอรวง และคำแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง
	4. แมลงสิง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลาและ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 191 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 80 ไร่	- แนะนำให้เกษตรกรดูแลแปลงข้าวหลังหวาน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ และเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวอายุ 6-7 วัน ให้นำน้ำเข้าแปลงนาจนระดับน้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน แต่หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไอออน เซฟวิน เป็นต้น
	5. หนอนกอข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาฬสินธุ์ และกระบี่) จำนวน 39 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	
	6. หนอนกัดใบข้าว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 154 ไร่ การระบาดคงที่	
	7. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (แพร่ อุทัยธานี นครราชสีมา สกลนคร และสงขลา) จำนวน 580 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ตัวแตร 4. ตัวงวง 5. ไรสีขา 6. หนอนกินใบมะพร้าว	พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 9,179 ไร่ <u>การระบาดลดลง 51 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 18,526 ไร่ <u>การระบาดลดลง 639 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร ปัตตานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 7612 ไร่ <u>การระบาดลดลง 180 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี พังงา ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,011 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,104 ไร่ <u>การระบาดลดลง 6 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นราธิวาส ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 964 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ ทำลาย ไปเผาทิ้ง นอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย - ปลอ้ยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุม การระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอ้ยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับตัวแตรในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดตัวแตร - ไรสีขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในข้อผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กหักกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยให้สลับกลุ่มสารฆ่าไรตามลักษณะกลไกการออกฤทธิ์โดย IRAC
ปาล์มน้ำมัน	1. ตัวแตร 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ระยอง ตราด สงขลา สตูล ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,792 ไร่ <u>การระบาดลดลง 22 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช) จำนวน 823 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่</u>	- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มให้สะอาด กำจัดวัชพืช เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย และแนะนำให้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - ใช้กาดักไฟโรโมนและใช้ตาข่ายดักจับตัวแตรในระยะตัวเต็มวัย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียมกำจัดด้งและตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกตัวแตรทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับลิฟฟี่)
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วง	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร ภูเก็ต นราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,079 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 112,067 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1,148 ไร่</u>	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาด - ให้เกษตรกรขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกิ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้างเพื่อป้องกันการระบาด - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว และโรคใบร่วง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สีชมพู 3. ไรแดงมันสำปะหลัง 4. เพลี้ยหอย 5. แมลงงูหนหลวง 6. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (แพร่ อุทัยธานี ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 693 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้วและเพชรบุรี) จำนวน 2,570 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด (พะเยา พิจิตรโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ลพบุรี จันทบุรี ชลบุรี และระยอง) จำนวน 17,633 ไร่ การระบาดลดลง 76 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และชลบุรี) จำนวน 349 ไร่ การระบาดลดลง 75 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ลพบุรี ชลบุรี สระแก้วและเพชรบุรี) จำนวน 88,951 ไร่ การระบาดลดลง 3,872 ไร่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แผลงข้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักแด้แมลงงูหนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แผลงข้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักแด้แมลงงูหนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนวดยาว 3. จักจั่น	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (พิจิตรโลก อุดรดิตถ์ สระแก้ว และชลบุรี) จำนวน 420 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) จำนวน 64,582 ไร่ การระบาดลดลง 608 ไร่	- ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง และใช้เชื้อราชีวเวเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูปลูกต่อไปและให้ชุดต่อที่ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนเจาะลำต้น 2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลำปาง นครราชสีมา ยะลา และบุรีรัมย์) จำนวน 26 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 31 จังหวัด ได้แก่ (ตาก น่าน พะเยา พิจิตรโลก เพชรบูรณ์ ลำปาง อุทัยธานี อุดรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 78,961 ไร่ การระบาดลดลง 679 ไร่	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด - ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และแจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm
สับปะรด	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 9 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	- แนะนำให้เกษตรกรสำรวจและทำความสะอาดแปลงอย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชข้างเคียง เพื่อทำลายพืชอาศัย - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งระยะรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรครากเน่าโคนเน่า 4. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 595 ไร่ การระบาดลดลง 135 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร และยะลา) จำนวน 555 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,571 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จังหวัดตราด กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 101 ไร่ การระบาดคงที่	- เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หนอนเจาะผลทุเรียน เมื่อพบรอยทำลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือสวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทำลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไปโดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือกิ่งไม้กั้นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าทำลายหลบอาศัย อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ
เงาะ	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 23 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการระบาดให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งจะทำให้เพลี้ยไฟต้านทานสารฆ่าแมลงได้
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร กระบี่ ยะลา ระนอง และนครศรีธรรมราช) จำนวน 382 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และชุมพร) จำนวน 44 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ยะลา) จำนวน 131 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ตัดแต่งกิ่งหรือใบที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. โรคราดำ 3. เพลี้ยแป้ง 4. มวนลำไย 5. เพลี้ยหอย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 677 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 328 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 5,441 ไร่ การระบาดลดลง 12,466 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เลย) จำนวน 37 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ลำพูน) จำนวน 2,400 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งกิ่งลำไยไม่ให้ต้นหนาจนเกินไป จับตัวเต็มวัยตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย ถ้าพบระบาดปริมาณมากใช้ยาฆ่าแมลง โดยพ่นในช่วงเวลาที่ลำไยกำลังเกิดช่อดอกและติดผล - หากพบต้นลำไยที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดกิ่งลำไยออกไปทิ้งนอกแปลง แล้วเผาทำลายในทันที และพ่นต้นลำไยด้วยสารป้องกันกำจัดไร 2 ครั้ง

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 64)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 5 กันยายน 2564 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 35 จังหวัด 179 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 11 จุด ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ชลบุรี สุรินทร์ เชียงใหม่ และอุดรธานี ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย ประจำวันที่ 22 ส.ค. 64

วันนี้ ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อย ดังนี้

ที่	วันที่เริ่มป่วย	ชนิดสัตว์ *กรร1	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ประวัติวัคซีน	ป่วย	ตาย	เสี่ยง	ผลตรวจ
-ไม่มี-											

ตารางแสดงสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี 2564 การกระจายและการเปรียบเทียบ

จังหวัดที่สถานะโรคยังไม่สงบ (จำนวนสถานะควบคุมโรค/เฝ้าระวังโรค)			นครปฐม (4/0) นครราชสีมา(3/9) สระบุรี(2/0) มหาสารคาม(1/0) นครสวรรค์(1/0) เชียงใหม่(0/1) นครศรีธรรมราช(0/1) นครพนม(0/1)		
ช่วงเวลา	พบโรค (ครั้ง)	สัตว์ป่วย (ตัว)	ตาย (ตัว)	จังหวัด (จังหวัด)	สูงสุด 10 จังหวัดแรก (จำนวนครั้ง รายงานการพบโรค/จำนวนสัตว์ป่วยสะสม)
30 วันย้อนหลัง	0	0	0	0	-
ปี 2564	14	233	9	10	นครราชสีมา(3/15) กระบี่(2/45) ลำพูน(2/7) เชียงใหม่(1/76) ตาก(1/59) สระบุรี(1/19) เชียงราย(1/11) ลพบุรี(1/0) พังงา(1/1) นครศรีธรรมราช(1/1)
ปี 2563	218	7,547	212	41	นครราชสีมา(34/455) สงขลา(19/818) นครศรีธรรมราช(17/376) ขอนแก่น(10/79) มหาสารคาม(9/265) สระบุรี(8/938) ลพบุรี(8/136) พิษณุโลก(8/8) ราชบุรี(7/789) ชัยภูมิ(7/156)
รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครั้ง)			Type A(0) Type O(8) Type O และ A(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค (0) ไม่ทราบ Type(4) และรอผล Lab(2)		
ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม *กรร 1			โคนม(4/109) โคเนื้อ(10/124) กระบือ(0/0) แพะนม(0/0) สุกร(0/0) ไม่ทราบ(0/0)		

หมายเหตุ : *กรร1 คือ รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น

7.3 โรคล้มปัสสิน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย. 64)

1) พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 5 ก.ย.64 รวม 65 จังหวัด 812 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 581,105 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 94,675 ตัว สัตว์ตายสะสม 50,609 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคเนื้อ	กรุงเทพฯ (102/6) นนทบุรี (4/0) ชัยนาท(2,394/483) ปทุมธานี(304/8) อุทัยธานี(160/15) ลพบุรี(973/76) สระบุรี(182/9) สิงห์บุรี(77/11) อ่างทอง(545/104) ฉะเชิงเทรา(490/46) ชลบุรี(270/16) ปราจีนบุรี(153/15) สมุทรปราการ(4/0) สระแก้ว(7,407/439) จันทบุรี(12/1) นครนายก (2/0) ชัยภูมิ(6,348/879) นครราชสีมา(49,651/2,664) บุรีรัมย์(61,986/4,442) ยโสธร(2,673/116) ศรีสะเกษ(31,838/1,316) สุรินทร์(51,016/3,701) อำนาจเจริญ(11,628/1,667) อุบลราชธานี(42,153/5,019) กาฬสินธุ์(24,006/2,289) ขอนแก่น(31,407/3,339) นครพนม(8,436/674) บึงกาฬ(2,190/296) มหาสารคาม(34,978/5,424) มุกดาหาร(25,302/838) ร้อยเอ็ด(56,387/5,408) เลย(3,579/197) สกลนคร(22,580/2,318) หนองคาย(4,332/409) หนองบัวลำภู(3,880/395) อุดรธานี(14,521/1,515) เชียงราย(966/37) เชียงใหม่(203/10) น่าน(1,638/68) พะเยา(263/8) แพร่(776/62) ลำปาง(3,084/192) ลำพูน(207/18) ตาก(20,854/964) นครสวรรค์(978/117) พิจิตร(458/32) พิษณุโลก(3,680/129) เพชรบูรณ์(1,582/150) สุโขทัย (2,795/697) อุดรดิตถ์ (577/115) อุทัยธานี(283/42) กำแพงเพชร(110/13) กาญจนบุรี (9,382/832) นครปฐม(336/34) ประจวบคีรีขันธ์(4,031/316) เพชรบุรี(5,130/568) ราชบุรี(1,900/168) สุพรรณบุรี(6,372/806) สมุทรสาคร (49/1) สมุทรสงคราม(153/0) ชุมพร(720/53) กระบี่(25/0) สุราษฎร์ธานี(7/1) ยะลา(11/1) สงขลา(131/0)
โคนม	กรุงเทพฯ(3/2) ชัยนาท(36/2) ลพบุรี(132/2) สระบุรี(8/2) ชลบุรี(10/0) สระแก้ว(206/5) จันทบุรี(3/0) ชัยภูมิ(157/14) นครราชสีมา(1,179/82) บุรีรัมย์(902/38) ศรีสะเกษ(80/4) สุรินทร์(84/9) กาฬสินธุ์(17/2) ขอนแก่น(757/152) นครพนม(2/0) มหาสารคาม(283/28) เลย(249/9) สกลนคร(670/47) หนองบัวลำภู(47/3) อุดรธานี(361/39) เชียงราย(726/54) เชียงใหม่(146/30) แพร่(6/0) ลำปาง(92/8) ลำพูน(467/55) พิจิตร (69/1) พิษณุโลก(2/1) เพชรบูรณ์(27/6) สุโขทัย (301/17) กาญจนบุรี(184/19) นครปฐม(94/1) ประจวบคีรีขันธ์(799/48) เพชรบุรี(251/13) ราชบุรี (730/7) สุพรรณบุรี(37/9) ชุมพร(4/2)
กระบือ	กรุงเทพฯ (2/2) ชัยนาท(3/0) ปทุมธานี(1/0) ลพบุรี(2/0) สระแก้ว(18/8) ชัยภูมิ(17/5) นครราชสีมา(60/5) บุรีรัมย์(419/43) ศรีสะเกษ (49/6) สุรินทร์(224/24) อำนาจเจริญ(1/2) อุบลราชธานี(236/27) กาฬสินธุ์(83/31) ขอนแก่น(410/103) นครพนม(81/0) บึงกาฬ (17/4) มหาสารคาม(169/53) มุกดาหาร(32/5) ร้อยเอ็ด(981/46) เลย(10/0) สกลนคร(298/41) หนองคาย(44/9) หนองบัวลำภู(46/4) อุดรธานี(55/7) น่าน(2/0) ตาก(7/2) พิษณุโลก(27/1) สุโขทัย (2/0) กาญจนบุรี(1/1) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี(10/0)
กระทิง	ประจวบคีรีขันธ์(4/0)

2) วันนี้พบสัตว์ป่วยเพิ่มขึ้น 65 ตัว ตาย 73 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วย/จำนวนสัตว์ตาย
โคเนื้อ	อุบลราชธานี(14/15) มหาสารคาม(0/40) สกลนคร(35/10) ตาก(12/7) สุพรรณบุรี(3/0)
โคนม	ลำพูน(1/1)
กระบือ	-

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 177,937 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 33,281 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 208,055 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 149,287 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 119,849 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 366,466 ราย

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2564) พบการระบาด 26 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 25 ครั้ง แบ่งเป็น ที่ประเทศเยอรมัน อังการี ลัตเวีย โปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย แอฟริกา เกาหลีใต้
- โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 7 ครั้ง แบ่งเป็น
 - โรคนิวคาสเซิล ไนนก 1 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย
 - โรคปากและเท้าเปื้อน ในโค 2 ครั้ง ที่ประเทศแซมเบีย
 - โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง ในเป็ดน้ำ 1 ครั้ง ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
 - โรควัวบ้า ในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศสเปน
 - โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสุนัข 1 ครั้ง ที่ประเทศอังกฤษ
 - โรคไข้กระต่าย ในกระต่าย 1 ครั้ง ที่ประเทศนอร์เวย์