



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 19 มกราคม 2564 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ


1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยในภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส เนื่องจากกระแสลมตะวันตกที่พัดความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุม สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 19-20 ม.ค. 64

ในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ฝุ่นละออง/หมอกควันมีการสะสมลดลง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 18 ธ.ค. 64 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 19 ม.ค. 64



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อบต.ฉลอง อ.สีชล	นครศรีธรรมราช	6.5	ฝนตกเล็กน้อย
2	ทต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์	พัทลุง	4.5	ฝนตกเล็กน้อย
3	อบต.ปันแต อ.ควนขนุน	พัทลุง	4.0	ฝนตกเล็กน้อย
4	อบต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต	พัทลุง	3.0	ฝนตกเล็กน้อย
5	อบต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์	สงขลา	3.0	ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคนิคโลจิสติกส์สารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 64)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 45,557 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 21,627 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (45,460 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) มากกว่าปี 2563 จำนวน 97 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 25.03 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 97.22 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 30,527 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 41,833 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 18,290 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (42,850 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) น้อยกว่าปี 2563 จำนวน 1,017 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 19.80 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 83.38 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 29,110 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	รวม				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	11,190	45	4,446	25	75	1,001	549	55	450	50	83	25,825	11,739	45	4,896	26	14,086
ตอน.	12	8,368	5,282	63	3,631	54	218	1,999	1,496	75	1,345	73	230	10,367	6,778	65	4,976	58	3,605
กลาง	3	1,419	895	63	835	61	22	369	252	68	228	66	25	1,788	1,147	64	1,063	62	641
ตะวันตก	2	26,605	17,532	66	4,255	32	7	140	136	97	127	97	9	26,745	17,668	66	4,382	33	9,078
ตะวันออก	6	1,515	931	61	831	59	51	964	725	75	673	74	57	2,479	1,656	67	1,504	65	823
ใต้	4	8,194	6,003	73	4,293	66	39	668	566	85	513	83	43	8,863	6,569	74	4,806	68	2,294
รวม	35	70,926	41,833	59	18,290	39	412	5,141	3,724	72	3,337	70	447	76,068	45,557	60	21,627	42	30,527

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 11,364 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 4,668 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 2.80 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 28.26 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 13,507 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,328	40	1,528	16	0.00	0.00	6.50	6.50	8,134
สิริกิตี	5,056	53	2,206	33	2.69	2.42	17.18	16.94	4,454
ภูมิพล+สิริกิตี	10,384	45	3,734	23	2.69	2.42	23.68	23.44	12,588
แควน้อยฯ	388	41	345	39	0.11	0.00	1.12	1.12	551
ป่าสักชลสิทธิ์	592	62	589	62	0.00	0.00	3.46	3.49	368
รวมทั้งหมด	11,364	46	4,668	26	2.80	2.42	28.26	28.05	13,507

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 4 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (16%) อ่างฯแม่มอก (28%) อ่างฯวชิราลงกรณ (26%) และ อ่างฯคองสียัด (27%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จำนวน 8 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯจุฬารัตน์ (83%) อ่างฯลำตะคอง (105%) อ่างฯลำพระเพลิง (96%) อ่างฯมูลบน (98%) อ่างฯลำแชะ (83%) อ่างฯหนองปลาไหล (89%) อ่างฯปรมาณบุรี (86%) และอ่างฯบางยาง (99%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิธิ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 155 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 150 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +16.90 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 9.30 ม. เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +12.63 ม.รทก. (เมื่อวาน +12.59 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.64 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.64 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 19 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 20 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 19 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) ปิด

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 26 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 26 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 18 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 17 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลย์) 7 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 7 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 42 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 42 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) ปิด แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 20 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 16 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 6 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 25 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		13 ม.ค.64	14 ม.ค.64	15 ม.ค.64	16 ม.ค.64	17 ม.ค.64	18 ม.ค.64	19 ม.ค.64		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกั้นน้ำ จ.นนทบุรี	4.19	4.17	3.71	3.09	3.46	3.27	3.64	สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกั้นชลประทานสามเสน กทม.	6.00	5.86	5.09	4.22	4.78	4.49	4.73	สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 18 ม.ค. 64	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.40	-10.40
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.34	-11.66
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.22	-10.98
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.01	-10.99
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.58	-10.92
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.05	-12.45

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dwr.go.th


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 (วันที่ 1 พ.ย.63 ถึง 30 เม.ย.64) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 19,868 ล้าน ลบ.ม. โดยวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ จำนวน 16,674 ล้าน ลบ.ม. แผนการจัดสรรน้ำในเขตลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 4,000 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 6,602 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ใช้น้ำไปแล้ว 1,843 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 (1 พ.ย.63 - 30 เม.ย.64)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	2,583	7,578	6,124	389	16,674	6,602	40
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	2,200	515	135	4,000	1,843	46



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64

ทั่วประเทศ จำนวน 5.64 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3.12 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 2.52 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 1.04 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 0.48 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 0.56 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64 (ข้อมูล 13 ม.ค. 64)

ทั่วประเทศ จำนวน 5.29 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.40 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 0.89 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.79 ของแผน

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 3.35 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3.07 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก 0.28 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 322.12 ของแผน

พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน รวม 34 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 3.17 ล้านไร่ ได้แก่

- ในเขตชลประทาน 32 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 2.90 ล้านไร่ ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ร้อยเอ็ด สกลนคร อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี

- นอกเขตชลประทาน 11 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.27 ล้านไร่ ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ มหาสารคาม หนองคาย ชัยนาท สระบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2563/64			* สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2563/64					
		ข้าว รอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าว รอบที่ 2	%ข้าว	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวม ทั้งหมด	%รวม
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	1.63	0.55	2.18	3.43	210.43	0.27	49.09	3.70	169.72
	นอกเขตชลประทาน	1.49	1.97	3.46	0.97	65.10	0.62	31.47	1.59	45.95
	รวม	3.12	2.52	5.64	4.40	141.03	0.89	35.32	5.29	93.79
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	-	0.06	0.06	2.37	NA*	0.07	116.67	2.44	4,066.67
	นอกเขตชลประทาน	0.48	0.50	0.98	0.70	145.83	0.21	42.00	0.91	92.86
	รวม	0.48	0.56	1.04	3.07	639.58	0.28	50.00	3.35	322.12

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมชลประทาน

NA* คือ ค่าที่ไม่มีนิยามทางคณิตศาสตร์

6. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 20 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิชณุโลก แพร่ นครสวรรค์ กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี ขอนแก่น อุดรธานี บุรีรัมย์ อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ ระยอง จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสงขลา ปัจจุบันปิดหน่วยปฏิบัติการทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงเฝ้าติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 จำนวน 2 ชุด ณ สนามบินนครสวรรค์เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงที่มีสภาพอากาศเหมาะสมในการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ของประเทศ และช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

7. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 184 เครื่อง แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 32 เครื่อง ในพื้นที่ 6 จังหวัด
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 52 เครื่อง ในพื้นที่ 8 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 100 เครื่อง ในพื้นที่ 15 จังหวัด

เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

8. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 64)

8.1 อุทกภัยภาคใต้ เมื่อวันที่ 25 พ.ย.63 – ปัจจุบัน

จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมส่งผลให้เกิดอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้ ด้านการเกษตรได้รับความเสียหาย ดังนี้

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง ปัตตานี สงขลา นราธิวาส ยะลา และจังหวัดกระบี่ เกษตรกร 257,726 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 769,242 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 128,064 ไร่ พืชไร่ 15,213 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 625,965 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 4,945 ราย พื้นที่ 22,824 ไร่ คิดเป็นเงิน 31.15 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 1,592 ราย พื้นที่ 10,481 ไร่ วงเงิน 12.40 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 12,642 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 27,915 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 9,987 ไร่ บ่อกุ้ง 17,928 ไร่ กระชัง 37,972 ตรม. สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 8,890 ราย พื้นที่เสียหาย 24,630 ไร่ กระชัง 23,992 ตรม. คิดเป็นเงิน 170.89 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 285 ราย พื้นที่ 229 ไร่ กระชัง 111 ตรม. วงเงิน 1.25 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา ปัตตานี ตรัง นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 157,610 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 9,238,941 ตัว แบ่งเป็น โค - กระบือ 315,032 ตัว สุกร 704,603 ตัว แพะ - แกะ 86,947 ตัว สัตว์ปีก 8,132,359 ตัว แผลงหญ้า 18,736 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 461 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 65,956 ตัว คิดเป็นวงเงิน 12.18 ล้านบาท

8.2 อุทกภัย/วาตภัย เมื่อวันที่ 1 ส.ค. - 25 ต.ค.63

จากอิทธิพลพายุซินลากู ฮีโกล์ โนอีล หลินฟา นังกา ร่องมรสุม และพายุดีเปรสชัน ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและวาตภัย ด้านการเกษตรได้รับความเสียหาย ดังนี้

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 46 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ อุดรดิตถ์ น่าน ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี เลย หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองคาย ชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา สิงห์บุรี กรุงเทพมหานคร สระบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ตราด สระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ลพบุรี ตรัง สตูล สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ระนอง และจังหวัดพังงา เกษตรกร 74,100 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 597,311 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 220,512 ไร่ พืชไร่ 359,621 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 16,600 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 686.28 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 22,343 ราย พื้นที่ 135,493 ไร่ วงเงิน 159.32 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 39 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ อุดรดิตถ์ น่าน ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุทัยธานี เลย ชัยภูมิ หนองบัวลำภู หนองคาย สุรินทร์ ศรีสะเกษ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ นครพนม อุดรธานี กาญจนบุรี ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ลพบุรี นครปฐม นครนายก สระบุรี สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง และจังหวัดระนอง เกษตรกร 6,336 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเสียหาย 6,412 ไร่ กระชังปลา 3,324 ตอม. คิดเป็นวงเงิน 30.63 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 5,551 ราย พื้นที่ 4,558 ไร่ กระชังปลา 3,274 ตอม. วงเงิน 21.36 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย เชียงใหม่ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ บึงกาฬ และจังหวัดเลย เกษตรกร 329 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 16,249 ตัว แบ่งเป็น โค 1 ตัว สุกร 21 ตัว สัตว์ปีก 16,227 ตัว แปลงหญ้าเสียหาย 10 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 0.68 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 310 ราย สัตว์รวม 14,986 ตัว แปลงหญ้า 10 ไร่ วงเงิน 0.62 ล้านบาท

8.3 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง เมื่อวันที่ 1 ก.ค. - 5 ต.ค.63

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุดรดิตถ์ และจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกร 33,426 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 477,684 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 425,013 ไร่ พืชไร่ 52,584 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 86 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 533.55 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 11,383 ราย พื้นที่ 119,547 ไร่ วงเงิน 133.41 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

9. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค.64)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. โรคไหม้ข้าว 3. หนอนห่อใบข้าว 4. เพลี้ยไฟ 5. หนอนกอข้าว 6. โรคขอบใบแห้งข้าว 7. โรคใบจุดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลำปาง น่าน หนองบัวลำภู และ นครปฐม) จำนวน 182 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 107 ไร่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (แพร่ น่าน พะเยา อุทัยธานี ตาก ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร มหาสารคาม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร บึงกาฬ และจันทบุรี) จำนวน 3,465 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 98 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร มหาสารคาม อุบลราชธานี สงขลา และ กระบี่) จำนวน 205 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 30 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (อุดรดิตถ์ และ ฉะเชิงเทรา) จำนวน 150 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร นครราชสีมา อุบลราชธานี บึงกาฬ และกระบี่) จำนวน 180 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ เพชรบุรี และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 17 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 41 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (แพร่ ขอนแก่น และบึงกาฬ) จำนวน 85 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและชีวเวอเรีย รมรวงค์ ให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลง อย่างสม่ำเสมอ - ประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไหม้คอรวง และ คำนวณนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ในพื้นที่ที่พบการระบาดของรุนแรงเป็นวงกว้าง - แนะนำให้เกษตรกรดูแลแปลงข้าวหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ ขาดน้ำ และเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้น ในข้าวอายุ 6-7 วัน ให้นำน้ำเข้าแปลงนาจนระดับน้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน แต่หากพบการระบาดของรุนแรงใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไอออน เซฟวิน เป็นต้น - แนะนำให้เกษตรกรรดหวานปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรคไหม้ข้าว

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	8. โรคเมล็ดด่าง 9. แมลงบั่ว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ขอนแก่น สุรินทร์ บึงกาฬ และเพชรบุรี) จำนวน 341 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กำแพงเพชร) จำนวน 1,041 <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1,041 ไร่	
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี ตราด สตูล ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,961 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 77 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี สตูล ชุมพร นครศรีธรรมราช และกระบี่) จำนวน 817 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 20 ไร่	- รมรลงให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มให้สะอาด กำจัดวัชพืช เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย และแนะนำให้ใช้ราไตรโคเดอร์มา - ใช้กาดักฟีโรโมนและใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดในระยะ ดักแด้และตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรดทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับลิฟฟี่)
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วง	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด สงขลา กระบี่ ภูเก็ต นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 530 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (กระบี่ พัทลุง ยะลา ตรัง สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี และ นครราชสีมา) จำนวน 789,159 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1,356 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาด - ให้เกษตรกรชุดคู่อบรมบริเวณต้นที่เป็นโรคกว่า 30 ชม.สีก 60 ชม. ไปทางหัวและท้ายในแนวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่าง แถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันการระบาด - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผิพบนบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว และโรคใบร่วง
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด 4. ดั้วงวง 5. โรสี้ชา	พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (อุดรธานี นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต นครราชสีมา และปัตตานี) จำนวน 9,639 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 175 ไร่ พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (นครราชสีมา อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ยะลา ตรัง นครราชสีมา และภูเก็ต) จำนวน 22,335 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 141 ไร่ พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา สตูล ชุมพร ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี และกระบี่) จำนวน 7,447 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 38 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ราชบุรี ชุมพร พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,267 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุรินทร์ ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และชุมพร) จำนวน 2,557 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 214 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และถ่ายทอด ความรู้และให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ ทำลายไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปลอญแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม การระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอญแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็ม วัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรด - โรสี้ชามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในช่วงลมะพร้าวทำให้ การพ่นสารฆ่าไรไม่สามรถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการ ป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่น จนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็น ระยะที่โรสี้ชามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำ ของกรมวิชาการเกษตร โดยให้สลับกลุ่มสารฆ่าไรตาม ลักษณะกลไกการออกฤทธิ์โดย IRAC ดังนี้ ไพโรพาร์โกด์ 30% ดับลิฟฟี่ อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (สารกลุ่ม 12) อะมิทราซ 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร (สาร กลุ่ม 19) กำมะถันผง 80% ดับลิฟฟี่ อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (สารกลุ่ม UN) ****ห้ามผสมกับสารชนิดอื่น และไพ ริดาเบน 20% ดับลิฟฟี่ อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (สาร กลุ่ม 21)
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) 2. หนอนเจาะลำต้น	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (น่าน เชียงราย อุทัยธานี ตาก พิชณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น หนองบัวลำภู นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี บึงกาฬ นครปฐม สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี เพชรบุรี สตูล สุราษฎร์ธานี ปัตตานี และตรัง) จำนวน 71,095 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 24,870 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมาและบุรีรัมย์) จำนวน 16 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลัง ประสบปัญหาและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด - ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริม การเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และแจ้งเตือนผ่านะวังหนอนกระทู้ fall armyworm

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สีชมพู 3. ไรแดงมันสำปะหลัง 4. เพลี้ยหอย 5. โรคใบด่างมัน สำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (หนองบัวลำภู มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครสวรรค์ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 1,280 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 373 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระบุรี นครสวรรค์ ระยอง ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 2,173 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 739 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ระยอง ชลบุรี และ จันทบุรี) จำนวน 254 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และบุรีรัมย์) จำนวน 106 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (อุทัยธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี และสระแก้ว) จำนวน 281,275 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2,784 ไร่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน <i>Anagrus lopezi</i> แมลงช้างปีกใส และ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และ ดักด้แมลงมูลหอย รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มาความสำคัญปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบ ด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนอนดียว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชลบุรี และสงขลา) จำนวน 73 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 70 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รมรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง และใช้เชื้อรา บิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใส่พร้อม ท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูปลูกต่อไปและให้ ชุดต่อทั้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อย
สับปะรด	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 11 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 11 ไร่	- แนะนำให้เกษตรกรสำรวจและทำความสะอาดแปลงอย่าง สม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชข้างเคียง เพื่อทำลายพืชอาศัย - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งระยะรุนแรง แนะนำให้ใช้ สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร เช่น ไทอะมีโท แซม ๒๕% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๒ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือได โนทีฟูแรน ๑๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๒๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล อัตรา ๒๐ มิลลิกรัม ต่อ น้ำ ๒๐ ลิตร หรืออะเซพทาไมพริด ๒๐% เอสพี อัตรา ๑๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นเป็นวงรัศมีรอบๆ บริเวณที่พบ เพลี้ยแป้ง และต้องหยุดพ่นในช่วงที่สับปะรดติดผลอ่อน เพื่อ ป้องกันไม่ให้มีพืชตกค้าง
เงาะ	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 61 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 34 ไร่	- หากพบการระบาดให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรร พ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งจะทำให้เพลี้ยไฟ ต้านทานสารฆ่าแมลงได้
ทุเรียน	1. เพลี้ยแป้ง 2. เพลี้ยไฟ 3. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และระนอง) จำนวน 146 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ตราด ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 426 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 110 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 4,637 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- <u>เพลี้ยแป้ง</u> ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบ การระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - <u>เพลี้ยไฟ</u> หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - <u>โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน</u> แจกเตือนให้เกษตรกร หมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
มังคุด	1. เพลี้ยแป้ง 2. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 241 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ระนอง ชุมพร กระบี่ และนครศรีธรรมราช) จำนวน 422 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 176 ไร่	- หากพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ตัดแต่งกิ่งหรือใบที่เป็น โรคนำออกไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้ สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และยะลา) จำนวน 177 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 21 ไร่	
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. โรคราดำ 3. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 575 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และจันทบุรี) จำนวน 47 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 7 ไร่ การระบาด 2 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งลำไยไม่ให้ต้นหนาจนเกินไป จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย ถ้าพบระบาดปริมาณมากใช้ยาฆ่าแมลง โดยพ่นในช่วงเวลาที่ลำไยกำลังเกิดช่อดอกและติดผล - หากพบต้นลำไยที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดกิ่งลำไย ออกไปทิ้งนอกแปลง แล้วเผาทำลายในทันที และพ่นต้น ลำไยด้วยสารป้องกันกำจัดโร 2 ครั้ง

10. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

10.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 64)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 16 มกราคม 2564 พบโรค 35 จังหวัด 179 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 21 จุด ในพื้นที่ 10 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ สุรินทร์ ยโสธร น่าน ราชบุรี พัทลุง และสงขลา ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

10.2 โรคปากและเท้าเปื่อย ประจำวันที่ 10 ม.ค. 64

วันนี้ ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อย ดังนี้

ที่	วันที่เริ่มป่วย	ชนิดสัตว์ *กรร1	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ประวัติวัคซีน	ป่วย	ตาย	เสี่ยง	ผลตรวจ

ตารางแสดงสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี 2564 การกระจายและการเปรียบเทียบ

จังหวัดที่สถานะโรคยังไม่สงบ (จำนวนสถานะควบคุมโรค/ฝ่ายวังโรค)			นครราชสีมา(5/12) มหาสารคาม(3/2) นครปฐม (4/0) ลพบุรี(3/3) สระบุรี(2/1) ราชบุรี(2/2) นครศรีธรรมราช(0/2) ลำพูน(0/1) สุโขทัย(1/0) นครสวรรค์(1/0) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) พะเยา(0/2) ร้อยเอ็ด(0/2) เชียงใหม่(0/1) นครพนม(0/1) กาฬสินธุ์(0/1)				
ช่วงเวลา	พบโรค (ครั้ง)	สัตว์ป่วย (ตัว)	ตาย (ตัว)	จังหวัด (จังหวัด)	สูงสุด 10 จังหวัดแรก (จำนวนครั้ง รายงานการพบโรค/จำนวนสัตว์ป่วยสะสม)		
30 วันย้อนหลัง	7	148	4	5	นครราชสีมา(2/4) มหาสารคาม(2/48) ประจวบคีรีขันธ์ (1/63) นครศรีธรรมราช (1//24) ลำพูน(1/9)		
ปี 2564	0	0	0	0			
ปี 2563	219	8,272	211	41	นครราชสีมา(35/456) นครศรีธรรมราช(17/376) สงขลา(19/818) ขอนแก่น(10/79) มหาสารคาม (9/360) สระบุรี(8/1,006) ลพบุรี(8/136) พิษณุโลก(8/8) ราชบุรี(7/789) ชัยภูมิ(7/156)		
รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครั้ง) ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม *กรร 1				Type A(0) Type O(0) Type O และ A(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค (0) ไม่ทราบ Type(0) และรอผล Lab(0) โคเนื้อ(0/0) โคนม(0/0) กระบือ(0/0) แพะนม(0/0) สุกร(0/0) ไม่ทราบ(0/0)			

หมายเหตุ : *กรร1 คือ รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น

10.3 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

10.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 1 - 8 ม.ค. 64) พบการระบาด 17 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 6 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในหมู่ปา 3 ครั้ง ที่ประเทศเยอรมัน และ ลัตเวีย
 - ในหมู่ปาและสุกร 2 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน
- โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง 8 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในนก 4 ครั้ง ที่ประเทศเยอรมัน เซเนกัล และสวีเดน
 - ในเป็ด 1 ครั้ง ที่ประเทศโลวาเกีย
 - ในหงส์ 1 ครั้ง ที่ประเทศสโลวีเนีย
 - ในหงส์และนก 1 ครั้ง ที่ประเทศลิทัวเนีย
- โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 3 ครั้ง แบ่งเป็น
 - โรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 1 ครั้ง ที่ประเทศอิสราเอลในโคและแพะ
 - โรควัวบ้า จำนวน 1 ครั้ง ที่ประเทศสเปนในโค
 - โรคฝีดาษ จำนวน 1 ครั้ง ที่ประเทศภูฏานในแพะ แพะ และโค