



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ตอนล่าง" ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ในช่วงวันที่ 15 - 18 ธ.ค. 64 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้เกาะบอร์เนียว มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร สำหรับทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 15-18 ธ.ค. 2564

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 13 ธ.ค. 64 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 14 ธ.ค. 64



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	สุราษฎร์ธานี	39.0	ฝนตกหนัก
2	อ.หาดใหญ่	สงขลา	8.2	ฝนตกเล็กน้อย
3	อ.เมือง	สงขลา	8.0	ฝนตกเล็กน้อย
4	อ.เมือง	ยะลา	6.3	ฝนตกเล็กน้อย
5	อ.เมือง	พัทลุง	4.3	ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 64)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 58,755 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 34,823 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (47,886 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 63) มากกว่าปี 2563 จำนวน 10,869 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 44.40 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 89.18 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,353 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 54,178 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 30,635 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (43,770 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62) มากกว่าปี 2563 จำนวน 10,408 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 30.26 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 74.03 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,787 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	14,235	57	7,490	41	75	1,001	826	83	726	81	83	25,825	15,061	58	8,216	43	10,765
ตอน.	12	8,368	6,931	83	5,281	79	218	2,002	1,743	87	1,592	86	230	10,370	8,674	84	6,872	80	1,723
กลาง	3	1,419	1,398	100	1,338	98	22	369	361	98	337	98	25	1,788	1,759	98	1,675	98	31
ตะวันตก	2	26,605	23,953	90	10,676	80	7	140	146	104	137	104	9	26,745	24,099	90	10,813	80	2,647
ตะวันออก	6	1,515	1,298	86	1,198	85	51	964	938	97	886	97	57	2,479	2,236	90	2,084	90	252
ใต้	4	8,194	6,363	78	4,653	72	39	668	563	84	510	83	43	8,863	6,926	78	5,162	73	1,937
รวม	35	70,926	54,178	76	30,635	65	412	5,144	4,577	89	4,188	88	447	76,071	58,755	77	34,823	67	17,353

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 14,617 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 7,921 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 7.96 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 31.61 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 10,254 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	8,319	62	4,518	47	4.34	0.50	18.00	18.00	5,144
สิริกิติ์	4,456	47	1,606	24	2.83	2.80	7.52	7.49	5,054
ภูมิพล+สิริกิติ์	12,774	56	6,124	38	7.17	3.30	25.52	25.49	10,198
แควน้อยฯ	906	96	863	96	0.79	0.79	3.02	3.02	33
ป่าสักชลสิทธิ์	937	98	934	98	0.00	0.83	3.06	3.04	23
รวมทั้งหมด	14,617	59	7,921	44	7.96	4.92	31.61	31.55	10,254

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯสิริกิติ์ (24%) และอ่างฯแม่กวงอุดมธารา (28%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 24 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯก๊วกลม(95%) อ่างฯก๊วกคหมา(84%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (96%) อ่างฯแม่มอก(100%) อ่างฯจุฬารามณ์(98%) อ่างฯอุบลรัตน์(93%) อ่างฯลำตะคอง(107%) อ่างฯลำพระเพลิง(99%) อ่างฯมูลบน(99%) อ่างฯลำแชะ(101%) อ่างฯลำน้ำรอง(97%) อ่างฯสิรินธร(89%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์(98%) อ่างฯทับเสลา(101%) อ่างฯกระเสียว(100%) อ่างฯศรีนครินทร์(92%) อ่างฯวชิราลงกรณ(86%) อ่างฯขุนด่านปราการชล(95%) อ่างฯบางพระ(95%) อ่างฯหนองปลาไหล (106%) อ่างฯประแสร์(97%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา(93%) อ่างฯแก่งกระจาน(90%) อ่างฯปรางมูรี(92%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำพระสทิ้ง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำมูล แม่น้ำโก-ลก แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 261 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 255 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.43 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.77 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 75 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 75 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.29 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.36 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.44 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.44 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 72 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 72 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 61 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 7 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 4 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก ปิด (เมื่อวาน ปิด) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 51 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 50 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลย์) 10 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 20 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 81 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 81 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุม (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุม) 6 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 30 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 31 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 14 ลบ.ม./วินาที

อบางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 126 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 98 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		8 ธ.ค.64	9 ธ.ค.64	10 ธ.ค.64	11 ธ.ค.64	12 ธ.ค.64	13 ธ.ค.64	14 ธ.ค.64		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนายนทุรี จ.นนทบุรี	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.22	0.22	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนากมชลประทานสามเสน กทม.	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.22	0.22	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 14 ธ.ค. 64	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.37	-10.43
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.73	-11.27
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.57	-10.63
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.27	-10.73
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.79	-10.71
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.38	-12.12

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จำนวน 2 ชุด ณ สนามบินนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างกักเก็บน้ำ รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

4.1 การให้ความช่วยเหลือในพื้นที่น้ำป็นาปรัง พิษไร้อุปโภคบริโภค (วันที่ 14 ธ.ค.64)

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2564 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำป็นาปรัง พิษไร้อุปโภคบริโภค และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 275 เครื่อง แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพิษไร้อุปโภคบริโภค จำนวน 109 เครื่อง ในพื้นที่ 18 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 86 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด
- อุทกภัย จำนวน 80 เครื่อง ในพื้นที่ 3 จังหวัด

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

4.2 การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย (ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. – ปัจจุบัน)

เนื่องจากอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” และ “เตี้ยนหมู่” และพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.64 - ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง จำนวน 61 จังหวัด 350 อำเภอ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ดังนี้

ช่วงภัย 26 ส.ค. – 2 พ.ย. 64

- กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 424 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 430 เครื่อง เครื่องจักรอื่นๆ 77 เครื่อง
- กรมปศุสัตว์ ได้อพยพสัตว์ 1,912,260 ตัว (เคลื่อนย้ายสัตว์กลับสู่คอกทั้งหมดแล้ว) สนับสนุนหญ้าพระราชทาน 1,123.4 ตัน หญ้าหมัก 19.8 ตัน สนับสนุนอาหาร TMR 112.9 ตัน ตัน สนับสนุนแร่ธาตุ 901 ก้อน ถุงยังชีพสัตว์ 1,988 ถุง สร้างเสริมสุขภาพสัตว์ 82,115 ตัว และรักษาสัตว์ 1,324 ตัว
- กรมประมง ได้สนับสนุนเรือตรวจการ 39 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ 170 ราย พร้อมมอบพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 1.6 ล้านตัว
- กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ สารเร่ง พด.6 เพื่อบำบัดน้ำเน่าเสีย 307,374 ลิตร
- กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนเชื้อเรือไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 89,287 กิโลกรัม ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 22,117 ราย นำไปใช้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 86,145 ไร่

ช่วงภัย 6 พ.ย.64 – ปัจจุบัน

- กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 207 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 184 เครื่อง เครื่องจักรอื่นๆ 28 เครื่อง
- กรมปศุสัตว์ ได้อพยพสัตว์ 20,688 ตัว สนับสนุนหญ้าพระราชทาน 437.3 ตัน หญ้าหมัก 2.2 ตัน อาหาร TMR 25.2 ตัน ถุงยังชีพสัตว์ 447 ชุด สร้างเสริมสุขภาพสัตว์ 165 ตัว
- กรมประมง ได้สนับสนุนเรือตรวจการ 2 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ 15 ราย

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 64)

5.1 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 3 พ.ย. - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล พัทลุง สงขลา ตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 60,023 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 76,533 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10,417 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 8,655 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 57,460 ไร่ สำรวจความเสียหายแล้ว เกษตรกร 768 ราย พื้นที่เสียหาย 3,081 ไร่ คิดเป็นเงิน 6.48 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ระนอง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 2,099 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4,340 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 1,460 ไร่ บ่อกุ้ง 2,880 ไร่ กระชัง 3,763 ตรม. อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง เกษตรกร 26,010 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 1,773,552 ตัว แบ่งเป็น โค 68,773 ตัว กระบือ 1,002 ตัว สุกร 76,170 ตัว แพะ/แกะ 7,834 ตัว สัตว์ปีก 1,619,773 ตัว แผลงหญ้า 7,989 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

5.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 1 ก.ย.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช พบความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุดรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สระแก้ว สุพรรณบุรี เพชรบุรี ระนอง และจังหวัดยะลา เกษตรกร 324,551 ราย พื้นที่ 3,326,107 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,290,654 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,014,972 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 20,481 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,162.03 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 3,857 ราย พื้นที่ 17,997 ไร่ คิดเป็นเงิน 30.20 ล้านบาท**

ด้านประมง พบความเสียหาย 45 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยา แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ตราด นครปฐม สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว อ่างทอง นครนายก และจังหวัดระนอง เกษตรกร 33,970 ราย พื้นที่ 54,897 ไร่ กระชัง 25,245 ตรม. คิดเป็นเงิน 355.70 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 2,885 ราย พื้นที่ 2,334 ไร่ กระชัง 1,370 ตรม. คิดเป็นเงิน 13.92 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ชัยภูมิ ชัยนาท ลพบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร 1,593 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 95,825 ตัว แผลงหญ้า 277 ไร่ คิดเป็นเงิน 10.95 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 413 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 25,162 ตัว คิดเป็นเงิน 5.65 ล้านบาท**

5.3 วาดภัย ช่วงภัยวันที่ 8 – 30 ก.ย.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย กาญจนบุรี จันทบุรี เพชรบุรี หนองบัวลำภู และจังหวัดพังงา เกษตรกร 518 ราย พื้นที่ 838 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 42.75 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 425 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ 370 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.40 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 382 ราย พื้นที่ 572 ไร่ คิดเป็นเงิน 1.34 ล้านบาท**

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.4 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค. – 24 ส.ค.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี อุดรดิตถ์ เลย จันทบุรี ระยอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร 1,482 ราย พื้นที่ 7,968 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,564 ไร่ พืชไร่ 5,236 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 168 ไร่ คิดเป็นเงิน 9.15 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านประมง พบความเสียหาย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก พิษณุโลก เลย สระบุรี สมุทรปราการ และจังหวัดตรัง เกษตรกร 851 ราย พื้นที่ บ่อปลา 1,806 ไร่ วงเงิน 7.63 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 531 ราย พื้นที่ 322 ไร่ วงเงิน 1.36 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา เกษตรกร 29 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 744 ตัว คิดเป็นเงิน 18,600 บาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

5.5 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค.64 – 31 ส.ค.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุดรดิตถ์ นครราชสีมา สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 10,416 ราย พื้นที่ 165,374 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 112,955 ไร่ พืชไร่ 52,419 ไร่ คิดเป็นเงิน 180.44 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 3,535 ราย พื้นที่ 40,176 ไร่ คิดเป็นเงิน 40.59 ล้านบาท**

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธ.ค. 64)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1.เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. หนอนหาใบข้าว 3. โรคไหม้ข้าว 4. โรคขอบใบแห้ง 5. แมลงบั่ว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตาก) จำนวน 180 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 80 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (พิจิตร) จำนวน 94 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 94 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา และเพชรบุรี) จำนวน 32 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 31 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา และสงขลา) จำนวน 38 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 28 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครสวรรค์) จำนวน 5 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและชีวเวรเรียณรงค์ให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ และสารเคมีอย่างถูกต้อง - แนะนำวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดโรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะนำให้เกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิต และลดปริมาณแหล่งที่อยู่อาศัยของโรค แมลงศัตรูพืชในนาข้าว
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด 4. ดั้วงวง 5. โรสซีชา 6. หนอนกินใบมะพร้าว	พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราดสมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ภูเก็ต สตูล สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,720 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 220 ไร่ พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 11,913 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 155 ไร่ พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,428 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 274 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,226 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร กระบี่ และสงขลา) จำนวน 1,021 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 100 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 55 ไร่	- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่ - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กำดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาโรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - โรสซีชามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ในช่วงผลมะพร้าว ทำให้การพนสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพนสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสซีชามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง สงขลา และสตูล) จำนวน 936 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 288 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร และสตูล) จำนวน 276 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 107 ไร่	- ใช้กำดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาโรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรครากขาว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ภูเก็ต และสงขลา) จำนวน 84 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 19 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาวโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพาราที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราแก่เกษตรกรรับรู้อย่างต่อเนื่อง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. โรคใบร่วงยางพารา ชนิดใหม่ 3. โรคใบร่วงยางพารา	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (กระบี่ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 400,607 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 25,519 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (น่าน กระบี่ ปัตตานี สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 7,472 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 5,637 ไร่</u>	- คำนแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคุ้ยลุ่มบริเวณต้นที่เป็นโรครากขาวกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกทุกปี - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพารา
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตาก นครสวรรค์ น่าน สกลนคร ชัยนาท จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 171 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และลพบุรี) จำนวน 13,884 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แผลงข้างปีกใส่ และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้แมลงวันหวาง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุมโดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกกลในพื้นดิน และให้หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - โรคโคนเน่าหัวเน่า แนะนำเกษตรกรเก็บเศษเหง้า หรือเศษซากมันสำปะหลังเผาทำลายทิ้ง ทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตร ควรมีการไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เชื้อท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเมทาแลกซิล
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) 2. หนอนเจาะลำต้น	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล) จำนวน 374 ไร่ <u>การระบาดลดลง 8 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (พิจิตร) จำนวน 90 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่</u>	- ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด - รมรณรงค์ให้มีการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ หากพบการระบาดระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีควบคุมการระบาดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว 2. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตราด) จำนวน 55 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 55 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 11 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รมรณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มา และชุบท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรค - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจและทำความสะอาดแปลงอย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชข้างเคียง เพื่อทำลายพืชอาศัย และหากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งระยะรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร เช่น ไทอะมีโทแรม ๒๕% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๒ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน ๑๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๒๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรืออะเซฟาทาไมพริด ๒๐% เอสพี อัตรา ๑๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นเป็นวงรัศมีรอบๆ บริเวณที่พบเพลี้ยแป้ง และต้องหยุดพ่นในช่วงที่สับปะรดติดผลอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้มีพิษตกค้าง
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. เพลี้ยไก่แจ้	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และตราด) จำนวน 108 ไร่ <u>การระบาดลดลง 2 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 8 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 374 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 362 ไร่</u>	- เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง เฉพาะต้น

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 3,492 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3,153 ไร่	- โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แฉกเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 97 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง
ลำไย	1. โรคพุ่มไม่กาวัด 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรคราดำ 4. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 277 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 42 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 14 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 328 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 19 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 188 ไร่	- แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบไปเผาทำลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ บีโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9 % อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - โรคพุ่มไม่กาวัด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ ถอนวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ - โรคราดำ พ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อ กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรค และทำลายแหล่งอาศัยของแมลงปากดูดที่มาขับถ่ายน้ำหวาน เนื่องจากเชื้อราเจริญบนสารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้ จึงควรพ่นสารกำจัดแมลง ได้แก่ คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่องถูรอบโคนต้น ป้องกันเพลี้ยแป้ง และมดได้ขึ้นมาบนต้น - มวนลำไย ตัดแต่งกิ่ง ไม่ให้ทรงพุ่มหนาทึบ เพื่อทำลายที่หลบซ่อนและที่พักอาศัยของตัวเต็มวัย หากพบการระบาดจับตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และไข่มาทำลาย ใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียน หรือใช้สารฆ่าแมลง ได้แก่ คาร์บาริล ๘๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 45 - 6๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ แลมปีดา-ไซฮาโลทริน 2.5%อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นก่อนลำไยออกดอก

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 64)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 5 ธันวาคม 2564 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 30 จังหวัด 141 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 8 จุด ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และกำแพงเพชร ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคล้มปัสกีน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 64)

พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 13 ธ.ค. 64 รวม 68 จังหวัด 861 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 596,663 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 24,856 ตัว สัตว์ตายสะสม 59,622 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคนม	กรุงเทพฯ(3/2) ชัยนาท(36/2) ลพบุรี(239/16) สระบุรี(78/3) ชลบุรี(14/0) สระแก้ว(2,218/130) จันทบุรี(11/7) ชัยภูมิ(171/32) นครราชสีมา(1,179/82) บุรีรัมย์(902/49) ศรีสะเกษ(80/4) สุรินทร์(84/9) กาฬสินธุ์(17/2) ขอนแก่น(776/178) นครพนม(2/0) มหาสารคาม(293/38) เลย(249/9) สกลนคร(682/50) หนองบัวลำภู(47/3) อุตรดิตถ์(374/51) เชียงราย(729/58) เชียงใหม่(180/45)แพร่(6/0) ลำปาง(107/16) ลำพูน(515/73) พิจิตร(102/1) พิษณุโลก(2/1) เพชรบูรณ์(31/8) สุโขทัย (301/17) กาญจนบุรี(184/20) นครปฐม(95/1) ประจวบคีรีขันธ์(1,015/72) เพชรบุรี(268/35) ราชบุรี(967/48) สุพรรณบุรี(37/10) ชุมพร(11/4)
โคเนื้อ	กรุงเทพฯ (102/6) นนทบุรี (4/0) ชัยนาท(2,445/509) ปทุมธานี(304/9) อุดรธานี(180/23) ลพบุรี(1,313/170) สระบุรี(419/44) สิงห์บุรี(121/18) อ่างทอง(545/104) ฉะเชิงเทรา(503/51) ชลบุรี(275/18) ปราจีนบุรี(175/24) สมุทรปราการ(4/0) สระแก้ว(7,848/588) จันทบุรี(28/9) ตราด(75/4) นครนายก (2/0) ชัยภูมิ(6,657/1,036) นครราชสีมา(49,651/2,664) บุรีรัมย์(62,264/5,273) ยโสธร(2,673/116) ศรีสะเกษ(31,838/1,316) สุรินทร์(52,006/5,125) อำนาจเจริญ(11,631/1,830) อุบลราชธานี(42,718/5,689) กาฬสินธุ์ (24,153/2,445) ขอนแก่น(31,938/3,906) นครพนม(8,481/705) บึงกาฬ(2,231/326) มหาสารคาม(35,092/6,459) มุกดาหาร(25,305/859) ร้อยเอ็ด(57,035/5,958) เลย(3,595/207) สกลนคร(22,557/2,432) หนองคาย(4,332/410) หนองบัวลำภู(3,903/422) อุตรดิตถ์(14,589/1,578) เชียงราย(1,005/48) เชียงใหม่(349/25) น่าน(1,834/97) พะเยา(279/16)แพร่(827/87) ลำปาง(3,203/229) ลำพูน(238/35) ตาก(21,446/1,183) นครสวรรค์(1,612/227) พิจิตร(496/46) พิษณุโลก(3,864/147) เพชรบูรณ์(1,734/202) สุโขทัย(2,905/711) อุตรดิตถ์(678/156) อุทัยธานี(283/42) กำแพงเพชร(133/19) กาญจนบุรี(10,147/978) นครปฐม(336/34) ประจวบคีรีขันธ์(4,511/420) เพชรบุรี(5,487/774) ราชบุรี(1,944/85) สุพรรณบุรี(6,504/858) สมุทรสาคร(49/1) สมุทรสงคราม(153/0) ชุมพร(886/110) กระบี่(62/1) สุราษฎร์ธานี(206/12) พัทลุง(92/1) นครศรีธรรมราช(77/1) ยะลา(11/1) สงขลา(176/0)
กระบือ	กรุงเทพฯ (2/2) ชัยนาท(3/0) ปทุมธานี(1/0) ลพบุรี(2/0) สระแก้ว(18/9) ชัยภูมิ(21/6) นครราชสีมา(60/5) บุรีรัมย์(433/76) ศรีสะเกษ(49/6) สุรินทร์(264/57) อำนาจเจริญ(1/4) อุบลราชธานี(248/34) กาฬสินธุ์(88/39) ขอนแก่น(422/107) นครพนม(83/0) บึงกาฬ(17/4) มหาสารคาม(203/93) มุกดาหาร(32/5) ร้อยเอ็ด(981/52) เลย(10/3) สกลนคร(318/48) หนองคาย(44/10) หนองบัวลำภู(46/4) อุตรดิตถ์(61/9) น่าน(2/0) ตาก(11/3) พิษณุโลก(28/1) เพชรบูรณ์(4/0) สุโขทัย (2/0) กาญจนบุรี(1/1) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี(10/0) สุราษฎร์ธานี(1/0)
กระทิง	ประจวบคีรีขันธ์(1/0)

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรคหรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 196,894 ราย 2) หยอดหรือร่ายยาป้องกันแมลง 37,151 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 224,860 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 170,033 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 128,359 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 416,441 ราย

7.3 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564) พบการระบาด 34 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 12 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสุกร 3 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน รัสเซีย จีน
 - ในหมูป่า 5 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย อังกฤษ
 - ในสุกร/หมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
- โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง 16 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสัตว์ปีก 10 ครั้ง ที่ประเทศอิสราเอล เยอรมนี จีน
 - ในนก 4 ครั้ง ที่ประเทศอาเซอร์ไบจาน อิหร่าน ฝรั่งเศส บัลแกเรีย
 - ในหงส์ขาว 1 ครั้ง ที่ประเทศสโลวาเกีย
 - ในห่าน 1 ครั้ง ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก
- โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 6 ครั้ง แบ่งเป็น
 - โรค SARS-COV-2 2 ครั้ง ในเพียงพอน ที่ประเทศโปแลนด์ และในกวาง ที่ประเทศแคนาดา
 - โรค Lumpy skin disease 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศรัสเซีย
 - โรค ข้อและสมองอักเสบ 1 ครั้ง ในแพะ ที่ประเทศโคลอมเบีย
 - โรค Infection bovine rhinotracheitis 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศคาซัคสถาน
 - โรค Infection salmon anaemia 1 ครั้ง ในปลาแซลมอน ที่ประเทศไอซ์แลนด์