



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 26 ธันวาคม 2564 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ


1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส และยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส

ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนควรระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ (27 ธ.ค.64) ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง กับมีลมแรงในช่วงวันที่ 27-29 ธ.ค.64 โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงในระยะต่อไป

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 25 ธ.ค. 64 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 26 ธ.ค. 64



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.โชคชัย	นครราชสีมา	68.4	ฝนตกหนัก
2	อ.เกาะสุ้ม	สุราษฎร์ธานี	54.2	ฝนตกหนัก
3	อ.เมือง	นครราชสีมา	38.1	ฝนตกหนัก
4	อ.เมือง	นครนายก	20.8	ฝนตกปานกลาง
5	อ.เมือง	ประจวบคีรีขันธ์	16.6	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค. 64)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 58,044 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 34,113 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (47,398 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62) มากกว่าปี 2563 จำนวน 10,646 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 38.93 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 100.58 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 18,049 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 53,582 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 30,039 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (43,395 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61) มากกว่าปี 2563 จำนวน 10,187 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 30.63 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 81.49 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,367 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	13,939	56	7,195	40	75	1,001	816	82	717	80	83	25,825	14,755	57	7,911	42	11,070
ตอน.	12	8,368	6,728	80	5,077	76	218	2,002	1,694	85	1,543	83	230	10,370	8,422	81	6,620	77	1,967
กลาง	3	1,419	1,335	94	1,275	94	22	369	342	93	318	92	25	1,788	1,677	94	1,593	93	112
ตะวันตก	2	26,605	23,879	90	10,602	80	7	140	143	102	134	102	9	26,745	24,022	90	10,737	80	2,723
ตะวันออก	6	1,515	1,231	81	1,131	80	51	964	902	94	850	93	57	2,479	2,133	86	1,981	85	349
ใต้	4	8,194	6,469	79	4,759	73	39	668	565	85	513	83	43	8,863	7,034	79	5,272	74	1,828
รวม	35	70,926	53,582	76	30,039	63	412	5,144	4,462	87	4,074	86	447	76,071	58,044	76	34,113	65	18,049

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 14,281 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 7,585 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 5.50 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 34.02 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 10,590 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	8,113	60	4,313	45	0.00	0.64	20.00	18.00	5,349
สิริกิตี	4,404	46	1,554	23	2.86	2.80	7.51	7.46	5,106
ภูมิพล+สิริกิตี	12,517	54	5,867	36	2.86	3.44	27.51	25.46	10,455
แควน้อยฯ	876	93	833	93	0.35	0.48	3.02	3.02	63
ป่าสักชลสิทธิ์	888	93	885	93	2.29	0.53	3.49	3.48	72
รวมทั้งหมด	14,281	57	7,585	42	5.50	4.45	34.02	31.96	10,590

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯสิริกิตี (23%) และอ่างฯแม่กวอดมธรา (29%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 24 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯก๊วลม(95%) อ่างฯก๊วคหมา(83%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (93%) อ่างฯแม่มอก(94%) อ่างฯจุฬาราม(97%) อ่างฯอุบลรัตน์(88%) อ่างฯลำตะคอง(106%) อ่างฯลำพระเพลิง(99%) อ่างฯมูลบน(99%) อ่างฯลำตะ(100%) อ่างฯลำนางรอง(96%) อ่างฯสิรินธร(87%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์(93%) อ่างฯทับเสลา(92%) อ่างฯกระเสียว(100%) อ่างฯศรีนครินทร์(92%) อ่างฯวชิราลงกรณ์(85%) อ่างฯขุนด่านปราการชล(91%) อ่างฯบางพระ(93%) อ่างฯหนองปลาไหล (102%) อ่างฯประแสร์(95%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา(87%) อ่างฯแก่งกระจาน(90%) อ่างฯปราณบุรี(89%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก
แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 238 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 235 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.31 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.89 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 85 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 85 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.83 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.84 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.55 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.55 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 71 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 60 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 5 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 6 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 20 ลบ.ม. (เมื่อวาน 30 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 45 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 45 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลย์) 9 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 19 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 74 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 74 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทอง) 3 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 30 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 30 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 11 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 119 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 123 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		20 ธ.ค.64	21 ธ.ค.64	22 ธ.ค.64	23 ธ.ค.64	24 ธ.ค.64	25 ธ.ค.64	26 ธ.ค.64		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.24	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.24	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 26 ธ.ค. 64	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.78	-11.02
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.15	-11.85
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.27	-10.93
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.43	-10.57
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.95	-10.55
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.42	-12.08

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จำนวน 2 ชุด ณ สนามบินนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างกักเก็บน้ำ รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2564 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีนาปรัง พืชไร่ อุตสาหกรรม และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 202 เครื่อง แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 109 เครื่อง ในพื้นที่ 18 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 86 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด
- อุทกภัย จำนวน 7 เครื่อง ในพื้นที่ 1 จังหวัด

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค. 64)

5.1 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 3 พ.ย. - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล พัทลุง สงขลา ตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 61,435 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 80,608 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 13,881 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 8,672 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 58,054 ไร่ สำรวจความเสียหายแล้ว เกษตรกร 1,701 ราย พื้นที่เสียหาย 6,339 ไร่ คิดเป็นเงิน 14.20 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 31 ราย พื้นที่ 83 ไร่ วงเงิน 0.22 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ระนอง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง และจังหวัดนราธิวาส เกษตรกร 2,510 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6,435 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 2,327 ไร่ บ่อกุ้ง 4,108 ไร่ กระชัง 3,188 ตรม. สำรวจความเสียหายแล้ว เกษตรกร 142 พื้นที่เสียหาย 218 ไร่ กระชัง 1,232 ตรม. คิดเป็นเงิน 1.53 ล้านบาท อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง เกษตรกร 26,100 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 1,774,055 ตัว แบ่งเป็น โค 69,224 ตัว กระบือ 1,054 ตัว สุกร 76,170 ตัว แพะ/แกะ 7,834 ตัว สัตว์ปีก 1,619,773 ตัว แผลงหญ้า 7,989 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

5.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 1 ก.ย.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช พบความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุดรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สระแก้ว สุพรรณบุรี เพชรบุรี หนอง และจังหวัดยะลา เกษตรกร 325,773 ราย พื้นที่ 3,333,749 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,295,259 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,017,584 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 20,906 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,175.09 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 5,245 ราย พื้นที่ 25,661 ไร่ วงเงิน 45.20 ล้านบาท**

ด้านประมง พบความเสียหาย 45 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยา แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ตราด นครปฐม สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว อ่างทอง นครนายก และจังหวัดระนอง เกษตรกร 22,596 ราย พื้นที่ 39,660 ไร่ กระชัง 24,182 ตอม. คิดเป็นเงิน 285.59 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 4,405 ราย พื้นที่ 4,084 ไร่ กระชัง 7,720 ตอม. วงเงิน 25.25 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ชัยภูมิ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร 1,762 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 106,345 ตัว แปลงหญ้า 308 ไร่ คิดเป็นเงิน 11.91 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 573 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 35,151 ตัว แปลงหญ้า 7 ไร่ วงเงิน 6.54 ล้านบาท**

5.3 วาตภัย ช่วงภัยวันที่ 8 – 30 ก.ย.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย กาญจนบุรี จันทบุรี เพชรบุรี หนองบัวลำภู และจังหวัดพังงา เกษตรกร 518 ราย พื้นที่ 838 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 42.75 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 425 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 370 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.40 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 453 ราย พื้นที่ 700 ไร่ วงเงิน 1.85 ล้านบาท**

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.4 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค. – 24 ส.ค.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี อุดรดิตถ์ เลย จันทบุรี ระยอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร 1,482 ราย พื้นที่ 7,968 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,564 ไร่ พืชไร่ 5,236 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 168 ไร่ คิดเป็นเงิน 9.15 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านประมง พบความเสียหาย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก พิษณุโลก เลย สระบุรี สมุทรปราการ และจังหวัดตรัง เกษตรกร 896 ราย พื้นที่ บ่อปลา 2,022 ไร่ วงเงิน 8.55 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 789 ราย พื้นที่ 1,670 ไร่ วงเงิน 7.06 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา เกษตรกร 29 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 744 ตัว คิดเป็นเงิน 18,600 บาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

5.5 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค.64 – 31 ส.ค.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุดรดิตถ์ นครราชสีมา สระบุรี และจังหวัด ฉะเชิงเทรา เกษตรกร 10,416 ราย พื้นที่ 165,374 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 112,955 ไร่ พืชไร่ 52,419 ไร่ คิดเป็นเงิน 180.44 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 3,535 ราย พื้นที่ 40,176 ไร่ วงเงิน 40.59 ล้านบาท**

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค. 64)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1.เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตาก) จำนวน 125 ไร่ การระบาดลดลง 55 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว - ผลิทยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและชีววนทรีย์ ธรรมชาติให้ใช้ควบคุม
	2. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 10 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่	- ศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
	3. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครปฐม) จำนวน 140 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 140 ไร่	- แนะนำให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึง
แนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ และสารเคมีอย่างถูกต้อง			

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			- แนะนำวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะนำให้เกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิต และลดปริมาณแหล่งที่อยู่อาศัยของ โรค แมลง ศัตรูพืช ในนาข้าว
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด 4. ดั้วงวง 5. ไรสีขา 6. หนอนกินใบมะพร้าว	พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด (ขอนแก่น ศรีสะเกษ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ภูเก็ต สตูล สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,141 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 579 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 11,246 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 667 ไร่ พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,219 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 209 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,231 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร กระบี่ และสงขลา) จำนวน 1,140 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 119 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 100 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ - ปลอ่ยกแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอ่ยกแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาคักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ไรสีขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในขั้วผลมะพร้าว ทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้น การป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล) จำนวน 845 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 91 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 330 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 54 ไร่	- ใช้กาคักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ให้เกษตรกรใช้ เชื้อ ไรโซทีเรียโคโคเดอเรีย มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรครากขาว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ภูเก็ต และสงขลา) จำนวน 85 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาวโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพาราที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราแก่เกษตรกรรับรู้อย่างต่อเนื่อง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. โรคใบร่วงยางพารา ชนิดใหม่ 3. โรคใบร่วงยางพารา	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตราด ตรัง นราธิวาส พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 467,836 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 67,229 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (น่าน ปัตตานี ยะลา และสงขลา) จำนวน 2,131 ไร่ <u>การระบาดลดลง 5,341 ไร่</u>	- ค้นหาวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคุ้ยลุ่มบริเวณต้นที่เป็นโรคนอกคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดออกทุกปี - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพารา
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. โรคไรแดงมันสำปะหลัง 3. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตาก น่าน สกลนคร ชัยนาท จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 171 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ยโสธร และจันทบุรี) จำนวน 81 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 81 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และลพบุรี) จำนวน 4,559 ไร่ <u>การระบาดลดลง 9,325 ไร่</u>	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตยายแตนเบียน <i>Anagrus lopezi</i> แผลข้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้แมลงงูหลง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุมโดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกกลลงในดินและให้หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - โรคโคนเน่าหัวเน่า แนะนำเกษตรกรเก็บเศษเหง้า หรือเศษซากมันสำปะหลังเผาทำลายทิ้ง ทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตร ควรมีการไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แซ่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเมทาแลซิล
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) 2. หนอนเจาะลำต้น	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี สงขลา และสตูล) จำนวน 253 ไร่ <u>การระบาดลดลง 121 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (พิจิตร) จำนวน 90 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด - รณรงค์ให้มีการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ หากพบการระบาดระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีควบคุมการระบาดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว 2. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตราด) จำนวน 38 ไร่ <u>การระบาดลดลง 17 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 11 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มา และขุดพรวนท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรค - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจและทำความสะอาดแปลงอย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชข้างเคียง เพื่อทำลายพืชอาศัย และหากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งระยะรุนแรงแนะนำให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จันทบุรี ตราด และระยอง) จำนวน 183 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 75 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 28 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 20 ไร่</u>	- เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ชุมพร และสงขลา) จำนวน 290 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 84 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา ระนอง และสงขลา) จำนวน 3,644 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 152 ไร่	- เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง เฉพาะต้น - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้างเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
เงาะ	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 2 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่	- หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 97 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรคราดำ 4. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 277 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 43 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 328 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 19 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบไปเผาทำลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ ย่อยวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ - โรคราดำ พ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อ กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรค และทำลายแหล่งอาศัยของแมลงปากดูดที่มาขับถ่ายน้ำหวาน เนื่องจากเชื้อราเจริญบนสารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้ จึงควรพ่นสารกำจัดแมลง และใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่องผูกรอบโคนต้น ป้องกันเพลี้ยแป้ง และมดไต่ขึ้นมาบนต้น - มวนลำไย ตัดแต่งกิ่ง ไม่ให้ทรงพุ่มหนาทึบ เพื่อทำลายที่หลบซ่อนและที่พักอาศัยของตัวเต็มวัย หากพบการระบาดจับตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และไข่มาทำลาย ใช้ศัตรูธรรมชาติ

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 64)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 22 ธันวาคม 2564 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 30 จังหวัด 141 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 8 จุด ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี กำแพงเพชร และสงขลา ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคล้มปัสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธ.ค. 64)

พบการระบาดของสัสมตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 21 ธ.ค. 64 รวม 68 จังหวัด 861 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 604,115 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 24,437 ตัว สัตว์ตายสะสม 60,625 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคเนื้อ	กรุงเทพฯ(102/6) นนทบุรี (4/0) ชัยนาท(2,454/511) ปทุมธานี(304/9) อุทัยธานี(180/23) ลพบุรี(1,311/181) สระบุรี(465/45) สิงห์บุรี(121/18) อ่างทอง(545/104) ฉะเชิงเทรา(503/51) ชลบุรี(275/18) ปราจีนบุรี(175/24) สมุทรปราการ(4/0) สระแก้ว(7,948/736) จันทบุรี(29/10) ตราด (75/4) นครนายก (2/0) ชัยภูมิ(6,663/1,041) นครราชสีมา(50,293/2,664) บุรีรัมย์(62,496/5,400) โยธธร(9,508/686) ศรีสะเกษ(31,838/1,316) สุรินทร์(52,419/5,579) อำนาจเจริญ(11,631/1,844) อุบลราชธานี(42,888/5,827) กาฬสินธุ์(24,153/2,460) ขอนแก่น(31,969/3,938) นครพนม (8,486/709) บึงกาฬ(2,231/326) มหาสารคาม(35,403/6,537) มุกดาหาร(25,305/859) ร้อยเอ็ด(57,035/6,103) เลย(3,596/207) สกลนคร (22,581/2,484)หนองคาย(4,332/410) หนองบัวลำภู(3,903/429) อุดรธานี(14,545/1,612) เชียงราย(1,005/48) เชียงใหม่(406/25) น่าน (1,834/97) พะเยา(279/16)แพร่(830/89) ลำปาง(3,205/229) ลำพูน(241/39) ตาก(21,471/1,204) นครสวรรค์(1,631/231) พิจิตร(500/50) พิษณุโลก(3,864/147) เพชรบูรณ์(1,750/209) สุโขทัย(2,905/711) อุตรดิตถ์(678/159) อุทัยธานี(283/47) กำแพงเพชร(133/20) กาญจนบุรี (10,147/978) นครปฐม(336/34) ประจวบคีรีขันธ์(4,519/426) เพชรบุรี(5,487/775) ราชบุรี(1,944/85) สุพรรณบุรี(6,534/872) สมุทรสาคร (49/1) สมุทรสงคราม(153/0) ชุมพร(894/115) กระบี่(78/2) สุราษฎร์ธานี(331/59) พัทลุง(283/14) นครศรีธรรมราช(268/9) ยะลา(11/1) สงขลา (356/10)
โคนม	กรุงเทพฯ(3/2) ชัยนาท(38/2) ลพบุรี(254/16) สระบุรี(81/4) ชลบุรี(14/0) สระแก้ว(2,237/150) จันทบุรี(11/7) ชัยภูมิ(172/33) นครราชสีมา (1,428/82) บุรีรัมย์(902/49) ศรีสะเกษ(80/4) สุรินทร์(84/9) ร้อยเอ็ด(981/58) กาฬสินธุ์(17/2) ขอนแก่น(780/182) นครพนม(2/0) มหาสารคาม (293/38) เลย(249/9) สกลนคร(686/54) หนองบัวลำภู(47/3) อุดรธานี(374/51) เชียงราย(729/58) เชียงใหม่(180/45)แพร่(6/0) ลำปาง(107/16) ลำพูน(515/73) พิจิตร(102/1) พิษณุโลก(2/1) เพชรบูรณ์(31/9) สุโขทัย (301/17) กาญจนบุรี(184/20) นครปฐม(95/1) ประจวบคีรีขันธ์(1,018/73) เพชรบุรี(268/35) ราชบุรี(967/48) สุพรรณบุรี(37/10) ชุมพร(11/4) พัทลุง(11/2) สงขลา(1/0)
กระบือ	กรุงเทพฯ (2/2) ชัยนาท(3/0) ปทุมธานี(1/0) ลพบุรี(2/0) สระแก้ว(27/18) ชัยภูมิ(21/6) นครราชสีมา(60/5) บุรีรัมย์(464/82) ศรีสะเกษ(49/6) สุรินทร์ (271/86) อำนาจเจริญ(1/5) อุบลราชธานี(250/37) กาฬสินธุ์(88/40) ขอนแก่น(424/109) นครพนม(83/0) บึงกาฬ(17/4) มหาสารคาม(205/96) มุกดาหาร (32/5) ร้อยเอ็ด(981/52) เลย(10/3) สกลนคร(321/50) หนองคาย(44/10) หนองบัวลำภู(46/6) อุดรธานี(61/9) น่าน(2/0) ตาก(11/3) พิษณุโลก(29/1) เพชรบูรณ์(4/0) สุโขทัย (2/0) กาญจนบุรี(1/1) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี(10/0) สุราษฎร์ธานี(1/0)
กระทิง	ประจวบคีรีขันธ์(1/0)

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและແລງพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรคหรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 205,962 ราย 2) หยอดหรือร่ายยาป้องกันแมลง 37,425 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 225,413 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 170,488 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 129,258 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 425,552 ราย

7.3 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564) พบการระบาด 34 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 12 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสุกร 3 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน รัสเซีย จีน
 - ในหมูป่า 5 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย อังการี
 - ในสุกร/หมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
- โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง 16 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสัตว์ปีก 10 ครั้ง ที่ประเทศอิสราเอล เยอรมนี จีน
 - ในนก 4 ครั้ง ที่ประเทศอาเซอร์ไบจาน อิหร่าน ฝรั่งเศส บัลแกเรีย
 - ในหงส์ขาว 1 ครั้ง ที่ประเทศสโลวาเกีย
 - ในห่าน 1 ครั้ง ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก
- โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 6 ครั้ง แบ่งเป็น
 - โรค SARS-COV-2 2 ครั้ง ในเพียงพอน ที่ประเทศโปแลนด์ และในกวาง ที่ประเทศแคนาดา
 - โรค Lumpy skin disease 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศรัสเซีย
 - โรค ข้อและสมองอักเสบ 1 ครั้ง ในแพะ ที่ประเทศโคลอมเบีย
 - โรค Infection bovine rhinotracheitis 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศคาซัคสถาน
 - โรค Infection salmon anaemia 1 ครั้ง ในปลาแซลมอน ที่ประเทศไอซ์แลนด์