



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com
[http:// www.moac.go.th](http://www.moac.go.th)



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกและภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 16 มิ.ย. 65 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 17 มิ.ย. 65



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	เขตสะพานสูง	กรุงเทพมหานคร	47.3	ฝนตกหนัก
2	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	44.6	ฝนตกหนัก
3	อ.เมือง	น่าน	31.4	ฝนตกปานกลาง
4	อ.คลองใหญ่	ตราด	29.5	ฝนตกปานกลาง
5	อ.เมือง	ตรัง	27.9	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 42,152 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 18,216 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (34,891 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46) มากกว่าปี 2564 จำนวน 7,261 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 83.76 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 142.77 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 33,932 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 39,017 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 15,475 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (32,292 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46) มากกว่าปี 2564 จำนวน 6,725 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 63.02 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 116.87 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 31,909 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	10,318	42	3,573	20	75	1,001	616	62	517	57	83	25,825	10,934	42	4,090	22	14,892
ตอน.	12	8,368	3,854	46	2,203	33	218	2,009	1,229	61	1,072	58	230	10,377	5,083	49	3,275	38	5,295
กลาง	3	1,419	514	36	454	34	22	369	181	49	157	45	25	1,788	695	39	611	36	1,093
ตะวันออก	2	26,605	18,979	71	5,702	43	7	147	93	63	83	60	9	26,752	19,072	71	5,785	43	7,681
ตะวันออก	6	1,515	610	40	511	36	51	964	512	53	460	50	57	2,479	1,122	45	970	42	1,357
ใต้	4	8,194	4,743	58	3,032	47	39	668	504	75	452	74	43	8,863	5,247	59	3,484	49	3,616
รวม	35	70,926	39,017	55	15,475	33	412	5,158	3,135	61	2,741	58	447	76,084	42,152	55	18,216	35	33,932

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แคว้นน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 10,057 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 3,361 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 18) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 7.36 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 33.28 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,814 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,898	44	2,098	22	0.00	0.00	10.00	10.00	7,564
สิริกิตี	3,617	38	767	12	5.27	3.71	15.06	12.03	5,893
ภูมิพล+สิริกิตี	9,515	41	2,865	18	5.27	3.71	25.06	22.03	13,457
แคว้นน้อยฯ	311	33	268	30	2.09	1.59	3.89	3.89	628
ป่าสักชลสิทธิ์	231	24	228	24	0.00	0.80	4.33	4.33	729
รวมทั้งหมด	10,057	40	3,361	18	7.36	6.10	33.28	30.25	14,814

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 9 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (22%) อ่างฯ สิริกิตี (12%) อ่างฯ ห้วยหลวง (27%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (19%) อ่างฯ สิรินคร (20%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (24%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (18%) อ่างฯ คลองสิียด (16%) และอ่างฯ นฤปดินทรจินดา (19%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำมูล แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 466 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 463 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.37 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.83 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 136 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 120 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.39 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.40 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +6.08 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.93 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 136 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 137 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 121 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 11 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 4 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก ปิด (เมื่อวาน ปิด) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 71 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลย์) 6 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 26 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 201 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 192 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 25 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 55 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 90 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 31 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 111 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 112 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		11 มิ.ย.65	12 มิ.ย.65	13 มิ.ย.65	14 มิ.ย.65	15 มิ.ย.65	16 มิ.ย.65	17 มิ.ย.65		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.15	0.16	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาเกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.19	0.17	0.17	0.18	0.18	0.20	0.20	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.20	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 17 มิ.ย. 65	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	3.79	-9.01
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	8.04	-7.96
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	5.07	-7.13
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	5.18	-6.82
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	4.90	-7.60
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	5.15	-9.35

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 10 หน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น และเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วงระหว่างฤดูเพาะปลูก

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1-16 มิถุนายน 2565)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	แพร่(2) น่าน(2) พิจิตร(4) เพชรบูรณ์(2)
กลาง	ลพบุรี(1) สระบุรี(1) กาญจนบุรี(4)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น(1) ศรีสะเกษ(4) อุบลราชธานี(2) ชัยภูมิ(2) นครราชสีมา(3)
ตะวันออก	ไม่ขอรับบริการ
ใต้	ราชบุรี(1)
รวม	13 จังหวัด 28 อำเภอ

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง 1. การกักเก็บน้ำฝนและน้ำชลประทาน ไม่ปฏิบัติการ เนื่องจากเครื่องยนตปีกขวามีปัญหาจึงยกเลิกภารกิจปฏิบัติการ 2. การกักเก็บน้ำฝนและน้ำชลประทาน ไม่ปฏิบัติ เนื่องจากกลุ่มเมฆไม่เข้าเงื่อนไขปฏิบัติการ
2. ตาก	2	1. การกักเก็บน้ำฝนและน้ำชลประทาน มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.เชียงใหม่ (แม่แจ่ม) 2. การกักเก็บน้ำฝนและน้ำชลประทาน ให้เขื่อนกักเก็บ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก
3. พิษณุโลก	2	การกักเก็บน้ำฝนและน้ำชลประทาน มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พิจิตร(ตะพานหิน ดงเจริญ ทับคล้อ วังทรายพูน) จ.เพชรบูรณ์(ชนแดน วังโป่ง เมืองเพชรบูรณ์)
4. แพร่	3	การกักเก็บน้ำฝนและน้ำชลประทาน ให้เขื่อนกักเก็บ บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จ.น่าน
5. ลพบุรี	6	การกักเก็บน้ำฝนและน้ำชลประทาน มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สระบุรี (ดอนพุด หนองโดน บ้านหมอ พระพุทธบาท เสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ แก่งคอย) จ.ลพบุรี(ท่าวัง เมืองลพบุรี บ้านหมี่ สระโบสถ์ หนองม่วง โคกเจริญ)
6. กาญจนบุรี	4	การกักเก็บน้ำฝนและน้ำชลประทาน มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี(เลาขวัญ หนองปรือ บ่อพลอย ห้วยกระเจา) จ.สุพรรณบุรี(หนองหญ้าไซ ด้านช้าง ดอนเจดีย์ อุทุมพร)
7. ขอนแก่น	1	การกักเก็บน้ำฝนและน้ำชลประทาน มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ชัยภูมิ (บ้านแท่น) จ.ขอนแก่น(หนองเรือ)
8. อุตรดิตถ์	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
9. นครราชสีมา	2	การกักเก็บน้ำฝนและน้ำชลประทาน มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (ปากช่อง สีคิ้ว ด่านขุนทด เทพารักษ์) จ.ชัยภูมิ(บ้านหันจมนรงค์ ชับใหญ่ เทพสถิต หนองบัวระเหว บ้านเขว้า)

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
10. อุบลราชธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้าติดตามสภาพอากาศ ช่วงบ่ายมีฝนตกบริเวณสนามบินและพื้นที่โดยรอบ
11. สุรินทร์	3	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์(เมืองบุรีรัมย์ ประโคนชัย) จ.สุรินทร์(ปราสาท)
12. สระแก้ว	6	1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สระแก้ว(วัฒนานคร วังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์ วังสมบูรณ์)
รวม	26	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 16 มิถุนายน 2565)

ตั้งแต่เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 16 มิถุนายน 2565 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 80 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 97.1 ขึ้นปฏิบัติการ จำนวน 762 เที่ยวบิน (1155.21 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำมัน 593.2 ตัน พลุสารพัดความขึ้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 24 นัด พลุสารพัดความขึ้นแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน 24 นัด พลุซิลเวอร์ ไอโอไดด์สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 860 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกกรม 38 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก น่าน พิจิตร เชียงใหม่ สุโขทัย อุดรดิตถ์ พิจิตร พะเยา ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์แพร่ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร สกลนคร นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบล-บุรี-โกศ พิษไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565 จำนวน 2,140 เครื่อง ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ จำนวน 135 เครื่อง โดยแบ่งแยกดังนี้

1. ช่วยเหลือพื้นที่ชาวนาปีและพิษไร่ จำนวน 86 เครื่อง ในพื้นที่ 11 จังหวัด
2. ช่วยเหลือพื้นที่ชาวนาปรัง จำนวน 15 เครื่อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด
3. ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 34 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิ.ย. 65)

5.1 อุทกภัย ช่วงภัย พ.ค. 65 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี สุโขทัย นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 12,270 ราย พื้นที่ 41,066 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 21,120 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 17,105 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 2,841 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 149 ราย พื้นที่ 592 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 302 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 289 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 2 ไร่ คิดเป็นเงิน 0.98 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุดรดิตถ์ กำแพงเพชร ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสตูล เกษตรกร 2,018 ราย รวมพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,506 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 1,496 ไร่ บ่อกุ้ง 11 ไร่ กระชัง 224 ตรม.

อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.2 อุทกภัย ช่วงภัย ม.ค. – 27 เม.ย. 65

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก สุโขทัย แม่ฮ่องสอน พะเยา อุทัยธานี อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 108,193 ราย พื้นที่ 111,315 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 59,256 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 28,587 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 23,472 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 5,742 ราย พื้นที่ 29,399 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 12,564 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 16,309 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 526 ไร่ คิดเป็นเงิน 51.26 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 412 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7.18 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 1,772 ไร่ วงเงิน 3.75 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.32 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 673 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 434 ไร่ กระชัง 11,747 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 673 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 434 ไร่ กระชัง 11,747 ตรม. คิดเป็นเงิน 6.65 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 280 ราย (คิดเป็นร้อยละ 41.60 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 324 ไร่ กระชัง 1,700 ตร.ม. วงเงิน 1.22 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 18.35 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี พัทลุง นครศรีธรรมราช ยะลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 40,559 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 972,526 ตัว แบ่งเป็น โค 53,240 ตัว กระบือ 2,216 ตัว สุกร 64,181 ตัว แพะ/แกะ 31,686 ตัว สัตว์ปีก 821,203 ตัว แปลงหญ้า 950 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 260 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 2,352 ตัว คิดเป็นเงิน 8.44 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 68 ราย (คิดเป็นร้อยละ 26.15 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) สัตว์ตาย/สูญหาย 960 ตัว วงเงิน 1.55 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 18.36 ของวงเงินช่วยเหลือ)

5.3 วาดภัย ช่วงภัย ม.ค. 65 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ตราด จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา นราธิวาส ชุมพร ตรัง สตูล และนราธิวาส เกษตรกร 11,574 ราย พื้นที่ 20,006 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 356 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 15,297 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,354 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 2,177 ราย พื้นที่ 5,200 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่และพืชผัก 4,207 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 993 ไร่ คิดเป็นเงิน 12.35 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 714 ราย (คิดเป็นร้อยละ 32.80 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 1,255 ไร่ วงเงิน 3.26 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 26.40 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.4 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 3 พ.ย. 64 – 12 ธ.ค. 64

ด้านพืช พบความเสียหาย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 3,301 ราย พื้นที่ 12,943 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4,237 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 5,089 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 3,616 ไร่ คิดเป็นเงิน 30.39 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านประมง พบความเสียหาย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง และจังหวัดนราธิวาส เกษตรกร 7,409 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 15,438 ไร่ กระชัง 4,338 ตรม. คิดเป็นเงิน 105.09 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,307 ราย (คิดเป็นร้อยละ 44.63 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 6,516 ไร่ กระชัง 4,244 ตร.ม. วงเงิน 46.13 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 43.90 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง เกษตรกร 2,077 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 50,255 ตัว แบ่งเป็น โค 132 ตัว กระบือ 7 ตัว สุกร 80 ตัว แพะ/แกะ 27 ตัว สัตว์ปีก 50,009 ตัว แปลงหญ้า 95 ไร่ คิดเป็นเงิน 6.49 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

5.5 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 1 ก.ย. 64 – 2 พ.ย. 64

ด้านพืช พบความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สระแก้ว สุพรรณบุรี เพชรบุรี ระนอง และจังหวัดยะลา เกษตรกร 326,193 ราย พื้นที่ 3,336,369 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,297,156 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,018,285 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 20,928 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,174.37 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 320,945 ราย (คิดเป็นร้อยละ 98.39 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 3,226,787 ไร่ วงเงิน 5,016.00 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 96.94 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 45 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยา แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ตราด นครปฐม สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว อ่างทอง นครนายก และจังหวัดระนอง เกษตรกร 23,083 ราย รวมพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 40,814 ไร่ กระชัง 25,030 ตรม. คิดเป็นเงิน 293.74 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม กาญจนบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี เกษตรกร 3,316 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 197,742 ตัว แปลงหญ้า 536 ไร่ คิดเป็นเงิน 18.61 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,311 ราย (คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) สัตว์ตาย/สูญหาย 194,579 ตัว แปลงหญ้า 536 ไร่ วงเงิน 18.46 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.19 ของวงเงินช่วยเหลือ)

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 65)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. เพลี้ยไฟ 3. หนอนห่อใบข้าว 4. แมลงสิง 5. แมงดำหาม 6. โรคไหม้ข้าว 7. โรคเมล็ดต่าง 8. โรคใบจุดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และเพชรบุรี) จำนวน 65 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กำแพงเพชร) จำนวน 123 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 123 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เพชรบุรี และพัทลุง) จำนวน 62 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (พังงา และสงขลา) จำนวน 93 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 50 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สิงห์บุรี) จำนวน 420 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 420 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครราชสีมา) จำนวน 10 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เพชรบุรี) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เพชรบุรี และนราธิวาส) จำนวน 13 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตรายการเชื้อราไตรโคเดอร์มาและชีวเวเรีย รมรงค์ให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ และสารเคมีอย่างถูกต้อง - แนะนำวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดโรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะนำให้เกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิต - แนะนำเกษตรกรถอนทำลายต้นที่พบการระบาดของโรคเมล็ดต่าง และแนะนำให้เกษตรกรไม่เก็บเมล็ดพันธุ์ในแปลงที่พบโรคไปใช้เพาะปลูกในฤดูถัดไป การปลูกข้าวครั้งต่อไปควรคลุมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไหม้ข้าว และใช้เชื้อราชีวเวเรียเพื่อควบคุมการระบาดของหนอนห่อใบข้าว - แนะนำเกษตรกรในการป้องกันกำจัดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และหนอนห่อข้าว โดยวิธีกำจัดพืชอาศัย เช่น หญ้าข้าวหนูก หญ้านกสีชมพู หญ้าปล้อง หญ้าไซ หญ้าชันภาค และข้าวป่า ที่เป็นพืชอาศัยของหนอนห่อใบข้าว และแนะนำให้เกษตรกรลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน หรือยูเรีย เพื่อลดการซ้อนทับกันของใบข้าวทำให้เกิดเป็นที่ยาอาศัยของโรคและแมลง แนะนำเกษตรกรให้ควบคุมระดับน้ำในนาได้ หลังปักดำหรือหว่าน 2-3 สัปดาห์จนถึงระยะตั้งท้องควบคุมน้ำในแปลงนาให้พอดีดินเปียกหรือมีน้ำแฉะผิวดินนาน 7-10 วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนกินใบมะพร้าว 3. แมลงดำหนาม 4. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง ราชบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,531 ไร่ การระบาดลดลง 283 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 65 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (เลย อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง ราชบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,993 ไร่ การระบาดลดลง 204 ไร่ พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง ราชบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,899 ไร่ การระบาดลดลง 229 ไร่	- รมรงค์ให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมหนอนของแมลงดำหนามมะพร้าวในพื้นที่ - ใช้กาคักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไธเลียส (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรด ในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - โรสี้ขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในช่วงผลมะพร้าว ทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารรถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสี้ขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	5. ดั้วงวง 6. โรสี้ขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,100 ไร่ การระบาดลดลง 58 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสงขลา) จำนวน 958 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่	
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. หนอนปลอกเล็ก 3. โรคลำต้นเน่า 4. โรคทะลายเน่า	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (อำนาจเจริญ จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,505 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 140 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ระยอง กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,834 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 131 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,187 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (นครสวรรค์ อุบลราชธานี ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 94 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่	- ใช้กำดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะ ตัวหนอน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิด โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - รณรงค์ให้เกษตรกรตัดทะลายที่เป็นโรคทะลายเน่าของ ปาล์มน้ำมันออกไปเผาทำลายนอกแปลง
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคหน้ำยางแห้ง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (น่าน จันทบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 156 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ปัตตานี พัทลุง ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 10,637 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (นครสวรรค์ น่าน ยโสธร สุรินทร์ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 8,703 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (น่าน มุกดาหาร จันทบุรี ระยอง ชุมพร และสงขลา) จำนวน 182 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพาราที่ ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราแก่เกษตรกรรับรู้ อย่างต่อเนื่อง - คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุด คูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนานาคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้าง ละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไป ทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่น โดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกทุกปี - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่น บริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพารา - รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วง ผลัดใบ และทำร่องบริเวณโคนต้นยางพาราให้ร่องขวาง กับลำต้น โดยให้ร่องจดกับร่องที่ทำแบ่งแยกหน้ากรีด เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามลงสู่รากของยางพารา และเพื่อลด การเกิดโรคหน้ำยางแห้ง - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารารุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา ตามคำแนะนำของกรมวิชาการ เกษตร ดังนี้ 1) ไตฟโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล อัตรา 15 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร 2) คาร์เบนดาซิม อัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร และ 3) โพรคลอราซ อัตรา 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กาฬสินธุ์ เลย สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ ชัยนาท และชลบุรี) จำนวน 118 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตรายแดนเบียน Anagrus lopezi แผลงข้างปีกใส และเชื้อ ราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. เพลี้ยหอย 3. ไรแดงมันสำปะหลัง 4. โรคพุ่มแจ้ 5. โรคโคนเน่าหัวเน่า 6. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ สกลนคร และชลบุรี) จำนวน 65 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กำแพงเพชร อุทัยธานี ขอนแก่น สกลนคร อุดรธานี และชลบุรี) จำนวน 179 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชลบุรี และระยอง) จำนวน 274 ไร่ การระบาดลดลง 28 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และระยอง) จำนวน 85 ไร่ การระบาดลดลง 70 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ขอนแก่น นครราชสีมา เลย ชัยนาท จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และกาญจนบุรี) จำนวน 12,322 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3,142 ไร่	- ให้เกษตรกรเฝ้าระวังดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุมโดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกกลในพื้นดินและให้หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพุ่มแจ้ และแนะนำเกษตรกรให้สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ในพื้นที่ที่พบการระบาดให้ชุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคหรือจากต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่แสดงอาการของโรค
อ้อย	1. เพลี้ยแป้ง 2. หนอนกออ้อย 3. โรคเส้ด้า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (พิจิตร และสุรินทร์) จำนวน 21 ไร่ การระบาดลดลง 43 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาฬสินธุ์ และอุดรธานี) จำนวน 18 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ลพบุรี) จำนวน 10 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย หากพบกลุ่มไข่ของหนอน ให้ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมาแมลงหางหนีบ และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในแปลงที่ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมา และแมลงหางหนีบ - โรคเส้ด้า แนะนำให้เกษตรกรถอนต้นที่เป็นโรคและนำไปทำลายนอกแปลง และเฝ้าทำลายอ้อยต่อที่เป็นโรครุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งของเชื้อแพร่ระบาดต่อไปในอ้อยปลูก - เพลี้ยแป้ง สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ประสานกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เพื่อขอรับแตนเบียน Anagrus lopezi มาใช้ในการควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งในพื้นที่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (เชียงใหม่ นครสวรรค์ ยโสธร จันทบุรี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล) จำนวน 252 ไร่ การระบาดลดลง 152 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง - แนะนำการควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหางหนีบ มวนพิษฆาต มวนพิษชาติ และแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา หากพบการระบาดรุนแรงควรพ่นสารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
สับปะรด	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 2 ไร่ การระบาดลดลง 130 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 52 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 130 ไร่	- รมรังค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มาและชุบท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรค - เพลี้ยแป้ง แนะนำเกษตรกรสำรวจแปลงปลูกสับปะรดอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการระบาดให้ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดเฉพาะจุดที่พบเพลี้ยแป้ง และรัศมีโดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้ง
ถั่วเขียว	1. โรคใบด่างถั่วเขียว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (อุทัยธานี) จำนวน 380 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 380 ไร่	- แนะนำเกษตรกรทำความเข้าใจการระบาดปลูก และกำจัดวัชพืช ในแปลงที่พบการระบาดให้เฝ้าระวัง (สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนการเฝ้าระวัง) ใช้เมล็ดพันธุ์สะอาดไม่ใช่เมล็ดพันธุ์จากแปลงที่เป็นโรค ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บเกี่ยว

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. หนอนเจาะผล 5. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ระยอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 258 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (พิษณุโลก จันทบุรี ระยอง ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 313 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 412 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตรวาท ระยอง กระบี่ นราธิวาส ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 202 ไร่ การระบาดลดลง 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตรวาท ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,549 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 28 ไร่	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย หรือใช้น้ำผสมไวท์ออยล์ พ่นเพื่อกำจัด หรือป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลงพันไว้ตามกิ่ง - เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลงเฉพาะต้น - หนอนเจาะผล ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทำลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไปโดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือกิ่งไม้กั้นระหว่างผล - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
เงาะ	1. หนอนเจาะผล 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง นราธิวาส สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 53 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (น่าน เลย จันทบุรี และนราธิวาส) จำนวน 63 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	- หนอนเจาะผล เก็บเกี่ยวผลเงาะในขณะที่ยังไม่สุกเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายของหนอน และเก็บผลเงาะที่ร่วงหล่นนำไปฝังหรือเผา เพื่อป้องกันการระบาดในฤดูต่อไป ในพื้นที่ที่พบการระบาดเมื่อผลเงาะเริ่มเปลี่ยนสี ควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล ทุก 7 วัน และหยุดพ่นสารก่อนเก็บ 7 วัน - เพลี้ยแป้ง ตัดแต่งกิ่งเงาะเพื่อลดปริมาณมด จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่องถูรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมด และเพลี้ยแป้งที่อาศัยอยู่ในดินได้ขึ้นมาบนต้นเงาะ กรณีพบเพลี้ยแป้งระบาดน้อยและพบอยู่เป็นกลุ่มตามส่วนต่างๆ ของต้นเงาะ ควรตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งนำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลงปลูก - โรคราแป้ง แนะนำเกษตรกรหากพบการระบาดไม่มากนักควรเก็บผลเงาะที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นมาเผาทำลาย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และในช่วงแตกใบอ่อนและเริ่มติดผลหมั่นตรวจดูว่าพบราแป้งเข้าทำลายใบอ่อนหรือไม่ ถ้าพบแนะนำให้เกษตรกรฉีดพ่นกำจัดด้วยกำมะถันผงละลายน้ำ 40 กรัม/20 ลิตร จะช่วยลดความรุนแรงลงได้ในช่วงระยะผลอ่อน
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร และนราธิวาส) จำนวน 40 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 67 ไร่ การระบาดคงที่	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - หนอนกินใบ หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน และทิ้งร่องรอยการทำลายให้เห็น หากพบการทำลายเกินร้อยละ 20 ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง ได้แก่ คาร์บาริล 85% ดับบลิฟท์ อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 5 – 7 วัน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. มวนลำไย 4. โรคพุ่มไม้กวาด 3. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ราชบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 84 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 54 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (น่าน และจันทบุรี) จำนวน 300 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (พะเยา จันทบุรี และระยอง) จำนวน 941 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	- แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบไปเผาทำลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - มวนลำไย ตัดแต่งกิ่ง ไม่ให้ทรงพุ่มหนาทึบ เพื่อทำลายที่หลบซ่อนและที่พักอาศัยของตัวเต็มวัย หากพบการระบาดจับตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และไข่มาทำลาย ใช้ศัตรูธรรมชาติ ฉีดพ่นก่อนลำไยออกดอก - โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะถอนวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ - โรคราดำ พ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรค และทำลายแหล่งอาศัยของแมลงปากดูดที่มาขับถ่ายน้ำหวาน เนื่องจากเชื้อราเจริญบนสารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้ จึงควรพ่นสารกำจัดแมลง

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิ.ย. 65)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 13 มิถุนายน 2565 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 30 จังหวัด 141 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 11 จุด ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ชลบุรี บุรีรัมย์ เชียงราย และประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค ในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัว ในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคล้มปัสกีน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 65)

พบการระบาดของสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 15 มิถุนายน 2565 รวม 70 จังหวัด 964 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 627,706 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 17,380 ตัว สัตว์ตายสะสม 65,516 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว แลงงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 206,691 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 38,185 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 226,496 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 173,847 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 134,191 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 434,104 ราย

7.3 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2565) พบการระบาด 3 ครั้ง ดังนี้

7.3.1 โรค High pathogenic avian influenza 1 ครั้ง ในนก ที่ประเทศสโลวาเกีย

7.3.2 โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 2 ครั้ง ได้แก่

- โรค Infectious bovine rhinotracheitis 1 ครั้ง ที่ประเทศคาซัคสถาน
- โรคปากและเท้าเปื่อย 1 ครั้ง ที่ประเทศซิมบับเว