



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 5 มิ.ย. 65 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. 65



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.คลองใหญ่	ตราด	55.2	ฝนตกหนัก
2	อ.เมือง	ภูเก็ต	43.6	ฝนตกหนัก
3	อ.เมือง	เชียงใหม่	41.9	ฝนตกหนัก
4	อ.เมือง	นครนายก	35.6	ฝนตกหนัก
5	อ.เมือง	ชัยนาท	30.2	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 65)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 43,147 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 19,212 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 37) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (34,908 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46) มากกว่าปี 2564 จำนวน 8,239 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 125.03 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 153.81 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 32,937 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 39,897 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 16,355 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (32,395 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46) มากกว่าปี 2564 จำนวน 7,502 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 97.48 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 123.97 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 31,029 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	10,625	43	3,880	21	75	1,001	628	63	529	59	83	25,825	11,253	44	4,409	23	14,573
ตอน.	12	8,368	4,047	48	2,397	36	218	2,009	1,266	63	1,109	60	230	10,377	5,313	51	3,506	41	5,064
กลาง	3	1,419	564	40	504	37	22	369	194	53	170	49	25	1,788	758	42	674	40	1,030
ตะวันตก	2	26,605	19,238	72	5,961	45	7	147	96	65	87	63	9	26,752	19,334	72	6,049	45	7,418
ตะวันออก	6	1,515	623	41	523	37	51	964	544	56	492	54	57	2,479	1,167	47	1,015	44	1,312
ใต้	4	8,194	4,800	59	3,090	48	39	668	522	78	470	76	43	8,863	5,322	60	3,559	50	3,541
รวม	35	70,926	39,897	56	16,355	35	412	5,158	3,250	63	2,857	60	447	76,084	43,147	57	19,212	37	32,937

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 10,407 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 3,711 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 20) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 11.87 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 47.53 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,464 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	6,078	45	2,278	24	3.39	8.07	22.00	17.00	7,384
สิริกิตี	3,713	39	863	13	7.52	7.01	16.02	14.00	5,797
ภูมิพล+สิริกิตี	9,791	43	3,141	19	10.91	15.08	38.02	31.00	13,181
แควน้อยฯ	340	36	297	33	0.90	1.82	5.18	5.18	599
ป่าสักชลสิทธิ์	276	29	273	29	0.06	4.68	4.32	4.33	684
รวมทั้งหมด	10,407	42	3,711	20	11.87	21.58	47.53	40.52	14,464

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 9 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (24%) อ่างฯ สิริกิตี (13%) อ่างฯ ห้วยหลวง (27%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (24%) อ่างฯ สิรินคร (26%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (29%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (19%) อ่างฯ คลองสิียด (17%) และอ่างฯ นฤปดินทรจินดา (19%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ กiewคอกหมา (85%) และอ่างฯ ศรีนครินทร์ (81%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำยม แม่น้ำมูล แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 205 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 218 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.11 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 9.09 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 65 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 65 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.68 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.95 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.31 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.31 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 88 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 89 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 80 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 5 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 3 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก ปิด (เมื่อวาน ปิด) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 71 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 6 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 27 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 95 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 98 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมทอง) 5 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 30 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 45 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 15 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 65 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 96 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		31 พ.ค.65	1 มิ.ย.65	2 มิ.ย.65	3 มิ.ย.65	4 มิ.ย.65	5 มิ.ย.65	6 มิ.ย.65		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแฉ่ง จ.ปทุมธานี	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.19	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.20	0.19	0.20	0.21	0.21	0.20	0.21	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 6 มิ.ย. 65	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	3.53	-8.95
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	7.96	-8.04
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	4.59	-7.61
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	5.19	-6.81
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	5.15	-7.35
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	6.31	-8.19

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 10 หน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างกักเก็บน้ำ รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1-5 มิถุนายน 2565)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	แพร่(5) เพชรบูรณ์(5) เชียงใหม่(1) น่าน(2) พิจิตร(4)
กลาง	ลพบุรี(6) สระบุรี(4) นครสวรรค์(3) อุทัยธานี(1) สุพรรณบุรี(1) กาญจนบุรี(3)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี(3) นครราชสีมา(4) ชัยภูมิ(3) ศรีสะเกษ(1) ร้อยเอ็ด(1) อำนาจเจริญ(2) สุรินทร์(1) ชัยภูมิ(5) ยโสธร(1)
ตะวันออก	สระแก้ว(3) ฉะเชิงเทรา(1)
ใต้	ราชบุรี(1)
รวม	22 จังหวัด 63 อำเภอ

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2565

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆควมมูลัสในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาตัวเล็กน้อยและสลายตัวเร็ว
2. ตาก	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆชั้นกลาง-ชั้นสูงปกคลุมพื้นที่เป้าหมาย ส่งผลให้เมฆพัฒนาตัวเล็กน้อยและสลายตัว
3. พิษณุโลก	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ที่ระดับปฏิบัติการมีค่าน้อยกว่า 60% ประกอบกับพื้นที่เป้าหมายมีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมตลอดทั้งวันส่งผลให้เมฆควมมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
4. แพร่	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศมีเสถียรภาพประกอบกับลมที่ระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง ส่งผลให้เมฆควมมูลัสในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาตัวเล็กน้อยและสลายตัวไว
5. ลพบุรี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้กลุ่มเมฆควมมูลัสในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาตัวช้า
6. กาญจนบุรี	1	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี(หนองปรือ เลาขวัญ) จ.สุพรรณบุรี(หนองหญ้าไซ ตอนเจดีย์)
7. ขอนแก่น	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศชั้นบนมีเสถียรภาพ ส่งผลให้เมฆควมมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว ประกอบกับติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่
8. อุตรดิตถ์	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากกลุ่มเมฆควมมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
9. นครราชสีมา	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆควมมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
10. อุบลราชธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาตัวเล็กน้อยและสลายตัวเร็ว
11. สุรินทร์	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆควมมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
12. สระแก้ว	3	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ พื้นที่การเกษตร จ.สระแก้ว(คลองหาด วังน้ำเย็น)
รวม	4	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 5 มิถุนายน 2565)

ตั้งแต่เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 5 มิถุนายน 2565 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้

- การปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 72 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 96.8 ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 660 เที่ยวบิน (1003.50 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 517.1 ตัน พลุสารพัดความชื้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 0 นัด พลุสารพัดความชื้นแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน 0 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 860 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 37 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก น่าน พิษณุโลก เชียงใหม่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร พะเยา ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์แพร่ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร สกลนคร นครราชสีมา อุตรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว
- การปฏิบัติการภารกิจดับไฟป่า จำนวน 5 วัน มีการขึ้นปฏิบัติการภารกิจดับไฟป่า จำนวน 37 เที่ยวบิน (11:20 ชั่วโมงบิน) ปริมาณน้ำ 20,000 ลิตร พื้นที่ปฏิบัติการ 1 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- **เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่** เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบโกล-บริโกล พืชไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565 จำนวน 2,140 เครื่อง ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ จำนวน 129 เครื่อง โดยแบ่งแยกดังนี้
 1. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 29 เครื่อง ในพื้นที่ 5 จังหวัด
 2. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 89 เครื่อง ในพื้นที่ 17 จังหวัด
 3. ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 11 เครื่อง ในพื้นที่ 3 จังหวัด
- **เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ** รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 65)

5.1 อุทกภัย ช่วงภัย พ.ค. 65 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 10,439 ราย พื้นที่ 36,101 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 19,521 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 13,823 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 2,757 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 8 ราย พื้นที่ 27.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 12.25 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 15.50 ไร่**

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และจังหวัดกำแพงเพชร เกษตรกร 644 ราย รวมพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 695 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 694 ไร่ บ่อกุ้ง 1 ไร่ กระชัง 224 ตรม. **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.2 อุทกภัย ช่วงภัย ม.ค. – 27 เม.ย. 65

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย แม่ฮ่องสอน พะเยา อุทัยธานี อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 108,152 ราย พื้นที่ 111,152 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 59,256 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 28,458 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 23,438 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 4,763 ราย พื้นที่ 22,976 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 12,564 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 9,953 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 460 ไร่ คิดเป็นเงิน 38.53 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 371 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7.79 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 1,723 ไร่ วงเงิน 3.58 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 9.29 ของวงเงินช่วยเหลือ)**

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 1,361 ราย รวมพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,206 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 1,194 ไร่ บ่อกุ้ง 12 ไร่ กระชัง 15,978 ตรม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 599 ราย รวมพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 267 ไร่ กระชัง 11,667 ตรม. คิดเป็นเงิน 5.55 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 262 ราย (คิดเป็นร้อยละ 44.57 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 97.27 ไร่ กระชัง 1,700 ตร.ม. วงเงิน 1.08 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 19.46 ของวงเงินช่วยเหลือ)**

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี พัทลุง นครศรีธรรมราช ยะลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 29,791 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 532,799 ตัว แบ่งเป็น โค 67,910 ตัว กระบือ 1,895 ตัว สุกร 9,605 ตัว แพะ/แกะ 28,870 ตัว สัตว์ปีก 424,519 ตัว แปลงหญ้า 1,532 ไร่ **พบความเสียหาย เกษตรกร 208 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 2,264 ตัว คิดเป็นเงิน 5.99 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 68 ราย (คิดเป็นร้อยละ 32.69 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) สัตว์ตาย/สูญหาย 960 ตัว วงเงิน 1.55 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 25.88 ของวงเงินช่วยเหลือ)**

5.3 วาดภัย ช่วงภัย ม.ค. 65 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ตราด จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี นราธิวาส ชุมพร ตรัง สตูล และนราธิวาส เกษตรกร 11,528 ราย พื้นที่ 19,958 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 356 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 15,289 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,313 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 2,001 ราย พื้นที่ 5,034 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่และพืชผัก 4,197 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 837 ไร่ คิดเป็นเงิน 10.95 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 515 ราย (คิดเป็นร้อยละ 25.74 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 941 ไร่ วงเงิน 2.10 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 19.18 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.4 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 3 พ.ย. 64 – 12 ธ.ค. 64

ด้านพืช พบความเสียหาย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 3,301 ราย พื้นที่ 12,942 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4,237 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 5,089 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 3,616 ไร่ คิดเป็นเงิน 30.39 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านประมง พบความเสียหาย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง และจังหวัดนราธิวาส เกษตรกร 7,409 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 15,438 ไร่ กระชัง 4,338 ตรม. คิดเป็นเงิน 105.09 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,014 ราย (คิดเป็นร้อยละ 40.68 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 5,225 ไร่ กระชัง 4,164 ตรม. วงเงิน 31.18 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 29.67 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง เกษตรกร 2,077 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 50,255 ตัว แบ่งเป็น โค 132 ตัว กระบือ 7 ตัว สุกร 80 ตัว แพะ/แกะ 27 ตัว สัตว์ปีก 50,009 ตัว แปลงหญ้า 95 ไร่ คิดเป็นเงิน 6.49 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

5.5 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 1 ก.ย. 64 – 2 พ.ย. 64

ด้านพืช พบความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุดรธานี อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สระแก้ว สุพรรณบุรี เพชรบุรี ระนอง และจังหวัดยะลา เกษตรกร 326,193 ราย พื้นที่ 3,336,369 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,297,156 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,018,285 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 20,928 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,174.37 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 293,599 ราย (คิดเป็นร้อยละ 90.01 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 3,226,788 ไร่ วงเงิน 5,016.98 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 96.96 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 45 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยา แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ตราด นครปฐม สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว อ่างทอง นครนายก และจังหวัดระนอง เกษตรกร 23,083 ราย รวมพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 40,814 ไร่ กระชัง 25,030 ตรม. คิดเป็นเงิน 293.74 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม กาญจนบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี เกษตรกร 3,316 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 197,742 ตัว แปลงหญ้า 536 ไร่ คิดเป็นเงิน 18.61 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,311 ราย (คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) สัตว์ตาย/สูญหาย 194,579 ตัว แปลงหญ้า 536 ไร่ วงเงิน 18.46 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.19 ของวงเงินช่วยเหลือ)

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 65)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนห่อใบข้าว 2. แมลงสี 3. โรคไหม้ข้าว 4. โรคใบจุดสีน้ำตาล 5. โรคเมล็ดต่าง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 6 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (พังงา พัทลุง สงขลา) จำนวน 65 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครราชสีมา) จำนวน 16 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เพชรบุรี นราธิวาส ปัตตานี) จำนวน 10 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เพชรบุรี สงขลา) จำนวน 67 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 32 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและชีวเวเรีย รมรงค์ให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ และสารเคมีอย่างถูกต้อง - แนะนำวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดโรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะนำให้เกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิต - แนะนำเกษตรกรถอนทำลายต้นที่พบการระบาดของโรคเมล็ดต่าง และแนะนำให้เกษตรกรไม่เก็บเมล็ดพันธุ์ในแปลงที่พบโรคไปใช้เพาะปลูกในฤดูถัดไป การปลูกข้าวครั้งต่อไปควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไหม้ข้าว และใช้เชื้อราชีวเวเรียเพื่อควบคุมการระบาดหนอนห่อใบข้าว
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนกินใบมะพร้าว 3. แมลงดำหนาม 4. ดั้วแรด 5. ดั้ววงง 6. ไรสีขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวดยอง สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,833 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 217 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 65 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (เลย อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวดยอง สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 13,219 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 312 ไร่ พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวดยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,043 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 35 ไร่ พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวดยอง สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,123 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 32 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรวดยอง นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสงขลา) จำนวน 960 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่	- รมรงค์ให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำและหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลงและเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปลอยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมหนอนของแมลงดำหนามมะพร้าวในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรด ในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ไรสีขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในขั้วผลมะพร้าว ทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. หนอนปลอกเล็ก 3. โรคลำต้นเน่า 4. โรคทะลายเน่า	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (อำนาจเจริญ จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,366 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,739 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,177 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (นครสวรรค์ อุบลราชธานี ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 109 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	- ใช้กำดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - รณรงค์ให้เกษตรกรตัดทะลายที่เป็นโรคทะลายเน่าของปาล์มน้ำมันออกไปเผาทำลายนอกแปลง
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคหน่ายางแห้ง	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 133 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ปัตตานี พัทลุง ระนอง สงขลาและสุราษฎร์ธานี) จำนวน 10,637 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10,637 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (นครสวรรค์ น่าน ยโสธร สุรินทร์ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 8,724 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 276 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (น่าน มุกดาหาร จันทบุรี ระยอง ชุมพร และสงขลา) จำนวน 169 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพาราที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราแก่เกษตรกรรับรู้อย่างต่อเนื่อง - คำนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่น โดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกคูทุกปี - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพารา - รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ และทำร่องบริเวณโคนต้นยางพาราให้ร่องขวางกับลำต้น โดยให้ร่องจดกับร่องที่ทำแบ่งแยกหน้ากรีด เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามลงสู่รากของยางพารา และเพื่อลดการเกิดโรคหน่ายางแห้ง - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารารุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา ตามคำแนะนำของกรมวิชาการ เกษตร ดังนี้ 1) ไดฟิโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล อัตรา 15 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร 2) คาร์เบนดาซิม อัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร และ 3) ไพแรคลอรัซ อัตรา 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู 3. เพลี้ยหอย 4. ไรแดงมันสำปะหลัง 5. โรคพุ่มแฉ้	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (กาฬสินธุ์ เลย สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุดรธานี ชัยนาท ชลบุรี ระยอง และกาญจนบุรี) จำนวน 84 ไร่ การระบาดลดลง 874 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ สกลนคร และชลบุรี) จำนวน 86 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กำแพงเพชร อุทัยธานี ขอนแก่น สกลนคร อุดรธานี และชลบุรี) จำนวน 179 ไร่ การระบาดลดลง 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 302 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 35 ไร่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้แมลงหนอนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุมโดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกกลลงในพื้นดิน และให้หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	6. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง 7. โรคโคนเน่าหัวเน่า	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และกาญจนบุรี) จำนวน 5,667 ไร่ การระบาดลดลง 103 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ และขอนแก่น) จำนวน 153 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 120 ไร่	- สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพุ่มแจ้ และแนะนำเกษตรกรให้ สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ในพื้นที่ที่พบการระบาดให้ขุด หรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง ใช้พันธุ์ที่ปลอด โรคหรือจากต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่แสดงอาการของโรค
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคเส้ดำ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาฬสินธุ์ และอุดรธานี) จำนวน 18 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ลพบุรี) จำนวน 10 ไร่ การระบาดลดลง 34 ไร่	- หนอนกออ้อย แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่าง สม่ำเสมอ ให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน หากพบกลุ่ม ไข่ของหนอน ให้ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา แมลงหางหนีบ และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในแปลงที่ ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา และแมลงหางหนีบ - โรคเส้ดำ แนะนำให้เกษตรกรถอนต้นที่เป็นโรคและ นำไปทำลายนอกแปลง และไถทำลายอ้อยตอที่เป็นโรค รุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งของเชื้อแพร่ระบาด ต่อไปในอ้อยปลูก
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น ยโสธร จันทบุรี สระแก้ว ยะลา สงขลา และสตูล) จำนวน 420 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 243 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง - แนะนำการควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหางหนีบ มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต และแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา หากพบการระบาดรุนแรงควรพ่นสารเคมีตามคำแนะนำของ กรมวิชาการเกษตร
สับปะรด	1. เพลี้ยแป้งสับปะรด 2. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 135 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และ ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 184 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 1 ไร่	- รมรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยว สับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลง อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มา และขุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรค - เพลี้ยแป้ง แนะนำเกษตรกรสำรวจแปลงปลูกสับปะรด อย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการระบาดให้ใช้สารเคมีในการ ป้องกันกำจัดเฉพาะจุดที่พบเพลี้ยแป้ง และรัศมีโดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้ง
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง 4. หนอนเจาะผล 5. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ตราด ระยอง ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 290 ไร่ การระบาดลดลง 60 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 411 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 307 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 40 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 195 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,291 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 251 ไร่	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่า แมลง เฉพาะต้น - เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาด บริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย หรือใช้ น้ำผสมไวท์ออยล์ พ่นเพื่อกำจัด หรือป้องกันโดยใช้ผ้าขุบ สารฆ่าแมลงพันไว้ตามกิ่ง - หนอนเจาะผล ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมา ทำลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทำลายควร เก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมาก เกินไปโดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือกิ่ง ไม้กั้นระหว่างผล - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกร หมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
เงาะ	1. หนอนเจาะผล 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง นราธิวาส และสงขลา) จำนวน 29 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เลย จันทบุรี และนราธิวาส) จำนวน 43 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	- หนอนเจาะผล เก็บเกี่ยวผลเงาะในขณะที่ยังไม่สุกเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายของหนอน และเก็บผลเงาะที่ร่วงหล่นนำไปฝังหรือเผา เพื่อป้องกันการระบาดในฤดูต่อไป ในพื้นที่ที่พบการระบาด เมื่อผลเงาะเริ่มเปลี่ยนสี ควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล ทุก 7 วัน และหยุดพ่นสารก่อนเก็บ 7 วัน - เพลี้ยแป้ง ตัดแต่งกิ่งเงาะเพื่อลดปริมาณมด จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่องถูรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมด และเพลี้ยแป้งที่อาศัยอยู่ในดินไต่ขึ้นมาบนต้นเงาะ กรณีพบเพลี้ยแป้งระบาดน้อยและพบอยู่เป็นกลุ่มตามส่วนต่างๆ ของต้นเงาะ ควรตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งนำไปเผาทำลาย - โรคราแป้ง แนะนำเกษตรกรรหากพบการระบาดไม่มากนักควรเก็บผลเงาะที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นมาเผาทำลาย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และในช่วงแตกใบอ่อนและเริ่มติดผลหมั่นตรวจดูว่าพบราแป้งเข้าทำลายใบอ่อนหรือไม่ ถ้าพบแนะนำให้เกษตรกรฉีดพ่นกำจัดด้วยกำมะถันผงละลายน้ำ 40 กรัม/20 ลิตร จะช่วยลดความรุนแรงลงได้ในช่วงระยะผลอ่อน
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร และนราธิวาส) จำนวน 20 ไร่ การระบาดลดลง 69 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 67 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 26 ไร่	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - หนอนกินใบ หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน และทิ้งร่องรอยการทำลายให้เห็น หากพบการทำลายเกินร้อยละ 20 ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง ได้แก่ คาร์บาริล 85% ดับลิฟฟี่ อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 5 – 7 วัน
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. มวนลำไย 3. โรคราดำ 4. โรคพุ่มไม้กวาด	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ราชบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 41 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (น่าน และจันทบุรี) จำนวน 65 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 19 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (พะเยา จันทบุรี และระยอง) จำนวน 922 ไร่ การระบาดลดลง 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 278 ไร่ การระบาดลดลง 19 ไร่	- แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบไปเผาทำลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะถอนวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ - โรคราดำ พ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรค และทำลายแหล่งอาศัยของแมลงปากดูดที่มาขับถ่ายน้ำหวาน เนื่องจากเชื้อราเจริญบนสารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้ จึงควรพ่นสารกำจัดแมลง - มวนลำไย ตัดแต่งกิ่ง ไม่ให้ทรงพุ่มหนาทึบ เพื่อทำลายที่หลบซ่อนและที่พักอาศัยของตัวเต็มวัย หากพบการระบาดจับตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และไข่มาทำลาย ใช้ศัตรูธรรมชาติ ฉีดพ่นก่อนลำไยออกดอก

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 65)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤษภาคม 2565 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 30 จังหวัด 141 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 17 จุด ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อำนาจเจริญ พะเยา และเชียงราย ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค ในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคล้มปัสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิ.ย. 65)

พบการระบาดของส슴ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 5 มิถุนายน 2565 รวม 69 จังหวัด 964 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 627,220 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 17,277 ตัว สัตว์ตายสะสม 65,365 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 206,604 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 38,100 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 226,406 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 173,761 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 133,999 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 433,896 ราย

ที่มา : <https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/123>

7.3 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2565) พบการระบาด 19 ครั้ง ดังนี้

7.3.1 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 15 ครั้ง แบ่งเป็น

- ในสุกร 3 ครั้ง ในประเทศไทย และโปแลนด์
- ในหมูป่า 12 ครั้ง ในประเทศลัตเวีย โรมาเนีย อิตาลี และฮังการี

7.3.2 โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 4 ครั้ง ได้แก่

- โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง(H5N1) 2 ครั้ง ในนก/สุนัขจิ้งจอก ที่ประเทศฮังการี และสหรัฐอเมริกา
- โรคไข้หวัดนก 1 ครั้ง ในนก ที่ประเทศบัลแกเรีย
- โรคปากและเท้าเปื่อย 1 ครั้ง ในโคเนื้อ ที่ประเทศอินโดนีเซีย