



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 14 มกราคม 2565 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

ลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว ยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส และยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 15-18 ม.ค. 65 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 13 ม.ค. 65 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 14 ม.ค. 65



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี	2.3	ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ม.ค. 65)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 56,442 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 32,510 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (46,045 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 61) มากกว่าปี 2564 จำนวน 10,397 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 33.32 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 115.65 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 19,629 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 52,174 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 28,631 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (42,241 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) มากกว่าปี 2564 จำนวน 9,932 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 27.13 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 99.00 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 18,753 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	13,334	54	6,589	36	75	1,001	791	79	691	77	83	25,825	14,125	55	7,281	38	11,700
ตอน.	12	8,368	6,345	76	4,695	70	218	2,002	1,609	80	1,458	79	230	10,370	7,954	77	6,152	72	2,416
กลาง	3	1,419	1,197	84	1,137	84	22	369	319	86	295	86	25	1,788	1,516	85	1,432	84	272
ตะวันตก	2	26,605	23,687	89	10,410	78	7	140	140	100	131	100	9	26,745	23,827	89	10,540	78	2,919
ตะวันออก	6	1,515	1,116	74	1,017	72	51	964	837	87	784	86	57	2,479	1,953	79	1,801	77	526
ใต้	4	8,194	6,494	79	4,784	74	39	668	572	86	519	84	43	8,863	7,066	80	5,303	75	1,796
รวม	35	70,926	52,174	74	28,631	60	412	5,144	4,268	83	3,878	82	447	76,071	56,442	74	32,510	62	19,629

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี๊ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 13,612 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 6,916 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 2.19 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 38.29 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 11,259 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	7,703	57	3,903	40	0.76	2.88	23.00	23.00	5,759
สิริกิตี๊	4,309	45	1,459	22	1.26	1.24	7.50	7.48	5,201
ภูมิพล+สิริกิตี๊	12,012	52	5,362	33	2.02	4.12	30.50	30.48	10,960
แควน้อยฯ	811	86	768	86	0.17	0.18	4.32	4.32	128
ป่าสักชลสิทธิ์	789	82	786	82	0.00	0.46	3.47	3.50	172
รวมทั้งหมด	13,612	55	6,916	38	2.19	4.75	38.29	38.30	11,259

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯสิริกิตี๊ (22%) และอ่างฯแม่กวอดมธรา (29%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 20 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯก๊วลม(82%) อ่างฯก๊วคหมา(81%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (86%) อ่างฯแม่มอก(82%) อ่างฯจุฬารักษ์(92%) อ่างฯลำตะคอง(99%) อ่างฯลำพระเพลิง(99%) อ่างฯมูลขาม(98%) อ่างฯลำแซะ(99%) อ่างฯลำนางรอง(93%) อ่างฯสิรินธร(84%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์(82%) อ่างฯกระเสียว(100%) อ่างฯศรีนครินทร์(92%) อ่างฯวชิราลงกรณ(83%) อ่างฯบางพระ(90%) อ่างฯหนองปลาไหล (96%) อ่างฯประแสร์(91%) อ่างฯแก่งกระจาน(88%) อ่างฯปราณบุรี(86%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสัก แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 279 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 265 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.52 ม.รทก.ต่ำกว่าตลิ่ง 8.68 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 85 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 85 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.86 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.92 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.55 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.55 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 77 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 77 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 61 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 5 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 11 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 21 ลบ.ม. (เมื่อวาน 21 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 51 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 47 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 10 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 21 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 79 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 85 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุททอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุททอง) 4 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 30 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 35 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 10 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 110 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 109 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		8 ม.ค.65	9 ม.ค.65	10 ม.ค.65	11 ม.ค.65	12 ม.ค.65	13 ม.ค.65	14 ม.ค.65		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกม.ท. จ.นนทบุรี	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกม.ชลประทานสามเสน กทม.	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 13 ม.ค. 65	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.74	-11.06
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	3.83	-12.17
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.12	-11.08
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.02	-10.98
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.65	-10.85
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.08	-12.42

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dow.go.th


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 (วันที่ 1 พ.ย.64 ถึง 30 เม.ย.65) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้งานได้ จำนวน 37,857 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ จำนวน 22,280 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 8,523 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันนี้นำไป 38.29 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 2,111 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 37 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 (1 พ.ย.64 - 30 เม.ย.65)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	2,535	7,442	11,785	518	22,280	8,523	38
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	2,000	2,415	135	5,700	2,111	37



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65

ทั่วประเทศ จำนวน 11.65 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 9.02 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.63 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 4.98 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.26 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.72 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65 (ข้อมูล ณ 12 มกราคม 2565)

ทั่วประเทศ จำนวน 6.81 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 5.80 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.01 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.45 ของแผน

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 4.37 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.04 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.33 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.75 ของแผน

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2564/65			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2564/65					
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวรอบที่ 2	%ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวมทั้งหมด	%รวมทั้งหมด
ทั่วประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	6.41	0.54	6.95	4.65	72.54	0.36	66.67	5.01	72.09
	นอกเขตชลประทาน	2.61	2.09	4.70	1.15	44.06	0.65	31.10	1.80	38.30
	รวม	9.02	2.63	11.65	5.80	64.30	1.01	38.40	6.81	58.45
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	2.81	0.06	2.87	3.25	115.66	0.07	116.67	3.32	115.68
	นอกเขตชลประทาน	1.45	0.66	2.11	0.79	54.48	0.26	39.39	1.05	49.76
	รวม	4.26	0.72	4.98	4.04	94.84	0.33	45.83	4.37	87.75

5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จำนวน 2 ชุด ณ สนามบินนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างกักเก็บน้ำ รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

6. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- **เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่** เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2564 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีนาปรัง พืชไร่ อุบลโกบรีโก และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 158 เครื่อง แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 1 เครื่อง ในพื้นที่ 1 จังหวัด
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 71 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 86 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด

- **เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ** รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

7. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 65)

7.1 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 3 พ.ย.64 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง สตูล พัทลุง สงขลา ตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 66,907 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 94,493 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 13,975 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 8,934 ไร่ ไม้ผลไม้น้ำมันและอื่นๆ 71,584 ไร่ สำรวจความเสียหายแล้ว เกษตรกร 2,933 ราย พื้นที่เสียหาย 12,165 ไร่ คิดเป็นเงิน 27.79 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 210 ราย พื้นที่ 359 ไร่ วงเงิน 1.04 ล้านบาท**

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ระนอง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง และจังหวัดนราธิวาส เกษตรกร 2,278 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6,353 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 2,294 ไร่ บ่อกุ้ง 4,058 ไร่ กระชัง 2,028 ตร.ม. สำรวจความเสียหายแล้ว เกษตรกร 748 พื้นที่เสียหาย 768 ไร่ กระชัง 1,552 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 4.51 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 192 ราย พื้นที่ 141 ไร่ กระชัง 1,221 ตร.ม. วงเงิน 1.22 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง เกษตรกร 26,100 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 1,774,055 ตัว แบ่งเป็น โค 69,224 ตัว กระบือ 1,054 ตัว สุกร 76,170 ตัว แพะ/แกะ 7,834 ตัว สัตว์ปีก 1,619,773 ตัว แปลงหญ้า 7,989 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

7.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 1 ก.ย.64 - ปัจจุบัน

ด้านพืช พบความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สระแก้ว สุพรรณบุรี เพชรบุรี ระนอง และจังหวัดยะลา เกษตรกร 325,957 ราย พื้นที่ 3,336,432 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,297,196 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,018,323 ไร่ ไม้ผล ไม้น้ำมันและอื่นๆ 20,913 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,179.18 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 7,095 ราย พื้นที่ 39,066 ไร่ วงเงิน 65.44 ล้านบาท**

ด้านประมง พบความเสียหาย 45 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยา แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ตราด นครปฐม สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว อ่างทอง นครนายก และจังหวัดระนอง เกษตรกร 23,043 ราย พื้นที่ 40,836 ไร่ กระชัง 24,534 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 293.23 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 4,831 ราย พื้นที่ 4,405 ไร่ กระชัง 7,895 ตร.ม. วงเงิน 26.83 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ชัยภูมิ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร 2,160 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 130,315 ตัว แปลงหญ้า 346 ไร่ คิดเป็นเงิน 13.67 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 601 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 36,518 ตัว แปลงหญ้า 91 ไร่ วงเงิน 6.70 ล้านบาท**

7.3 วาดภัย ช่วงภัยวันที่ 8 – 30 ก.ย.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย กาญจนบุรี จันทบุรี เพชรบุรี หนองบัวลำภู และจังหวัดพังงา เกษตรกร 518 ราย พื้นที่ 838 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 42.75 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 425 ไร่ ไม้ผลไม้น้ำมัน และอื่นๆ 370 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.40 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.4 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค. – 24 ส.ค.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี อุดรดิตถ์ เลย จันทบุรี ระยอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร 1,482 ราย พื้นที่ 7,968 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,564 ไร่ พืชไร่ 5,236 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 168 ไร่ คิดเป็นเงิน 9.15 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านประมง พบความเสียหาย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก พิษณุโลก เลย สระบุรี สมุทรปราการ และจังหวัดตรัง เกษตรกร 866 ราย พื้นที่ บ่อปลา 2,000 ไร่ วงเงิน 8.45 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา เกษตรกร 29 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 744 ตัว คิดเป็นเงิน 18,600 บาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

7.5 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค.64 – 31 ส.ค.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุดรดิตถ์ นครราชสีมา สระบุรี และจังหวัด ฉะเชิงเทรา เกษตรกร 10,416 ราย พื้นที่ 165,374 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 112,955 ไร่ พืชไร่ 52,419 ไร่ คิดเป็นเงิน 180.44 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 4,402 ราย พื้นที่ 54,063 ไร่ วงเงิน 56.53 ล้านบาท**

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

8. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 65)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. หนอนห่อใบข้าว 3. เพลี้ยไฟ 4. แมลงบัว 5. แมลงห่อ 6. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตาก และนครสวรรค์) จำนวน 820 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 695 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 25 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครปฐม) จำนวน 85 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครสวรรค์ และฉะเชิงเทรา) จำนวน 430 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 426 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 15 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 800 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 800 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและชีวเวเรีย รมรวงศ์ให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ และสารเคมีอย่างถูกต้อง - แนะนำวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะนำให้เกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิต
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (ขอนแก่น ศรีสะเกษ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ภูเก็ต สตูล สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,689 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 352 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 9,677 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2,017 ไร่	- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปลอยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะตัวแก่ และระยะตัวหนอน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. ดั้วแรด 4. หนอนกินใบมะพร้าว 5. ดั้วงวง 6. ไรสีขา	พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,696 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 604 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 100 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พังงา สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,236 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสงขลา) จำนวน 1,062 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 69 ไร่	- ไรสีขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในชั่วผลมะพร้าว ทำให้การพนสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้น การป้องกันกำจัดให้เน้นพนสารฆ่าไรในระยะมะพร้าว ติดจันจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,013 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3,089 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร และสตูล) จำนวน 256 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 90 ไร่	- ใช้กากักพีโรโมน และใช้ตข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกอล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดตัวแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ให้เกษตรกรใช้ เชื้อ อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ 3. โรคใบร่วงยางพารา	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ นราธิวาส ภูเก็ต สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 85 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 64 ไร่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 795,142 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (นครสวรรค์ กระบี่ พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 10,726 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 391 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพาราที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราแก่เกษตรกรรับรู้อย่างต่อเนื่อง - แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนานาคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกคูทุกปี - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพารา
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู 3. เพลี้ยหอย 4. โรคโรแดงมันสำปะหลัง 5. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ตาก นครสวรรค์ สกลนคร จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 189 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 73 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 73 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 40 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และจันทบุรี) จำนวน 74 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 73 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และลพบุรี) จำนวน 2,059 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รมรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แผลงข้างปีกใส่ และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้แมลงหนอนหว่ง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุมโดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ ขณะปลูกรหรือคลุกลองในพื้นที่ดิน และให้หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจุบันที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - โรคโคนเน่าหัวเน่า แนะนำเกษตรกรเก็บเศษหัว หรือเศษซากมันสำปะหลังเผาทำลายทิ้ง ทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตร ควรมีการไถตากดิน นอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แห่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเมทาแลกซิล

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตาก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ จันทบุรี สงขลา และสตูล) จำนวน 1,317 ไร่ การระบาดลดลง 52 ไร่	- ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้า ระวังศัตรูพืช เพื่อดำเนินการตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการ ระบาดของศัตรูข้าวโพด - รมรณคให้มีการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (FAW) โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ หากพบการระบาดระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีควบคุมการ ระบาดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว 2. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตราด) จำนวน 62 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 11 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรณคให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยว สับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลง อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มา และขุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรค - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจและทำความสะอาดแปลง อย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชข้างเคียง เพื่อทำลายพืช อาศัย และหากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งระยะรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการ เกษตร
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และชุมพร) จำนวน 570 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 257 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 204 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ชุมพร ยะลา และสงขลา) จำนวน 2,366 ไร่ การระบาดลดลง 261 ไร่	- เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบ การระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โต เต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสาร ฆ่าแมลง เฉพาะต้น - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกร หมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 113 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 16 ไร่	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และ ดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรคราดำ 4. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 286 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 58 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 338 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 26 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่	- แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลาย ของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบไปเผา ทำลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง โดย เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งสามารถ ต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อ ไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ ถอนวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ รวมถึง การใช้เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ - โรคราดำ พ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อ กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมไม่ให้เหมาะ ต่อการเกิดโรค และทำลายแหล่งอาศัยของแมลงปากดูดที่มา ขับถ่ายน้ำหวาน เนื่องจากเชื้อราเจริญบนสารเหนียวที่แมลง ปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้ จึงควรพ่นสารกำจัดแมลง - มวนลำไย ตัดแต่งกิ่ง ไม่ให้ทรงพุ่มหนาทึบ เพื่อทำลาย ที่หลบซ่อนและที่พักอาศัยของตัวเต็มวัย หากพบการ ระบาดจับตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และไข่มาทำลาย ใช้ศัตรู ธรรมชาติ ฉีดพ่นก่อนลำไยออกดอก

9. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

9.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 65)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 11 มกราคม 2565 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 30 จังหวัด 141 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 10 จุด ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี และสงขลา ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

9.2 โรคล้มปัสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 65)

พบการระบาดของสัตว์ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. - 13 ม.ค. 65 รวม 68 จังหวัด 877 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 604,646 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 22,538 ตัว สัตว์ตายสะสม 61,102 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคเนื้อ	กรุงเทพฯ(102/6) นนทบุรี (4/0) ชัยนาท(2,454/511) ปทุมธานี(304/9) อุทัยธานี(180/23) ลพบุรี(1,311/181) สระบุรี(465/45) สิงห์บุรี(121/18) อ่างทอง(545/104) ฉะเชิงเทรา(503/51) ชลบุรี(275/18) ปราจีนบุรี(175/24) สมุทรปราการ(4/0) สระแก้ว(7,948/744) จันทบุรี(29/10) ตราด(75/4) นครนายก (2/0) ชัยภูมิ(6,663/1,041) นครราชสีมา(50,293/2,664) บุรีรัมย์(62,566/5,419) ยโสธร(9,508/686) ศรีสะเกษ(31,838/1,316) สุรินทร์(52,433/5,579) อำนาจเจริญ(11,631/1,859) อุบลราชธานี(42,901/5,837) กาฬสินธุ์(24,153/2,465) ขอนแก่น(31,974/3,943) นครพนม(8,486/709) บึงกาฬ(2,231/326) มหาสารคาม(35,403/6,553) มุกดาหาร(25,305/859) ร้อยเอ็ด(57,035/6,107) เลย(3,596/207) สกลนคร(22,572/2,507)หนองคาย(4,332/410)หนองบัวลำภู(3,903/429)อุดรธานี(14,545/1,612) เชียงราย(1,005/48) เชียงใหม่(407/26) น่าน(1,834/97) พะเยา(279/16)แพร่(830/89)ลำปาง(3,205/229)ลำพูน(241/39)ตาก(21,471/1,204)นครสวรรค์(1,631/231)พิจิตร(500/50)พิษณุโลก(3,864/147)เพชรบูรณ์(1,750/209)สุโขทัย(2,905/711)อุตรดิตถ์(678/159)อุทัยธานี(283/47)กำแพงเพชร(133/20)กาญจนบุรี(10,147/978)นครปฐม(336/34)ประจวบคีรีขันธ์(4,519/426)เพชรบุรี(5,487/775)ราชบุรี(1,944/85)สุพรรณบุรี(6,534/872)สมุทรสาคร(49/1)สมุทรสงคราม(153/0)ชุมพร(894/115)กระบี่(78/2)สุราษฎร์ธานี(331/59)พัทลุง(283/14)นครศรีธรรมราช(268/9)ยะลา(11/1)สงขลา(356/10)
โคนม	กรุงเทพฯ(3/2) ชัยนาท(38/2) ลพบุรี(254/16) สระบุรี(81/4) ชลบุรี(14/0) สระแก้ว(2,237/150) จันทบุรี(11/7) ชัยภูมิ(172/33) นครราชสีมา(1,426/82) บุรีรัมย์(902/49) ศรีสะเกษ(80/4) สุรินทร์(84/9) ร้อยเอ็ด(981/58) กาฬสินธุ์(17/2) ขอนแก่น(780/182) นครพนม(2/0) มหาสารคาม(293/38) เลย(249/9) สกลนคร(689/55) หนองบัวลำภู(47/3) อุดรธานี(374/51) เชียงราย(729/58) เชียงใหม่(180/45)แพร่(6/0)ลำปาง(107/16)ลำพูน(515/73)พิจิตร(102/1)พิษณุโลก(2/1)เพชรบูรณ์(31/9)สุโขทัย (301/17)กาญจนบุรี(184/20)นครปฐม(95/1)ประจวบคีรีขันธ์(1,018/73)เพชรบุรี(268/35)ราชบุรี(967/48)สุพรรณบุรี(37/10)ชุมพร(11/4)พัทลุง(11/2)สงขลา(1/0)
กระบือ	กรุงเทพฯ (2/2) ชัยนาท(3/0) ปทุมธานี(1/0) ลพบุรี(2/0) สระแก้ว(27/18) ชัยภูมิ(21/6) นครราชสีมา(60/5) บุรีรัมย์(464/85) ศรีสะเกษ(49/6) สุรินทร์(274/93) อำนาจเจริญ(1/5) อุบลราชธานี(250/37) กาฬสินธุ์(88/40) ขอนแก่น(424/109) นครพนม(83/0) บึงกาฬ(17/4) มหาสารคาม(205/96) มุกดาหาร(32/5) ร้อยเอ็ด(981/52) เลย(10/3) สกลนคร(321/54) หนองคาย(44/10) หนองบัวลำภู(46/6) อุดรธานี(61/9) น่าน(2/0) ตาก(11/3) พิษณุโลก(29/1) เพชรบูรณ์(4/0) สุโขทัย (2/0) กาญจนบุรี(1/1) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี(10/0) สุราษฎร์ธานี(1/0)
กระทิง	ประจวบคีรีขันธ์(1/0)

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคแก่ตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรคหรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 206,187 ราย 2) หยอดหรือร่ายยาป้องกันแมลง 37,543 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 225,556 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 170,627 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 130,697 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 427,999 ราย

9.3 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564) พบการระบาด 34 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 12 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสุกร 3 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน รัสเซีย จีน
 - ในหมูป่า 5 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย ฮังการี
 - ในสุกร/หมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
- โรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง 16 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสัตว์ปีก 10 ครั้ง ที่ประเทศอิสราเอล เยอรมนี จีน
 - ในนก 4 ครั้ง ที่ประเทศอาเซอร์ไบจาน อิหร่าน ฝรั่งเศส บัลแกเรีย
 - ในหงส์ขาว 1 ครั้ง ที่ประเทศสโลวาเกีย
 - ในห่าน 1 ครั้ง ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก

- โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 6 ครั้ง แบ่งเป็น

- โรค SARS-COV-2 2 ครั้ง ในเพียงพอน ที่ประเทศโปแลนด์ และในกวาง ที่ประเทศแคนาดา
- โรค Lumpy skin disease 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศรัสเซีย
- โรค ข้อและสมองอักเสบ 1 ครั้ง ในแพะ ที่ประเทศโคลอมเบีย
- โรค Infection bovine rhinotracheitis 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศคาซัคสถาน
- โรค Infection salmon anaemia 1 ครั้ง ในปลาแซลมอน ที่ประเทศไอซ์แลนด์