



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 18 มกราคม 2565 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส และยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส สำหรับลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ขอให้เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 17 ม.ค. 65 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 18 ม.ค. 65



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.บาเจาะ	นราธิวาส	35.0	ฝนตกปานกลาง
2	อ.ป่าแดด	เชียงราย	33.7	ฝนตกปานกลาง
3	อ.พร้าว	เชียงใหม่	32.1	ฝนตกปานกลาง
4	อ.ปัว	น่าน	31.8	ฝนตกปานกลาง
5	อ.เมือง	ลำปาง	12.1	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 65)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 55,998 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 32,068 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (45,663 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) มากกว่าปี 2564 จำนวน 10,335 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 40.54 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 119.35 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 20,073 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 51,800 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 73 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 28,258 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (41,915 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59) มากกว่าปี 2564 จำนวน 9,885 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 35.06 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 103.75 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 19,127 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	13,182	53	6,437	36	75	1,001	783	78	684	76	83	25,825	13,965	54	7,122	38	11,860
ตอน.	12	8,368	6,253	75	4,602	69	218	2,002	1,585	79	1,434	78	230	10,370	7,838	76	6,035	70	2,532
กลาง	3	1,419	1,176	83	1,116	82	22	369	310	84	286	83	25	1,788	1,486	83	1,402	82	303
ตะวันตก	2	26,605	23,639	89	10,362	78	7	140	139	99	130	99	9	26,745	23,778	89	10,491	78	2,967
ตะวันออก	6	1,515	1,086	72	986	70	51	964	812	84	760	83	57	2,479	1,898	77	1,746	75	581
ใต้	4	8,194	6,465	79	4,754	73	39	668	569	85	516	84	43	8,863	7,034	79	5,270	74	1,829
รวม	35	70,926	51,800	73	28,258	60	412	5,144	4,198	82	3,810	80	447	76,071	55,998	74	32,068	62	20,073

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 13,457 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 6,761 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 37) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 6.80 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 40.09 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 11,414 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	7,601	56	3,801	39	3.45	0.00	23.00	23.00	5,861
สิริกิตี	4,287	45	1,437	22	1.33	2.48	7.55	6.99	5,223
ภูมิพล+สิริกิตี	11,888	52	5,238	32	4.78	2.48	30.55	29.99	11,084
แควน้อยฯ	795	85	752	84	0.41	0.01	4.32	4.32	144
ป่าสักชลสิทธิ์	774	81	771	81	1.60	2.26	5.22	5.22	186
รวมทั้งหมด	13,457	54	6,761	37	6.80	4.75	40.09	39.53	11,414

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯสิริกิตี (22%) และอ่างฯแม่กงอุดมธรา (29%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 18 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯกัวลม(81%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (85%) อ่างฯจุฬารามณ์(90%) อ่างฯลำตะคอง(98%) อ่างฯลำพระเพลิง(99%) อ่างฯมูลบน(97%) อ่างฯลำทะขันธ์(98%) อ่างฯลำนางรอง(93%) อ่างฯสิรินธร(83%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์(81%) อ่างฯกระเสียว(100%) อ่างฯศรีนครินทร์(92%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (83%) อ่างฯบางพระ(89%) อ่างฯหนองปลาไหล (94%) อ่างฯประแสร์(89%) อ่างฯแก่งกระจาน(88%) อ่างฯปราณบุรี(85%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสัก แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แม่น้ำโกลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 259 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 255 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.42 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.78 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 85 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 85 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.56 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.60 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.55 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.55 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 84 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 84 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 75 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 5 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 4 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 40 ลบ.ม. (เมื่อวาน 38 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 42 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 42 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลย์) 10 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 19 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 79 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 79 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุททอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุททอง) 3 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 30 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 35 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 11 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 118 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 108 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
	12 ม.ค.65	13 ม.ค.65	14 ม.ค.65	15 ม.ค.65	16 ม.ค.65	17 ม.ค.65	18 ม.ค.65		
ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.24	0.24	0.23	0.23	0.21	0.21	0.20	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
ทำนายนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
ทำนักรวมชลประทานสามเสน กทม.	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 18 ม.ค. 65	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.35	-10.45
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	3.82	-12.18
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.04	-11.16
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	0.92	-11.08
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.58	-10.92
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	1.97	-12.53

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dhw.go.th


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 (วันที่ 1 พ.ย.64 ถึง 30 เม.ย.65) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 37,857 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ จำนวน 22,280 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 8,987 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันนี้ใช้น้ำไป 40.09 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 2,265 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 (1 พ.ย.64 - 30 เม.ย.65)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	2,535	7,442	11,785	518	22,280	8,987	40
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	2,000	2,415	135	5,700	2,265	40



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65

ทั่วประเทศ จำนวน 11.65 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 9.02 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.63 ล้านไร่
ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 4.98 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.26 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.72 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565)

ทั่วประเทศ จำนวน 6.81 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 5.80 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.01 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.45 ของแผน
ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 4.37 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.04 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.33 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.75 ของแผน

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2564/65			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2564/65					
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวรอบที่ 2	%ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวมทั้งหมด	%รวมทั้งหมด
ทั่วประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	6.41	0.54	6.95	4.65	72.54	0.36	66.67	5.01	72.09
	นอกเขตชลประทาน	2.61	2.09	4.70	1.15	44.06	0.65	31.10	1.80	38.30
	รวม	9.02	2.63	11.65	5.80	64.30	1.01	38.40	6.81	58.45
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	2.81	0.06	2.87	3.25	115.66	0.07	116.67	3.32	115.68
	นอกเขตชลประทาน	1.45	0.66	2.11	0.79	54.48	0.26	39.39	1.05	49.76
	รวม	4.26	0.72	4.98	4.04	94.84	0.33	45.83	4.37	87.75

5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จำนวน 2 ชุด ณ สนามบินนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างกักเก็บน้ำ รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

6. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- **เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่** เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2564 จำนวน 2,140 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีนาปรัง พืชไร่ อุบลโกบรีโกบ และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 110 เครื่อง แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 1 เครื่อง ในพื้นที่ 1 จังหวัด
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 78 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 31 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด

- **เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ** รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

7. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 65)

7.1 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 3 พ.ย.64 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง สตูล พัทลุง สงขลา ตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 66,907 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 94,493 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 13,975 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 8,934 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 71,584 ไร่ สำรวจความเสียหายแล้ว เกษตรกร 3,031 ราย พื้นที่เสียหาย 12,737 ไร่ คิดเป็นเงิน 29.70 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 389 ราย พื้นที่ 547 ไร่ วงเงิน 1.85 ล้านบาท**

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ระนอง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง และจังหวัดนราธิวาส เกษตรกร 2,278 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6,353 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 2,294 ไร่ บ่อกุ้ง 4,058 ไร่ กระชัง 2,028 ตร.ม. สำรวจความเสียหายแล้ว เกษตรกร 748 พื้นที่เสียหาย 768 ไร่ กระชัง 1,552 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 4.51 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 192 ราย พื้นที่ 141 ไร่ กระชัง 1,221 ตร.ม. วงเงิน 1.22 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง เกษตรกร 26,100 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 1,774,055 ตัว แบ่งเป็น โค 69,224 ตัว กระบือ 1,054 ตัว สุกร 76,170 ตัว แพะ/แกะ 7,834 ตัว สัตว์ปีก 1,619,773 ตัว แปลงหญ้า 7,989 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

7.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 1 ก.ย.64 - ปัจจุบัน

ด้านพืช พบความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่านแพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สระแก้ว สุพรรณบุรี เพชรบุรี ระนอง และจังหวัดยะลา เกษตรกร 325,957 ราย พื้นที่ 3,336,432 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,297,196 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,018,323 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 20,913 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,179.18 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 7,095 ราย พื้นที่ 39,066 ไร่ วงเงิน 65.44 ล้านบาท**

ด้านประมง พบความเสียหาย 45 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยาแพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ตราด นครปฐม สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว อ่างทอง นครนายก และจังหวัดระนอง เกษตรกร 23,043 ราย พื้นที่ 40,836 ไร่ กระชัง 24,534 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 293.23 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 4,831 ราย พื้นที่ 4,405 ไร่ กระชัง 7,895 ตร.ม. วงเงิน 26.83 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ชัยภูมิ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร 2,160 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 130,315 ตัว แปลงหญ้า 346 ไร่ คิดเป็นเงิน 13.67 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 601 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 36,518 ตัว แปลงหญ้า 91 ไร่ วงเงิน 6.70 ล้านบาท**

7.3 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค.64 – 31 ส.ค.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ นครราชสีมา สระบุรี และจังหวัด ฉะเชิงเทรา เกษตรกร 10,416 ราย พื้นที่ 165,374 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 112,955 ไร่ พืชไร่ 52,419 ไร่ คิดเป็นเงิน 180.44 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 4,402 ราย พื้นที่ 54,063 ไร่ วงเงิน 56.53 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

8. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ม.ค. 65)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. หนอนห่อใบข้าว 3. หนอนกระทู้กล้า 4. แมลงบัว 5. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงราย นครสวรรค์ ชัยนาท และฉะเชิงเทรา) จำนวน 122 ไร่ การระบาดลดลง 698 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร และ สงขลา) จำนวน 60 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 35 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (พิษณุโลก) จำนวน 25 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครสวรรค์ ชัยนาท และ ฉะเชิงเทรา) จำนวน 540 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 110 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 10 ไร่ การระบาดลดลง 790 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตรายการสื่อราไตรโคเดอร์มาและชีวเวเรีย รมรงค์ให้ใช้ ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึง แนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ และสารเคมีอย่างถูกต้อง - แนะนำวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะนำ ให้เกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิต
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด 4. หนอนกินใบมะพร้าว 5. ดั้วงวง 6. โรสซีชา	พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด (ศรีสะเกษ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ภูเก็ต สตูล สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,067 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 378 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 9,763 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 86 ไร่ พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,132 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,436 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 100 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พังงา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,263 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 27 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสงขลา) จำนวน 565 ไร่ การระบาดลดลง 497 ไร่	- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย ไปเผาทิ้ง นอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม การระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัว เต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไร เซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรด ในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - โรสซีชามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ในช่วงผลมะพร้าว ทำให้การพ่นสารฆ่าไร่ไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้น การป้องกันกำจัดให้นั้นพ่นสารฆ่าไร่ในระยะมะพร้าว ติดจันจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสซีชามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตาม คำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 851 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 162 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กระบี่ และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 40 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 216 ไร่	- ใช้กำดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาโรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักด้ และระยะตัวหนอน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ 3. โรคใบร่วงยางพารา	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ นราธิวาส ภูเก็ต และสงขลา) จำนวน 75 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,001,885 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 206,743 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ระยอง กระบี่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 16,417 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5,691 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพาราที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราแก่เกษตรกรรับรู้อย่างต่อเนื่อง - คำนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไป ทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่น โดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกคูทุกปี - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพารา
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู 3. เพลี้ยหอย 4. โรคโรแดงมันสำปะหลัง 5. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ตาก นครสวรรค์ สกลนคร จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 189 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 73 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 40 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 87 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และลพบุรี) จำนวน 1,028 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1,031 ไร่	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แผลงช่วงปักใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาโรเซียมควบคุมโดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกกลลงในพื้นดิน และให้หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรแนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - โรคโคนเน่าหัวเน่า แนะนำเกษตรกรกับเศษเหง้า หรือเศษซากมันสำปะหลังเผาทำลายทิ้ง ทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตร ควรมีการเฝ้าติดตามอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แห่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเมทาแลกซิล
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตาก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ จันทบุรี สงขลา และสตูล) จำนวน 1,340 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 23 ไร่	- ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด - รมรณรงค์ให้มีการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) หากพบการระบาดระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีควบคุมการระบาดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว 2. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตรัง) จำนวน 63 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 11 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รมรณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มา และชุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรค - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจและทำความสะอาดแปลงอย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชข้างเคียง เพื่อทำลายพืชอาศัย และหากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งระยะรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ฉีดพ่นเป็นวงรีคมีรอบๆ บริเวณที่พบเพลี้ยแป้ง และต้องหยุดพ่นในช่วงที่สับปะรดติดผลอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้มีพิษตกค้าง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 535 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 35 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 275 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 18 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ชุมพร ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,755 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 611 ไร่	- <u>เพลี้ยแป้ง</u> ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - <u>เพลี้ยไฟ</u> หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - <u>เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน</u> ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง เฉพาะต้น - <u>โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน</u> แจกเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
เงาะ	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินช่อดอก	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 2 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และราชบุรี) จำนวน 4 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่	- <u>เพลี้ยไฟ</u> สำรวจการเข้าทำลายอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวและฝนทิ้งช่วง โดยการสุมเคาะช่อดอกบนกระดาดแข็งสีขาว หากพบเพลี้ยไฟ 2 - 3 ตัวต่อช่อ ควรทำการป้องกันกำจัดโดยพ่นสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดในระยะตั้งแต่แทงช่อดอก ถึงติดผลอ่อนอย่างน้อย 1 - 2 ครั้ง - <u>หนอนช่อดอก</u> สำรวจการเข้าทำลายอย่างสม่ำเสมอ โดยหากบริเวณโคนต้นเงาะโล่งเตียนไม่มีหญ้ารก ให้เขย่ากิ่งเงาะ ตัวหนอนจะทิ้งตัวลงที่พื้นแล้วจับไปทำลาย หากระบาดรุนแรงพ่นสารฆ่าแมลง
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 113 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้
ลำไย	1. โรคพุ่มไม่กาว 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรคราดำ 4. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 289 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 61 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 327 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 11 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 28 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่	- แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบไปเผาทำลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - โรคพุ่มไม่กาว เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ ถอนวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ - โรคราดำ พ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรค และทำลายแหล่งอาศัยของแมลงปากดูดที่มาขับถ่ายน้ำหวาน เนื่องจากเชื้อราเจริญบนสารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้ จึงควรพ่นสารกำจัดแมลง - มวนลำไย ตัดแต่งกิ่ง ไม่ให้ทรงพุ่มหนาทึบ เพื่อทำลายที่หลบซ่อนและที่พักอาศัยของตัวเต็มวัย หากพบการระบาดจับตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และไข่มาทำลาย ใช้ศัตรูธรรมชาติ ฉีดพ่นก่อนลำไยออกดอก

9. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

9.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 65)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 16 มกราคม 2565 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 30 จังหวัด 141 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 13 จุด ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ นครราชสีมา และ อุบลราชธานี ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

9.2 โรคล้มปัสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 65)

พบการระบาดของสสตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 17 ม.ค. 65 รวม 68 จังหวัด 877 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 605,104 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 20,339 ตัว สัตว์ตายสะสม 61,376 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคเนื้อ	กรุงเทพฯ (102/6) นนทบุรี (4/0) ชัยนาท(2,467/519) ปทุมธานี(304/9) อุทัยธานี(180/23) ลพบุรี(1,330/186) สระบุรี(465/45) สิงห์บุรี(121/18) อ่างทอง(545/104) ฉะเชิงเทรา(512/51) ชลบุรี(275/18) ปราจีนบุรี(172/21) สมุทรปราการ(4/0) สระแก้ว(7,946/798) จันทบุรี(29/10) ตราด (75/4) นครนายก (2/0) ชัยภูมิ(6,663/1,041) นครราชสีมา(50,293/2,664) บุรีรัมย์(62,566/5,420) ยโสธร(9,508/686) ศรีสะเกษ(31,838/1,316) สุรินทร์(52,433/5,579) อำนาจเจริญ(11,631/1,903) อุบลราชธานี(43,017/5,939) กาฬสินธุ์(24,153/2,468) ขอนแก่น(31,998/3,961) นครพนม (8,486/709) บึงกาฬ(2,231/326) มหาสารคาม(35,403/6,607) มุกดาหาร(25,305/859) ร้อยเอ็ด(57,035/6,143) เลย(3,595/207) สกลนคร (22,576/2,508)หนองคาย(4,332/410)หนองบัวลำภู(3,903/429)อุดรธานี(14,645/1,612) เชียงราย(1,005/48) เชียงใหม่(407/26) น่าน (1,834/97) พะเยา(279/16)แพร่(830/90)ลำปาง(3,205/229)ลำพูน(242/39)ตาก(21,473/1,207) นครสวรรค์(1,631/231) พิจิตร(500/50) พิษณุโลก(3,864/147) เพชรบูรณ์(1,752/210) สุโขทัย(2,905/711) อุตรดิตถ์(678/159) อุทัยธานี(289/47) กำแพงเพชร(133/20) กาญจนบุรี (10,147/978) นครปฐม(336/34) ประจวบคีรีขันธ์(4,519/425) เพชรบุรี(5,487/779) ราชบุรี(1,944/85) สุพรรณบุรี(6,538/876) สมุทรสาคร (49/1)สมุทรสงคราม(153/0)ชุมพร(903/117)กระบี่(108/2)สุราษฎร์ธานี(382/71)พัทลุง(292/14)นครศรีธรรมราช(403/15)ยะลา(11/1)สงขลา (356/10)
โคนม	กรุงเทพฯ(3/2) ชัยนาท(36/2) ลพบุรี(249/16) สระบุรี(81/4) ชลบุรี(14/0) สระแก้ว(2,237/150) จันทบุรี(11/7) ชัยภูมิ(172/33) นครราชสีมา (1,426/82) บุรีรัมย์(902/49) ศรีสะเกษ(80/4) สุรินทร์(84/9) กาฬสินธุ์(17/2) ขอนแก่น(780/182) นครพนม(2/0) มหาสารคาม(293/38) เลย(249/9) สกลนคร(689/55) หนองบัวลำภู(47/3) อุดรธานี(374/51) เชียงราย(729/58) เชียงใหม่(180/45)แพร่(6/0)ลำปาง(107/16)ลำพูน (515/73) พิจิตร(102/1) พิษณุโลก(2/1) เพชรบูรณ์(31/9) สุโขทัย (301/17) กาญจนบุรี(184/20) นครปฐม(95/1) ประจวบคีรีขันธ์(1,018/73) เพชรบุรี (268/35) ราชบุรี(967/48) สุพรรณบุรี(37/10) ชุมพร(11/4) พัทลุง(17/2) สงขลา(1/0)
กระบือ	กรุงเทพฯ (2/2) ชัยนาท(3/0) ปทุมธานี(1/0) ลพบุรี(2/0) สระแก้ว(27/20) ชัยภูมิ(21/6) นครราชสีมา(60/5) บุรีรัมย์(464/85) ศรีสะเกษ(49/6) สุรินทร์ (274/93) อำนาจเจริญ(1/5) อุบลราชธานี(251/37) กาฬสินธุ์(88/40) ขอนแก่น(424/109) นครพนม(83/0) บึงกาฬ(17/4) มหาสารคาม(205/95) มุกดาหาร (32/5) ร้อยเอ็ด(981/58) เลย(10/3) สกลนคร(321/54) หนองคาย(44/10) หนองบัวลำภู(46/6) อุดรธานี(61/9) น่าน(2/0) ตาก(11/3) พิษณุโลก(29/1) เพชรบูรณ์(4/0) สุโขทัย (2/0) กาญจนบุรี(1/1) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี(11/0) สุราษฎร์ธานี(1/0)
กระทิง	ประจวบคีรีขันธ์(1/0)

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเบื้องต้นอย่างเพียงพอเพื่อเฝ้าระวังโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรคหรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 206,191 ราย 2) หยอดหรือรอตยาป้องกันแมลง 37,547 ราย 3) พันยากำจัดแมลง 225,572 ราย 4) พันยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 170,643 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 130,795 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 428,099 ราย

9.3 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2564) พบการระบาด 4 ครั้ง ดังนี้

- โรคคหิวแอฟริกาในสุกร 1 ครั้ง ที่สาธารณรัฐมอลโดวา
- โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง 3 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในนก 2 ครั้ง ที่ประเทศโปรตุเกส บัลแกเรีย
 - ในหงส์ 1 ครั้ง ที่ประเทศสโลวีเกีย