



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 3 มกราคม 2565 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส และยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง โดยอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าฝั่ง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 2 ม.ค. 65 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 3 ม.ค. 65



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.หาดใหญ่	สงขลา	51.4	ฝนตกหนัก
2	อ.เมือง	สงขลา	29.2	ฝนตกปานกลาง
3	อ.เมือง	พัทลุง	28.6	ฝนตกปานกลาง
4	อ.เมือง	ตรัง	12.0	ฝนตกปานกลาง
5	อ.เกาะลันตา	กระบี่	1.6	ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 65)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 57,461 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 33,529 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (46,893 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62) มากกว่าปี 2564 จำนวน 10,568 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 47.43 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 94.13 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 18,616 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 53,064 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 29,522 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (42,948 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61) มากกว่าปี 2564 จำนวน 10,116 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 37.21 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 81.11 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,869 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	13,688	55	6,943	38	75	1,001	809	81	709	79	83	25,825	14,497	56	7,651	40	11,328
ตอน.	12	8,368	6,578	79	4,927	73	218	2,002	1,666	83	1,515	82	230	10,370	8,244	79	6,442	75	2,133
กลาง	3	1,419	1,275	90	1,215	89	22	369	330	89	305	89	25	1,788	1,605	90	1,520	89	184
ตะวันตก	2	26,605	23,812	90	10,535	79	7	140	142	101	133	101	9	26,745	23,954	90	10,667	79	2,792
ตะวันออก	6	1,515	1,189	78	1,089	77	51	964	877	91	825	90	57	2,479	2,066	83	1,914	82	413
ใต้	4	8,194	6,523	80	4,813	74	39	668	573	86	520	84	43	8,863	7,096	80	5,333	75	1,767
รวม	35	70,926	53,064	75	29,522	62	412	5,144	4,397	85	4,007	84	447	76,071	57,461	76	33,529	64	18,616

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 13,995 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 7,299 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 3.39 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 34.02 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 10,876 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	7,930	59	4,130	43	0.00	0.00	25.00	25.00	5,532
สิริกิติ์	4,371	46	1,521	23	2.93	2.84	7.50	7.42	5,139
ภูมิพล+สิริกิติ์	12,301	54	5,651	35	2.93	2.84	32.50	32.42	10,671
แควน้อยฯ	853	91	810	90	0.46	0.02	3.02	3.02	86
ป่าสักชลสิทธิ์	841	88	838	88	0.00	0.00	3.50	5.20	119
รวมทั้งหมด	13,995	56	7,299	40	3.39	2.86	39.02	40.64	10,876

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯสิริกิติ์ (23%) และอ่างฯแม่กวงอุดมธารา (29%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 24 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯกiewลม(89%) อ่างฯกiewคอกหมา(83%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (91%) อ่างฯแม่มอก(90%) อ่างฯจุฬาภรณ์(94%) อ่างฯอุบลรัตน์(84%) อ่างฯลำตะคอง(102%) อ่างฯลำพระเพลิง(99%) อ่างฯมูลบน(99%) อ่างฯลำแชะ(100%) อ่างฯลำนางรอง(95%) อ่างฯสิรินธร(86%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์(88%) อ่างฯทับเสลา(84%) อ่างฯกระเสียว(100%) อ่างฯศรีนครินทร์(92%) อ่างฯวชิราลงกรณ์(84%) อ่างฯขุนด่านปราการชล(86%) อ่างฯบางพระ(92%) อ่างฯหนองปลาไหล (100%) อ่างฯประแสร์(94%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา(83%) อ่างฯแก่งกระจาน(89%) อ่างฯปราณบุรี(88%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิ้ง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 367 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 359 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.32 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.88 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 85 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 85 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.43 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.25 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.55 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.55 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 105 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 105 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 95 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 5 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 5 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 55 ลบ.ม. (เมื่อวาน 41 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 46 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 37 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 10 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 21 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 81 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทง) 4 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 35 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 30 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 11 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 129 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 126 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		28 ธ.ค.64	29 ธ.ค.64	30 ธ.ค.64	31 ธ.ค.64	1 ม.ค.65	2 ม.ค.65	3 ม.ค.65		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกม.ปทุม จ.นนทบุรี	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกม.ชลประทานสามเสน กทม.	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 3 ม.ค. 65	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.78	-11.02
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.11	-11.89
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.26	-10.94
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.13	-10.87
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.60	-10.90
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.07	-12.43

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 (วันที่ 1 พ.ย.64 ถึง 30 เม.ย.65) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 37,857 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ จำนวน 22,280 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 7,351 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ใช้น้ำไปแล้ว 34.02 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 1,729 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 (1 พ.ย.64 - 30 เม.ย.65)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	2,535	7,442	11,785	518	22,280	7,351	33
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	2,000	2,415	135	5,700	1,729	30



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65

ทั่วประเทศ จำนวน 11.65 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 9.02 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.63 ล้านไร่
ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 4.98 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.26 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.72 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65 (ข้อมูล ณ 22 ธันวาคม 2564)

ทั่วประเทศ จำนวน 4.01 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3.51 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.50 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.42 ของแผน
ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 2.69 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2.50 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.19 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.02 ของแผน

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2564/65			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2564/65					
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวรอบที่ 2	%ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวมทั้งหมด	%รวม
ทั่วประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	6.41	0.54	6.95	3.00	46.80	0.18	33.33	3.18	45.76
	นอกเขตชลประทาน	2.61	2.09	4.70	0.51	19.54	0.32	15.31	0.83	17.66
	รวม	9.02	2.63	11.65	3.51	38.91	0.50	19.01	4.01	34.42
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	2.81	0.06	2.87	2.07	73.67	0.06	100.00	2.13	74.22
	นอกเขตชลประทาน	1.45	0.66	2.11	0.43	29.66	0.13	19.70	0.56	26.54
	รวม	4.26	0.72	4.98	2.50	58.69	0.19	26.39	2.69	54.02

5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จำนวน 2 ชุด ณ สนามบินนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างกักเก็บน้ำ รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

6. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2564 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีนาปรัง พืชไร่ อนุภาคบริโภค และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 195 เครื่อง แบ่งเป็น

- o ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 109 เครื่อง ในพื้นที่ 18 จังหวัด
- o ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 86 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

7. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64)

7.1 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 3 พ.ย.64 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล พัทลุง สงขลา ตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 61,442 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 80,619 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 13,884 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 8,672 ไร่ ไม้ผลไม้น้ำมันและอื่นๆ 58,062 ไร่ สำรวจความเสียหายแล้ว เกษตรกร 2,425 ราย พื้นที่เสียหาย 9,345 ไร่ คิดเป็นเงิน 21.55 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 80 ราย พื้นที่ 184 ไร่ วงเงิน 0.40 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ระนอง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง และจังหวัดนราธิวาส เกษตรกร 2,512 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6,437 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 2,330 ไร่ บ่อกุ้ง 4,108 ไร่ กระชัง 3,194 ตร.ม. สำรวจความเสียหายแล้ว เกษตรกร 162 พื้นที่เสียหาย 232 ไร่ กระชัง 1,286 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 1.61 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง เกษตรกร 26,100 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 1,774,055 ตัว แบ่งเป็น โค 69,224 ตัว กระบือ 1,054 ตัว สุกร 76,170 ตัว แพะ/แกะ 7,834 ตัว สัตว์ปีก 1,619,773 ตัว แผลงหญ้า 7,989 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

7.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 1 ก.ย.64 - ปัจจุบัน

ด้านพืช พบความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สระแก้ว สุพรรณบุรี เพชรบุรี ระนอง และจังหวัดยะลา เกษตรกร 325,876 ราย พื้นที่ 3,336,279 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,296,983 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,018,380 ไร่ ไม้ผล ไม้น้ำมัน และอื่นๆ 20,916 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,179.98 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 5,604 ราย พื้นที่ 27,512 ไร่ วงเงิน 48.77 ล้านบาท

ด้านประมง พบความเสียหาย 45 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยา แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ตราด นครปฐม สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว อ่างทอง นครนายก และจังหวัดระนอง เกษตรกร 22,596 ราย พื้นที่ 39,660 ไร่ กระชัง 24,182 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 285.59 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 4,752 ราย พื้นที่ 4,174 ไร่ กระชัง 7,720 ตร.ม. วงเงิน 24.68 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ชัยภูมิ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร 1,762 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 106,345 ตัว แผลงหญ้า 308 ไร่ คิดเป็นเงิน 11.91 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 573 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 35,151 ตัว แผลงหญ้า 7 ไร่ วงเงิน 6.54 ล้านบาท

7.3 วาดภัย ช่วงภัยวันที่ 8 – 30 ก.ย.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย กาญจนบุรี จันทบุรี เพชรบุรี หนองบัวลำภู และจังหวัดพังงา เกษตรกร 518 ราย พื้นที่ 838 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 42.75 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 425 ไร่ ไม้ผลไม้น้ำมัน และอื่นๆ 370 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.40 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 453 ราย พื้นที่ 700 ไร่ วงเงิน 1.85 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.4 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค. – 24 ส.ค.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี อุดรดิตถ์ เลย จันทบุรี ระยอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร 1,482 ราย พื้นที่ 7,968 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,564 ไร่ พืชไร่ 5,236 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 168 ไร่ คิดเป็นเงิน 9.15 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านประมง พบความเสียหาย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก พิษณุโลก เลย สระบุรี สมุทรปราการ และจังหวัดตรัง เกษตรกร 896 ราย พื้นที่ บ่อปลา 2,022 ไร่ วงเงิน 8.55 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 789 ราย พื้นที่ 1,670 ไร่ วงเงิน 7.06 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา เกษตรกร 29 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 744 ตัว คิดเป็นเงิน 18,600 บาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

7.5 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค.64 – 31 ส.ค.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุดรดิตถ์ นครราชสีมา สระบุรี และจังหวัด ฉะเชิงเทรา เกษตรกร 10,416 ราย พื้นที่ 165,374 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 112,955 ไร่ พืชไร่ 52,419 ไร่ คิดเป็นเงิน 180.44 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,535 ราย พื้นที่ 40,176 ไร่ วงเงิน 40.59 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

8. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 64)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนห่อใบข้าว 2. โรคไหม้ข้าว 3. เพลี้ยไฟ 4. แมลงหาล่า 5. แมลงบัว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 15 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 3 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครปฐม) จำนวน 85 ไร่ การระบาดลดลง 55 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครศรีธรรมราช สงขลา) จำนวน 13 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครสวรรค์) จำนวน 8 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตรายายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและชีวเวอเรีย รมรวงศ์ให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ และสารเคมีอย่างถูกต้อง - แนะนำวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะนำให้เกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตและลดปริมาณแหล่งที่อยู่อาศัยของ โรค แมลง ศัตรูพืช ในนาข้าว
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (ขอนแก่น ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ภูเก็ต สตูล สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,797 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 656 ไร่ พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 10,820 ไร่ การระบาดลดลง 426 ไร่	- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. ดั้วแรด 4. หนอนกินใบมะพร้าว 5. ดั้วงวง 6. ไรสีขา	พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,208 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 11 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 100 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,247 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสงขลา) จำนวน 1,125 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 15 ไร่	- ไรสีขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในช่วงผลมะพร้าว ทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้น การป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าว ติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร สงขลา และสตูล) จำนวน 344 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 501 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กระบี่ และสตูล) จำนวน 166 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 164 ไร่	- ใช้กำดักไฟโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับดั้วแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไธเลียส (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดดั้วแรดในระยะดักแด้ และระยะ ตัวหนอน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิด โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรคราขาว 2. โรคใบร่วงยางพารา ชนิดใหม่ 3. โรคใบร่วงยางพารา	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ภูเก็ต สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 95 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 795,142 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 327,306 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ปัตตานี ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 3,147 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1,016 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรคราขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพาราที่ ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราแก่เกษตรกรรับรู้ อย่างต่อเนื่อง - คำนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคราขาว โดยการขุด คูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนานาคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้าง ละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไป ทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่น โดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกทุกปี - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่น บริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรคราขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพารา
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. โรคไรแดง มันสำปะหลัง 3. เพลี้ยหอย 4. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตาก สกลนคร อำนาจเจริญ ชัยนาท จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 160 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 1 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 80 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 40 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 40 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และลพบุรี) จำนวน 2,059 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2,500 ไร่	- รมนรค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แผลงข้างปีกใส่ และ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและ ดักแด้แมลงหนอนหว่ง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไธเลียสควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน และให้หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของ โรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			- โรคราโคนเน่าหัวเน่า แนะนำเกษตรกรเก็บเศษหญ้า หรือเศษซากมันสำปะหลังเผาทำลายทิ้ง ทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตร ควรมีการไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แยกท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเมทาแลกซิล
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ตาก ลำพูน จันทบุรี และสงขลา) จำนวน 441 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 188 ไร่	- ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด - รมรงศ์ให้มีการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ หากพบการระบาดระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีควบคุมการระบาดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว 2. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตราด) จำนวน 34 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 11 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รมรงศ์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มา และซุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรค - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจและทำความสะอาดแปลงอย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชข้างเคียง เพื่อทำลายพืชอาศัย และหากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งระยะรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร เช่น ไทอะมีโทแซม ๒๕% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๒ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน ๑๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๒๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรืออะเซทาไมพริด ๒๐% เอสพี อัตรา ๑๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นเป็นวงรีรอบๆ บริเวณที่พบเพลี้ยแป้ง และต้องหยุดพ่นในช่วงที่สับปะรดติดผลอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้มีพืชตกค้าง
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และตราด) จำนวน 174 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 85 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 205 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 3,628 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 16 ไร่	- <u>เพลี้ยแป้ง</u> ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - <u>เพลี้ยไฟ</u> หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - <u>เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน</u> ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง เฉพาะต้น - <u>โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน</u> แจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 97 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง
ลำไย	1. โรคราไหม้กาวด 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรคราดำ 4. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 277 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 44 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 328 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 19 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบไปเผาทำลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			- โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ ถอนวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ - โรคราดำ ฟันน้ำเปล่าลำคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อ กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรค และทำลายแหล่งอาศัยของแมลงปากดูดที่มาขับถ่ายน้ำหวาน เนื่องจากเชื้อราเจริญบนสารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้ จึงควรพ่นสารกำจัดแมลง - มวนลำไย ตัดแต่งกิ่ง ไม่ให้ทรงพุ่มหนาทึบ เพื่อทำลายที่หลบซ่อนและที่พักอาศัยของตัวเต็มวัย หากพบการระบาดจับตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และไข่มาทำลาย ใช้ศัตรูธรรมชาติ ฉีดพ่นก่อนลำไยออกดอก

9. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

9.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 64)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 29 ธันวาคม 2564 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 30 จังหวัด 141 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 7 จุด ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี และสงขลา ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

9.2 โรคล้มปัสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 64)

พบการระบาดของสัตว์ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 29 ธ.ค. 64 รวม 68 จังหวัด 861 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 604,340 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 23,623 ตัว สัตว์ตายสะสม 60,760 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคเนื้อ	กรุงเทพฯ (102/6) นนทบุรี (4/0) ชัยนาท(2,454/511) ปทุมธานี(304/9) อุทัยธานี(180/23) ลพบุรี(1,311/181) สระบุรี(465/45) สิงห์บุรี(121/18) อ่างทอง(545/104) ฉะเชิงเทรา(503/51) ชลบุรี(275/18) ปราจีนบุรี(175/24) สมุทรปราการ(4/0) สระแก้ว(7,948/744) จันทบุรี(29/10) ตราด (75/4) นครนายก (2/0) ชัยภูมิ(6,663/1,041) นครราชสีมา(50,293/2,664) บุรีรัมย์(62,566/5,419) ยโสธร(9,508/686) ศรีสะเกษ(31,838/1,316) สุรินทร์(52,433/5,579) อำนาจเจริญ(11,631/1,859) อุบลราชธานี(42,901/5,837) กาฬสินธุ์(24,153/2,465) ขอนแก่น(31,974/3,943) นครพนม (8,486/709) บึงกาฬ(2,231/326) มหาสารคาม(35,403/6,553) มุกดาหาร(25,305/859) ร้อยเอ็ด(57,035/6,107) เลย(3,596/207) สกลนคร (22,572/2,507)หนองคาย(4,332/410) หนองบัวลำภู(3,903/429) อุดรธานี(14,545/1,612) เชียงราย(1,005/48) เชียงใหม่(407/26) น่าน (1,834/97) พะเยา(279/16)แพร่(830/89) ลำปาง(3,205/229) ลำพูน(241/39) ตาก(21,471/1,204) นครสวรรค์(1,631/231) พิจิตร(500/50) พิษณุโลก(3,864/147) เพชรบูรณ์(1,750/209) สุโขทัย(2,905/711) อุตรดิตถ์(678/159) อุทัยธานี(283/47) กำแพงเพชร(133/20) กาญจนบุรี (10,147/978) นครปฐม(336/34) ประจวบคีรีขันธ์(4,519/426) เพชรบุรี(5,487/775) ราชบุรี(1,944/85) สุพรรณบุรี(6,534/872) สมุทรสาคร (49/1) สมุทรสงคราม(153/0) ชุมพร(894/115) กระบี่(78/2) สุราษฎร์ธานี(331/59) พัทลุง(283/14) นครศรีธรรมราช(268/9) ยะลา(11/1) สงขลา (356/10)
โคนม	กรุงเทพฯ(3/2) ชัยนาท(38/2) ลพบุรี(254/16) สระบุรี(81/4) ชลบุรี(14/0) สระแก้ว(2,237/150) จันทบุรี(11/7) ชัยภูมิ(172/33) นครราชสีมา (1,426/82) บุรีรัมย์(902/49) ศรีสะเกษ(80/4) สุรินทร์(84/9) ร้อยเอ็ด(981/58) กาฬสินธุ์(17/2) ขอนแก่น(780/182) นครพนม(2/0) มหาสารคาม (293/38) เลย(249/9) สกลนคร(689/55) หนองบัวลำภู(47/3) อุดรธานี(374/51) เชียงราย(729/58) เชียงใหม่(180/45)แพร่(6/0) ลำปาง(107/16) ลำพูน(515/73) พิจิตร(102/1) พิษณุโลก(2/1) เพชรบูรณ์(31/9) สุโขทัย (301/17) กาญจนบุรี(184/20) นครปฐม(95/1) ประจวบคีรีขันธ์(1,018/73) เพชรบุรี(268/35) ราชบุรี(967/48) สุพรรณบุรี(37/10) ชุมพร(11/4) พัทลุง(11/2) สงขลา(1/0)
กระบือ	กรุงเทพฯ (2/2) ชัยนาท(3/0) ปทุมธานี(1/0) ลพบุรี(2/0) สระแก้ว(27/18) ชัยภูมิ(21/6) นครราชสีมา(60/5) บุรีรัมย์(464/85) ศรีสะเกษ(49/6) สุรินทร์ (274/93) อำนาจเจริญ(1/5) อุบลราชธานี(250/37) กาฬสินธุ์(88/40) ขอนแก่น(424/109) นครพนม(83/0) บึงกาฬ(17/4) มหาสารคาม(205/96) มุกดาหาร (32/5) ร้อยเอ็ด(981/52) เลย(10/3) สกลนคร(321/54) หนองคาย(44/10) หนองบัวลำภู(46/6) อุดรธานี(61/9) น่าน(2/0) ตาก(11/3) พิษณุโลก(29/1) เพชรบูรณ์(4/0) สุโขทัย (2/0) กาญจนบุรี(1/1) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี(10/0) สุราษฎร์ธานี(1/0)
กระต๊อ	ประจวบคีรีขันธ์(1/0)

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจรอยโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรคหรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 206,150 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 37,478 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 225,479 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 170,559 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 129,590 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 426,557 ราย

9.3 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564) พบการระบาด 34 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 12 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสุกร 3 ครั้ง ที่ประเทศยูเครน รัสเซีย จีน
 - ในหมูป่า 5 ครั้ง ที่ประเทศลัตเวีย ฮังการี
 - ในสุกร/หมูป่า 4 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
- โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง 16 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสัตว์ปีก 10 ครั้ง ที่ประเทศอิสราเอล เยอรมนี จีน
 - ในนก 4 ครั้ง ที่ประเทศอาเซอร์ไบจาน อิหร่าน ฝรั่งเศส บัลแกเรีย
 - ในหงส์ขาว 1 ครั้ง ที่ประเทศสโลวาเกีย
 - ในห่าน 1 ครั้ง ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก
- โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 6 ครั้ง แบ่งเป็น
 - โรค SARS-COV-2 2 ครั้ง ในเพียงพอน ที่ประเทศโปแลนด์ และในกวาง ที่ประเทศแคนาดา
 - โรค Lumpy skin disease 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศรัสเซีย
 - โรค ข้อและสมองอักเสบ 1 ครั้ง ในแพะ ที่ประเทศโคลอมเบีย
 - โรค Infection bovine rhinotracheitis 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศคาซัคสถาน
 - โรค Infection salmon anaemia 1 ครั้ง ในปลาแซลมอน ที่ประเทศไอซ์แลนด์