



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำเหนือเกาะสุมาตรา ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ อ่าวไทย และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้

สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 7 พ.ย. 65 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 8 พ.ย. 65



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	ชุมพร	42.0	ฝนตกหนัก
2	อ.เหนือคลอง	กระบี่	24.6	ฝนตกปานกลาง
3	อ.กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	21.3	ฝนตกปานกลาง
4	อ.เมือง	ระยอง	16.4	ฝนตกปานกลาง
5	อ.ตะกั่วป่า	พังงา	13.2	ฝนตกปานกลาง

ไม่มีฝน (0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกหนักมาก (>90 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำท่วม อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง (ช่วงภัยเดือน ส.ค. 65 - ปัจจุบัน)

เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาวตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง และพายุดีเปรสชัน “โนรู” ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ประกอบกับฝนที่ตกสะสมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย (ณ วันที่ 8 พ.ย.65) รวมทั้งสิ้น 65 จังหวัด ดังนี้ (1) **จังหวัดที่เข้าสู่ภาวะปกติ 47 จังหวัด** ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ลำพูน ลำปาง ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เลย ชัยภูมิ หนองคาย นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก สระบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี กรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต สตูล ตรัง นราธิวาส สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา และ (2) **จังหวัดที่ประสบอุทกภัย 18 จังหวัด** ได้แก่ จังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร หนองบัวลำภู ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยาอ่างทอง นครปฐม สุพรรณบุรี และจังหวัดยะลา

ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 65)

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 60 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร หนองคาย หนองบัวลำภู ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ตราด ปราจีนบุรี ปทุมธานี นครนายก นครปฐม กาญจนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร ภูเก็ต ตรัง สตูล และจังหวัดสงขลา เกษตรกรได้รับผลกระทบ 648,932 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 5,503,289 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,605,917 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,809,053 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 88,319 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 350,598 ราย พื้นที่ 3,152,944 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,104,199 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,031,493 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 17,252 ไร่ คิดเป็นเงิน 4,931.82 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,949 ราย พื้นที่ 6,748 ไร่ วงเงิน 12.40 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 50 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พะเยา ลำปาง ลำพูน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ หนองคาย มหาสารคาม กรุงเทพมหานคร ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก นครปฐม ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองราชบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ตรัง และจังหวัดสตูล เกษตรกรได้รับผลกระทบ 32,320 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 44,505 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 39,454 ไร่ บ่อกุ้ง 5,051 ไร่ กระชัง 74,151 ตรม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 5,009 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย 6,531 ไร่ กระชัง 608 ตรม. คิดเป็นเงิน 33.07 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 498 ราย พื้นที่ 530 ไร่ กระชัง 180 ตรม.วงเงิน 3.19 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย บุรีรัมย์ ยโสธร หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง กาญจนบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี นครนายก นนทบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร 90,432 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 8,595,491 ตัว แบ่งเป็น โค 235,270 ตัว กระบือ 58,098 ตัว สุกร 60,422 ตัว แพะ/แกะ 29,147 ตัว สัตว์ปีก 8,212,554 ตัว แปลงหญ้า 4,870 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

การให้ความช่วยเหลือ

1. **กรมชลประทาน** ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 542 เครื่อง ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 535 เครื่อง และเครื่องจักรอื่นๆ 57 เครื่อง
2. **กรมปศุสัตว์** ดำเนินการอพยพสัตว์ 2,334,410 ตัว แจกจ่ายหญ้าพระราชทาน 1,518.84 ตัน อาหาร TMR 6.50 ตัน ชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 40,974 ชุด รักษาสัตว์ 5,774 ตัว และสนับสนุนถุงยังชีพสัตว์ 4,346 ชุด
3. **กรมประมง** สนับสนุนเรือตรวจการ 78 ลำ รถยนต์ 75 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ 412 นาย
4. **กรมพัฒนาที่ดิน** สนับสนุนสารเร่งซูเปอร์ พด.6 จำนวน 204,916 ลิตร
5. **กรมส่งเสริมการเกษตร** สนับสนุนหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1,290 ขวด เชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 2,550 กิโลกรัม นำไปใช้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56,313 ไร่

3. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 65)

3.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 64,056 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 40,116 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (59,247 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 78) มากกว่าปี 2564 จำนวน 4,809 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 105.72 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 128.52 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,650 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 59,257 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 35,720 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (54,519 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) มากกว่าปี 2564 จำนวน 4,738 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 82.71 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 101.84 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,039 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	20,748	84	14,003	77	80	1,082	954	88	869	88	88	25,907	21,702	84	14,872	78	4,234
ตอน.	12	8,368	8,007	96	6,357	95	226	2,061	1,865	91	1,697	90	238	10,429	9,872	95	8,054	94	877
กลาง	3	1,419	1,416	100	1,356	100	27	419	378	90	354	90	30	1,838	1,794	98	1,710	98	48
ตะวันตก	2	26,605	22,220	84	8,943	67	8	164	167	102	156	102	10	26,769	22,387	84	9,098	67	4,382
ตะวันออก	6	1,515	1,464	97	1,370	96	52	1,006	1,008	100	951	100	58	2,520	2,472	98	2,321	98	63
ใต้	4	8,194	5,402	66	3,691	57	42	679	427	63	369	59	46	8,874	5,829	66	4,060	57	3,045
รวม	35	70,926	59,257	84	35,720	75	435	5,410	4,799	89	4,396	88	470	76,336	64,056	84	40,116	77	12,650

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 20,807 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 14,111 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 26.28 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 19.93 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 4,082 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	12,042	89	8,242	85	13.78	13.46	4.00	4.00	1,420
สิริกิตี	6,848	72	3,998	60	7.52	7.69	8.99	9.15	2,662
ภูมิพล+สิริกิตี	18,890	82	12,240	75	21.30	21.15	12.99	13.15	4,082
แควน้อยฯ	952	101	909	101	1.71	1.71	2.59	2.59	-
ป่าสักชลสิทธิ์	965	101	962	101	3.27	3.27	4.35	4.35	-
รวมทั้งหมด	20,807	84	14,111	78	26.28	26.13	19.93	20.09	4,082

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 27 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (89%) อ่างฯ แม่งัดสมบูรณ์ชล (102%) อ่างฯ แม่กกงอุดมธรา (93%) อ่างฯ กี่วลม (95%) อ่างฯ กี่วคหมา (106%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (101%) อ่างฯ แม่มอก (100%) อ่างฯ ห้วยหลวง (93%) อ่างฯ จุฬารักษ์ (90%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (112%) อ่างฯ ลำปาว (91%) อ่างฯ ลำตะคอง (109%) อ่างฯ ลำพระเพลิง (89%) อ่างฯ มูลบ่น (96%) อ่างฯ ลำแซะ (94%) อ่างฯ ลำน้ำร่ง (100%) อ่างฯ สิรินคร (89%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (101%) อ่างฯ ทับเสลา (100%) อ่างฯ กระเสียว (97%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (90%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (99%) อ่างฯ คลองสิียด (91%) อ่างฯ บางพระ (96%) อ่างฯ หนองปลาไหล (109%) อ่างฯ ประแสร์ (92%) และ อ่างฯ นฤปดินทรจินดา (100%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำบางปะกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำท่วม

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,283 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,356 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +21.06 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 4.64 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,128 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,195 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +17.06 ม.รทก. (เมื่อวาน +17.16 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +11.36 ม.รทก. (เมื่อวาน +11.65 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 221 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 223 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 190 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 31 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 28 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 29 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 102 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 103 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 15 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 50 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 148 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 150 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) รวม 35 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 30 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 40 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 43 ลบ.ม./วินาที

อบางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,098 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,076 ลบ.ม./วินาที)

3.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		2 พ.ย. 65	3 พ.ย. 65	4 พ.ย. 65	5 พ.ย. 65	6 พ.ย. 65	7 พ.ย. 65	8 พ.ย. 65		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	ปกติ	ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

3.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 8 พ.ย. 65	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.13	-10.67
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	5.93	-10.07
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	3.46	-8.74
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	2.77	-9.23
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	2.81	-9.69
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	5.10	-9.40

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 สิงหาคม 2565 และได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยจัดเตรียมเครื่องบินสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 ชุด ณ สนามบินนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ และเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างกักเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อย รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- **เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่** เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบโศก-บริโศก พิษไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565 จำนวน 2,079 เครื่อง ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ จำนวน 409 เครื่อง โดยแบ่งแยกดังนี้

1. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพิษไร่ จำนวน 87 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด
2. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 15 เครื่อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด
3. ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 34 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด
4. ช่วยเหลืออุทกภัย จำนวน 273 เครื่อง ในพื้นที่ 16 จังหวัด

- **เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ** รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

6. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 65)

6.1 วาดภัย ช่วงภัย ม.ค. 65 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 31 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ลำปาง ลำพูน น่าน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พะเยา พิจิตร แพร่ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี สระแก้ว สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา สตูล นราธิวาส นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 20,799 ราย พื้นที่ 30,029 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,619 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 22,194 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 6,216 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 3,722 ราย พื้นที่ 8,702 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่และพืชผัก 6,365 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 2,337 ไร่ คิดเป็นเงิน 22.06 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 2,857 ราย (คิดเป็นร้อยละ 76.76 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 6,401 ไร่ วงเงิน 17.10 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 77.52 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6.2 อุทกภัย ช่วงภัย พ.ค. 65 – 31 ก.ค. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ สระบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 17,266 ราย พื้นที่ 173,899 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 133,419 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 40,274 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 206 ไร่ คิดเป็นเงิน 259.36 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,583 ราย (คิดเป็นร้อยละ 20.75 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 26,290 ไร่ วงเงิน 37.66 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 14.52 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 2,126 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2,364 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 2,354 ไร่ บ่อกุ้ง 10 ไร่ กระชัง 563 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 11.34 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 738 ราย (คิดเป็นร้อยละ 34.71 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 658 ไร่ กระชัง 563 ตร.ม. วงเงิน 3.36 ล้านบาท (คิดเป็นเงิน 29.63 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6.3 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย มิ.ย. – 15 ก.ค. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกร 326 ราย พื้นที่ (พืชไร่และพืชผัก) 4,203 ไร่ คิดเป็นเงิน 8.32 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 27 ราย (คิดเป็นร้อยละ 8.28 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 320 ไร่ วงเงิน 0.63 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.57 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค. 65)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 3. หอยเชอรี่ 4. โรคไหม้ข้าว 5. โรคขอบใบแห้งข้าว 6. โรคใบขีดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ขอนแก่น และ นครราชสีมา) จำนวน 1,045 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน และนครราชสีมา) จำนวน 1,148 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และสตูล) จำนวน 630 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 349 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (น่าน ลำพูน ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอุบลราชธานี) จำนวน 310 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 28 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (เชียงราย พิจิตร พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี และราชบุรี) จำนวน 150 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 576 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สกลนคร และจันทบุรี) จำนวน 65 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 73 ไร่	- ผลิตขยาย แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และชีวเวเรีย รณรงค์ให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ และสารเคมีอย่างถูกต้อง - แนะนำวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดโรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะนำให้เกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิต - แนะนำเกษตรกรในการป้องกันกำจัดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยวิธีการกำจัดพืชอาศัย และแนะนำเกษตรกรลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน หรือยูเรีย เพื่อลดการซ้อนทับกันของใบข้าวทำให้เกิดเป็นที่พักอาศัยของโรคและแมลง แนะนำเกษตรกรให้ควบคุมระดับน้ำในนาได้หลังปักดำหรือหว่าน จนถึงระยะตั้งท้องควบคุมน้ำในแปลงนาให้พอดีเนเปียก แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้ง - แนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวต้านทานโรคเพื่อป้องกันการเกิดโรคไหม้ข้าว และโรคขอบใบแห้งข้าว - แนะนำให้เกษตรกรกำจัดหอยและกลุ่มไข่จากฤดูกาลที่แล้ว และป้องกันหอยใหม่ที่เข้ามา และปักไม้ไผ่ตามข้างคันนา เพื่อล่อให้หอยมาไข่แล้วเก็บไปทำลาย หากพบการระบาดรุนแรง แนะนำให้เกษตรกรใช้กากเมล็ดข้าวในนาข้าว - แนะนำเกษตรกรป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดหลังขาว ที่พบการระบาดในพื้นที่โดยวิธีการไถนํ้าออกจากแปลงนา และควบคุมน้ำในแปลงนาให้พอดีเนเปียก หรือมีน้ำแฉะผิวดินนาน 7-10 วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป - สนับสนุนเชื้อราเมตาไรเซียมพร้อมแนะนำวิธีการผลิตขยายแก่เกษตรกร แนะนำเกษตรกรในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร - โรคใบขีดสีน้ำตาล วิธีการป้องกันกำจัดโดยใช้ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุโพแทสเซียมสูงสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ ใช้ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ถ้าพบโรคระบาดของโรครุนแรง ให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเช่น คาร์เบนดาซิม (Carbendazim) ตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด 4. ดั้วงวง 5. โรสสีขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวาท ระยอง สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุงภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,427 ไร่ การระบาดลดลง 98 ไร่ พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (เลย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวาท ระยอง สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,852 ไร่ การระบาดลดลง 91 ไร่ พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวาท ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,157 ไร่ การระบาดลดลง 54 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวาท สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม กระบี่ พังงา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,151 ไร่ การระบาดลดลง 32 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรวาท นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสงขลา) รวมจำนวน 734 ไร่ การระบาดลดลง 16 ไร่	- รมรงคให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำและหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลงและเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมหนอนของแมลงดำหนามมะพร้าวในพื้นที่ - ใช้กำดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - โรสสีขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในขั้วผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. ดั้วงูหลาบ 3. หนอนปลอกเล็ก 4. โรคลำต้นเน่า 5. โรคทะลายเน่า	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,400 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 21 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 105 ไร่ การการระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ระยอง กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,339 ไร่ การระบาดลดลง 41 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,707 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (นครสวรรค์ อุบลราชธานี จันทบุรี ตรวาท ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) รวมจำนวน 95 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่	- ใช้กำดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - รมรงคให้เกษตรกรตัดทะลายที่เป็นโรคทะลายเน่าของปาล์มน้ำมันออกไปเผาทำลายนอกแปลง - พ่นด้วงงูหลาบด้วยสารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน (Sevin) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7 - 10 วัน ในตอนเย็นก่อนค่ำ
ยางพารา	1. โรคกลากขาว 2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตรวาท กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 168 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (จันทบุรี ตรวาท กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 583,742 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6,070 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรคกลากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพาราให้เกษตรกรรับรู้อย่างต่อเนื่อง - คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคกลากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกัน ข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกคูทุกปี

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคหน้ำยางแห้ง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (นครสวรรค์ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา สงขลา และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,183 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (มุกดาหาร จันทบุรี ระยอง และ ชุมพร) จำนวน 65 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	- ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผิดพัน บริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพารา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ และทำร่องบริเวณโคนต้นยางพาราให้ ร่องขวางกับลำต้น เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามลงสู่ราก ของยางพารา และเพื่อลดการเกิดโรคหน้ำยางแห้ง
กาแฟ	1.โรคราสนิม 2.โรคใบจุดตากบ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 73 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และระยอง) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่าสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งสะสมของโรค
มันสำปะหลัง	1.เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2.เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลังสีชมพู 3. เพลี้ยหอย 4.ไรแดงมันสำปะหลัง 5. โรคพุ่มแจ้ 6. โรคโคนเน่าหัวเน่า 7. โรคโคนเน่าหัวเน่า จากอุทกภัย 8. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี และ ระยอง) จำนวน 53 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครราชสีมา) จำนวน 3 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร และระยอง) จำนวน 14 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (อุทัยธานี ขอนแก่น นครราชสีมา สกลนคร อุบลราชธานี และชลบุรี) จำนวน 144 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ขอนแก่น จันทบุรี และ ระยอง) จำนวน 75 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และ มุกดาหาร) จำนวน 47 ไร่ การระบาดลดลง 30,329 ไร่ พื้นที่ระบาด 30 จังหวัด (กำแพงเพชร เชียงราย ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี อุดรดิตถ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทองเจริญ อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี ระยอง สระแก้ว และสุพรรณบุรี) จำนวน 314,924 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 314,924 ไร่ พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด (กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 108,473 ไร่ การระบาดลดลง 1,114 ไร่	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แผลงข้างปีกใส และ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง ในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียม ควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุก ลงในพื้นดิน และให้หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและ เกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผล ต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทาง เฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพุ่มแจ้ และแนะนำเกษตรกร ให้สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ในพื้นที่ที่พบการระบาด ให้ชุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคหรือจากต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ที่ไม่แสดงอาการของโรค
อ้อย	1. โรคเส้ด้า 2. โรคใบขาวอ้อย	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (อุทัยธานี และลพบุรี) จำนวน 406 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เพชรบุรี) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำให้เกษตรกรถอนต้นที่เป็นโรคเส้ด้าและนำไป ทำลายนอกแปลง และไถทำลายอ้อยตอที่เป็นโรครุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งของเชื้อแพร่ระบาดต่อไป - แนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ และหากเจอต้นที่เป็นโรคให้นำไปทำลายนอกแปลงปลูก
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ ระบาด 7 จังหวัด (เชียงใหม่ นครราชสีมา หนองบัวลำภู จันทบุรี ยะลา สงขลา และสตูล) จำนวน 120 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. โรคราน้ำค้าง	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (พิจิตร เพชรบูรณ์ และ อุทัยธานี) จำนวน 465 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- แนะนำการควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ หากพบการระบาดรุนแรงควรพ่นสารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร - แนะนำเกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทาน และคลุมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช และถอนต้นที่แสดงอาการของโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก รวมทั้งแนะนำการปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน
สับปะรด	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด คือ (ระยอง) จำนวน 4 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และ ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 37 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รมรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มา และชุบน้ำพ่นด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรค - เพลี้ยแป้ง แนะนำเกษตรกรสำรวจแปลงปลูกสับปะรดอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการระบาดให้ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดเฉพาะจุดที่พบเพลี้ยแป้ง และรัศมีโดยรอบ - โรคผลเน่า ในแปลงที่พบโรคแนะนำให้เกษตรกรเก็บผลที่เป็นโรคออกจากแปลง โรยด้วยปูนขาว และรมด้วยสารกำจัดเชื้อราให้ผลเกิดบาดแผล
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. โรคราเน่าโคนเน่า 5. โรคใบดิดหรือใบไหม้	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และชุมพร) จำนวน 221 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 57 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (พิษณุโลก จันทบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 64 ไร่ <u>การระบาดลดลง 13 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 600 ไร่ <u>การระบาดลดลง 37 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 3,984 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 34 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 722 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 91 ไร่</u>	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลงเฉพาะต้น - โรคราเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคใบดิดหรือใบไหม้ หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่น นำไปทำลายนอกแปลงปลูก ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อรับแสงแดดได้ทั่วถึง โดยเฉพาะใบที่อยู่ด้านล่าง และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อลดความชื้นสะสมใต้ทรงพุ่ม ลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง ในพื้นที่ปลูกที่มีความชื้นสูงและมีการระบาดของโรคเป็นประจำ เพื่อลดการแตกใบไหม้
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคราแป้ง 3. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 1 ไร่ <u>การระบาดลดลง 12 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และนราธิวาส) จำนวน 1 ไร่ <u>การระบาดลดลง 22 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 85 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- เพลี้ยแป้ง ตัดแต่งกิ่งเงาะเพื่อลดปริมาณมด จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเคี้ยว ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้งที่อาศัยอยู่ในดินไต่ขึ้นมาบนต้นเงาะ - โรคราแป้ง แนะนำเกษตรกรหากพบการระบาดไม่มากนักควรเก็บผลเงาะที่เป็นโรคมานำทำลาย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และในช่วงแตกใบอ่อนและเริ่มติดผลหมั่นตรวจดูว่าพบราแป้งเข้าทำลายใบอ่อนหรือไม่ - โรคใบจุดสาหร่าย แนะนำเกษตรกร ตัดส่วนที่พบโรคเก็บรวบรวมใบที่เป็นโรคและร่วงหล่นอยู่ในบริเวณสวนไปเผาทำลาย ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อลดความชื้นภายในทรงพุ่ม เมื่อพบใบแก่ถูกทำลายมากกว่าร้อยละ 30 ต่อต้น แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และชุมพร) จำนวน 459 ไร่ <u>การระบาดลดลง 11 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 158 ไร่ <u>การระบาดลดลง 5 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 516 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลาใกล้คืน - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนขอนใบอย่างสม่ำเสมอ โดยให้สังเกตดูที่ใต้ใบมังคุดจะพบรอยทางยาวเป็นเส้นสีขาว

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. มวนลำไย 3. โรคพุ่มไม้กวาด 4. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และระยอง) จำนวน 79 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 14 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และระยอง) จำนวน 226 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา อุบลราชธานี จันทบุรี และระยอง) จำนวน 905 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่	- หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบไปเผาทำลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง - มวนลำไย ตัดแต่งกิ่ง ไม่ให้ทรงพุ่มหนาทึบ เพื่อทำลายที่หลบซ่อนและที่พักอาศัยของตัวเต็มวัย หากพบการระบาดจับตัวอ่อน ตัวเต็มวัยและไข่ มาทำลาย แล้วใช้ศัตรูธรรมชาติฉีดพ่นก่อนลำไยออกดอก - โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะถอนวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ - โรคราดำ พ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรค

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย. 65)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 6 พฤศจิกายน 2565 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 10 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 15 จุด ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ชลบุรี สมุทรปราการ นครนายก สมุทรสงคราม กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และสงขลา ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค ในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

8.2 โรคล้มปัสกีน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย. 65)

พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 6 พฤศจิกายน 2565 รวม 70 จังหวัด 899 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 632,213 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 19,503 ตัว สัตว์ตายสะสม 67,128 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจรอยโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 207,320 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 38,467 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 228,002 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 175,180 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 137,235 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 442,762 ราย