



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 3 มีนาคม 2566 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ


1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรง

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่เกิดขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เว้นแต่ภาคเหนือที่ยังมีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 2 มี.ค. 66 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 3 มี.ค. 66



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	นครศรีธรรมราช	20.4	ฝนตกปานกลาง
2	อ.ถลุง	ภูเก็ต	5.6	ฝนตกเล็กน้อย
3	อ.สบ้าย้อย	สงขลา	1.0	ฝนตกเล็กน้อย
4	อ.ฉวาง	นครศรีธรรมราช	0.7	ฝนตกเล็กน้อย
5	อ.กรงปินัง	ยะลา	0.5	ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 66)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 53,116 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 29,176 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (51,539 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68) มากกว่าปี 2565 จำนวน 1,577 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 25.45 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 168.86 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 23,221 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 49,366 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 25,829 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (47,718 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67) มากกว่าปี 2565 จำนวน 1,649 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 18.07 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 144.88 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 21,560 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	16,697	67	9,953	55	80	1,083	777	72	687	69	88	25,908	17,474	67	10,639	56	8,433
ตอน.	12	8,368	5,172	62	3,522	52	226	2,061	1,382	67	1,214	64	238	10,429	6,554	63	4,736	55	3,875
กลาง	3	1,419	882	62	822	61	27	419	251	60	226	58	30	1,838	1,133	62	1,049	60	704
ตะวันตก	2	26,605	20,195	76	6,918	52	8	164	133	81	122	80	10	26,769	20,328	76	7,040	53	6,440
ตะวันออก	6	1,515	914	60	819	58	52	1,006	696	69	640	67	58	2,520	1,610	64	1,459	62	911
ใต้	4	8,194	5,505	67	3,795	59	42	679	511	75	457	73	46	8,874	6,016	68	4,252	60	2,857
รวม	35	70,926	49,366	70	25,829	55	435	5,411	3,750	69	3,347	67	470	76,337	53,116	70	29,176	56	23,221

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 16,489 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 9,793 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 5.96 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 63.81 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 8,382 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	9,982	74	6,182	64	2.80	2.81	33.00	33.00	3,480
สิริกิตี	5,451	57	2,601	39	3.16	3.13	20.00	20.00	4,059
ภูมิพล+สิริกิตี	15,433	67	8,783	54	5.96	5.94	53.00	53.00	7,539
แควน้อยฯ	549	58	506	56	0.00	0.88	4.32	4.32	390
ป่าสักชลสิทธิ์	507	53	504	53	0.00	0.00	6.49	6.49	453
รวมทั้งหมด	16,489	66	9,793	54	5.96	6.82	63.81	63.81	8,382

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 8 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ แม่จัดสมบูรณ์ชล (90%) อ่างฯ กัวคองมา (93%) อ่างฯ ลำตะคอง (88%) อ่างฯ มูลบน (84%) อ่างฯ ลำน้ำรอง (81%) อ่างฯ กระเสี้ยว (93%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (84%) และ อ่างฯ บางกลาง (89%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิธิ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 408 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 413 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.07 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.63 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.22 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.23 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.41 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.41 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝิ่งตะวันออก รวม 144 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 143 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 110 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 26 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 8 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 26 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 21 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 79 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 76 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 16 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 36 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝิ่งตะวันตก รวม 169 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 170 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลอง มะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 18 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสี้ยว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสี้ยว) 7 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 60 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 70 ลบ.ม./วินาที และคลอง เล็กอื่น ๆ 14 ลบ.ม./วินาที

อบางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 214 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 174 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		25 ก.พ. 66	26 ก.พ. 66	27 ก.พ. 66	28 ก.พ. 66	1 มี.ค. 66	2 มี.ค. 66	3 มี.ค. 66		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มน้ำ จ.นนทบุรี	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.24	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.23	0.25	0.24	0.24	0.25	0.27	0.25	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 3 มี.ค. 66	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.62	-11.18
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.76	-11.24
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.71	-10.49
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.49	-10.51
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.72	-10.78
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.07	-12.43

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2565/66

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 (วันที่ 1 พ.ย.65 ถึง 30 เม.ย.66) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 43,740 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ จำนวน 27,685 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 16,323 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แคว้นน้อยฯ ป่าสักฯ) วันนี้ใช้น้ำไป 63.81 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 5,637 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 (1 พ.ย.65 - 30 เม.ย.66)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	2,535	8,270	16,330	550	27,685	16,323	59
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	2,020	5,795	135	9,100	5,637	65



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66

ทั้งประเทศ จำนวน 16.30 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 13.55 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.75 ล้านไร่

กลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 9.23 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.51 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.72 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566)

ทั้งประเทศ จำนวน 13.22 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.69 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.53 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.10 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 0.97 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 10.72 ล้านไร่)

กลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 8.24 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.80 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.44 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 0.58 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 7.22 ล้านไร่)

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2565/66			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2565/66						ข้าวรอบที่ 2	
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวรอบที่ 2	%ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวมทั้งหมด	%รวมทั้งหมด	พื้นที่เก็บเกี่ยว	พื้นที่รอเก็บเกี่ยว
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	10.42	0.64	11.06	9.28	89.06	0.57	89.06	9.85	89.06	0.78	8.50
	นอกเขตชลประทาน	3.13	2.11	5.24	2.41	77.00	0.96	45.50	3.37	64.31	0.19	2.22
	รวม	13.55	2.75	16.30	11.69	86.27	1.53	55.64	13.22	81.10	0.97	10.72
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	6.64	0.10	6.74	6.25	94.13	0.13	130.00	6.38	94.66	0.43	5.82
	นอกเขตชลประทาน	1.87	0.62	2.49	1.55	82.89	0.31	50.00	1.86	74.70	0.15	1.40
	รวม	8.51	0.72	9.23	7.80	91.66	0.44	61.11	8.24	89.27	0.58	7.22

พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน รวม 37 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 0.78 ล้านไร่ ได้แก่

- ในเขตชลประทาน 29 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.67 ล้านไร่ ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิษณุโลกแพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ชัยนาท อ่างทอง จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี

- นอกเขตชลประทาน 14 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.11 ล้านไร่ ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม สุรินทร์ หนองคาย อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท สระแก้ว และสุพรรณบุรี

5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลกแพร่ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ และจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างกักเก็บน้ำ รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 2 มีนาคม 2566)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร(1) ตาก(3) ลำปาง(1) น่าน(2) สุโขทัย(1) อุตรดิตถ์(9) เชียงใหม่(1)
กลาง	กรุงเทพมหานคร(1) กาญจนบุรี(1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม(1)
ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา(1) ตราด(2) ระยอง(1)
ใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	13 จังหวัด (25 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ที่ 2 มีนาคม 2566

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยระดับปฏิบัติการมีค่าต่ำกว่า 60% ประกอบกับอากาศมีเสถียรภาพ ส่งผลให้เมฆไม่ก่อตัวในพื้นที่เป้าหมาย
2. พิษณุโลก	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากไม่มีกลุ่มเมฆเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการ
3. แพร่	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ระดับปฏิบัติการมีค่าต่ำกว่า 60% ประกอบกับอากาศมีเสถียรภาพ ส่งผลให้เมฆมีความชื้นในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
4. นครสวรรค์	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ที่ระดับปฏิบัติการมีค่าต่ำกว่า 60% ประกอบกับลักษณะอากาศมีเสถียรภาพ ส่งผลให้เมฆมีความชื้นในพื้นที่เป้าหมายไม่ก่อตัว
5. อุตรดิตถ์	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์มีค่าต่ำกว่า 60% และอากาศมีเสถียรภาพส่งผลให้เมฆมีความชื้นในพื้นที่เป้าหมายไม่ก่อตัว
6. จันทบุรี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศมีลักษณะทรงตัว ส่งผลให้เมฆมีความชื้นไม่พัฒนาตัวในพื้นที่เป้าหมาย
รวม	0	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (15 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566)

ตั้งแต่เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 2 มีนาคม 2566 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ จำนวน 1 วัน ขึ้นปฏิบัติการ จำนวน 1 เที่ยวบิน (2:35 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 0 ตัน พลุสารพัดความชื้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 0 นัด พลุสารพัดความชื้นแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน 0 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 28 นัด จังหวัดที่มีรายงานการช่วยเหลือบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บสำเร็จรวม – จังหวัด

6. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบล-บุรี โขก พิษณุ และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/2566 จำนวน 2,188 เครื่อง ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ จำนวน 136 เครื่อง โดยแบ่งแยกดังนี้

1. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 87 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด
2. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 15 เครื่อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด
3. ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 34 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนบรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

7. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 66)

7.1 วาดภัย ช่วงภัย 4 ก.พ. 66 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เกษตรกร 1,543 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3,105 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่และพืชผัก 2,761 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 344 ไร่ สรรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 16 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ(พืชไร่และพืชผัก) 28 ไร่ คิดเป็นเงิน 54,450 บาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.2 อุทกภัย (ภาคใต้) ช่วงภัย 1 ธ.ค. 65 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ตรัง ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 10,391 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 82,195 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 26,119 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 8,234 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 47,842 ไร่ สรรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 1,583 ราย พื้นที่ 6,820 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4,569 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,739 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 512 ไร่ คิดเป็นเงิน 11.64 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 531 ราย (คิดเป็นร้อยละ 33.54 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 1,879 ไร่ วงเงิน 3.25 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 27.93 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ตรัง สุราษฎร์ธานี ปัตตานี สตูล กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร 7,728 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 19,220 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 13,216 ไร่ บ่อกุ้ง 6,005 ไร่ กระชัง 23,743 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 7,706 ราย พื้นที่ 19,221 ไร่ กระชัง 22,440 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 140.89 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 398 ราย (คิดเป็นร้อยละ 5.16 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 215 ไร่ กระชัง 861 ตร.ม. วงเงิน 1.61 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ปัตตานี พัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 65,279 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 5,946,269 ตัว แบ่งเป็น โค 146,129 ตัว กระบือ 3,119 ตัว สุกร 103,573 ตัว แพะ/แกะ 40,726 ตัว สัตว์ปีก 5,652,722 ตัว แปลงหญ้า 2,999 ไร่ **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 660 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 24,000 ตัว แปลงหญ้า 21 ไร่ คิดเป็นเงิน 9.93 ล้านบาท

7.3 อุทกภัย ช่วงภัย ส.ค. - 23 พ.ย. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 65 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร หนองคาย หนองบัวลำภู ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชัยนาท เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ตราด ปราจีนบุรี ปทุมธานี นครนายก นครปฐม กาญจนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ภูเก็ต ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สตูล สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 463,134 ราย พื้นที่ 4,147,759 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,770,252 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,343,928 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 33,579 ไร่ คิดเป็นเงิน 6,509.06 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 185,477 ราย (คิดเป็นร้อยละ 40.05 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 1,582,712 ไร่ วงเงิน 2,495.83 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 38.34 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พะเยา ลำปาง ลำพูน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก นครปฐม ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ราชบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 26,977 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย 44,785 ไร่ กระชัง 36,964 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 302.81 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 6,752 ราย (คิดเป็นร้อยละ 25.03 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 12,087 ไร่ กระชัง 12,811 ตร.ม. วงเงิน 52.67 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 17.39 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ตาก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง เกษตรกร 3,576 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 394,853 ตัว แปลงหญ้า 1,537 ไร่ คิดเป็นเงิน 19.61 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 449 ราย (คิดเป็นร้อยละ 12.56 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) สัตว์ตาย/สูญหาย 200,470 ตัว แปลงหญ้า 178 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.59 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 13.21 ของวงเงินช่วยเหลือ)

7.4 อุทกภัย ช่วงภัย พ.ค. - 31 ก.ค. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ สระบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 21,164 ราย พื้นที่ 271,038 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 229,422 ไร่ พืชไร่ และพืชผัก 41,299 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 317 ไร่ คิดเป็นเงิน 390.48 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 7,730 ราย (คิดเป็นร้อยละ 36.52 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 60,700 ไร่ วงเงิน 88.72 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 22.72 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 1,489 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,509 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 1,500 ไร่ บ่อกุ้ง 10 ไร่ กระชัง 563 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 7.324 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.5 มาตรการ ช่วงภัย ม.ค. – 17 ธ.ค. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ลำปาง ลำพูน น่าน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พะเยา พิจิตรแพร่ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครราชสีมา ปทุมธานี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ตรารด จันทบุรี สระแก้ว สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา สตูล นราธิวาส นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 3,831 ราย พื้นที่ 8,8342 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่และพืชผัก 6,426 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 2,417 ไร่ คิดเป็นเงิน 22.51 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 3,183 ราย (คิดเป็นร้อยละ 83.09 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 6,946 ไร่ วงเงิน 18.37 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 81.61 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

8. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 66)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. แมลงสิง 2. หอยเชอรี่ 3. โรคไหม้ข้าว 4. โรคขอบใบแห้งข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลา และนราธิวาส) จำนวน 48 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 48 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ปัตตานี) จำนวน 10 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ลำพูน อุบลราชธานี และปราจีนบุรี) จำนวน 479 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงราย พิชญโลก และพระนครศรีอยุธยา) จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่	- ผลิตขยาย แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และชีวเวเรีย รมรวงให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์และสารเคมีอย่างถูกต้อง - แนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวต้านทานโรคเพื่อป้องกันการเกิดโรคไหม้ข้าว และโรคขอบใบแห้งข้าว - แนะนำให้เกษตรกรกำจัดหอยและกลุ่มไข่จากฤดูกาลที่แล้ว และป้องกันหอยใหม่ที่จะเข้ามา และปักไม้ไผ่ตามข้างคันนา เพื่อล่อให้หอยมาไข่แล้วเก็บไปทำลาย - สนับสนุนเชื้อราเมตาไรเซียมพร้อมแนะนำวิธีการผลิตขยายแก่เกษตรกร หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมี - แมลงสิง ให้หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชในนาข้าว คันนาและรอบ ๆ แปลง ใช้สวิงโฉบจับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในนาข้าวที่พบระบาดและนำมาทำลาย ตัวเต็มวัยชอบกินเนื้อเน่า นำเนื้อเน่าแขวนไว้ตามนาข้าว และจับมาทำลาย หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวต่อเนื่องเพื่อลดการแพร่ขยายพันธุ์ ใช้สารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อีซี) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อแมลงสิงมากกว่า 4 ตัวต่อตารางเมตร ในระยะข้าวเป็นนํ้านม
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนกินใบมะพร้าว 3. แมลงดำหนาม 4. ดั้วงวง	พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรารด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,318 ไร่ การระบาดลดลง 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ระยอง นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 261 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (บุรีรัมย์ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรารด ระยอง สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,702 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 33 ไร่ พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรารด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,101 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรวงให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมหนอนของแมลงดำหนามมะพร้าวในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - โรสี้ชาจะเข้าทำลายอยู่ภายในช่วงผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสี้ชา มะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	5. ดั้วแรด 6. โรสี้ขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,429 ไร่ การระบาดลดลง 41 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 508 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	
ปาล์ม น้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. ดั้วกู่หลาย 3. หนอนปลอกเล็ก 4. โรคลำต้นเน่า 5. โรคทะลายเน่า 6. โรคใบจุด 7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,166 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 40 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 269 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (นครราชสีมา ระยอง ฉะเชิงเทรา กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,258 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,762 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (นครสวรรค์ ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 138 ไร่ การระบาดลดลง 14 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 312 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร และตรัง) จำนวน 125 ไร่ การระบาดคงที่	- ใช้กำดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรด ในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิด โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - รมรวงศ์ให้เกษตรกรตัดทะลายที่เป็นโรคทะลายเน่า ของปาล์มน้ำมันออกไปเผาทำลายนอกแปลง - พ่นดักกู่หลายด้วยสารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน (Sevin) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 20% EC อัตรา 40 มิลลิเมตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7-10 วัน ในตอนเย็น - แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลง ตัดแต่งใบ ที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - สำรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของ โรคใบจุดสาหร่ายในช่วงฤดูฝน โดยสำรวจสัปดาห์ ละครั้ง ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค นำไปเผาทำลายทั้ง นอกแปลงเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ของสปอร์ไปยัง ต้นอื่นๆ หากพบการระบาดรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมี ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วงยางพารา 3. โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 170 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ปัตตานี พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,185 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (น่าน กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,318,012 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรคยางพารา ให้เกษตรกรรับรู้อย่างต่อเนื่อง - แนะนำวิธีป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนานาคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลาง ระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผิดพันบริเวณที่เกิดโรค - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรวงศ์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ และทำร่องบริเวณโคนต้นยางพาราให้ร่อง ขวางกับลำต้น เพื่อป้องกันไม่ให้โรคคลุกคลายลงสู่ราก
กาแฟ	1. โรคราสนิม 2. โรคใบจุดตากบ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 73 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และระยอง) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งสะสมของโรค
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลังสีชมพู	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (มุกดาหาร สกลนคร จันทบุรี ชลบุรี และระยอง) จำนวน 418 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 14 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรวงศ์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แผลงข้างปีกใส และ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. เพลี้ยหอย 4. ไรแดงมันสำปะหลัง 5. ไรฝุ่นแจ้ 6. ไรใบต่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (น่าน กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร ชลบุรี และระยอง) จำนวน 18 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 635 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 301 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (มุกดาหาร สกลนคร อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) จำนวน 234 ไร่ การระบาดลดลง 56 ไร่ พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (กำแพงเพชร อุทัยธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยนาท จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี) จำนวน 75,573 ไร่ การระบาดลดลง 125 ไร่	- สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพุ่มแจ้ และแนะนำเกษตรกรให้สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ในพื้นที่ที่พบการระบาดให้ชุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคหรือต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่แสดงอาการของโรค - อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวเต่า Stethorus spp. ตัวปิกสัน และไรตัวห้ำ หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน หากเริ่มพบการเข้าทำลายของไรแดงควรเก็บทิ้งหรือทำลาย เพื่อลดการเพิ่มปริมาณของไรแดง ในสภาพที่เหมาะสมอาจเกิดการระบาดขึ้นอย่างรวดเร็ว พ่นสารฆ่าแมลง เช่น อามีตราซ (amitraz) 20% EC พ่นเฉพาะบริเวณที่มีไรแดงทำลาย
อ้อย	1. ไรฝุ่นดำ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (อุทัยธานี) จำนวน 6 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำให้เกษตรกรถอนต้นที่เป็นโรคแล้วนำไปทำลายนอกแปลง และเฝ้าทำลายอ้อยต่อที่เป็นโรครุนแรง - แนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ และหากเจอต้นที่เป็นโรคให้นำไปทำลายนอกแปลงปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (เชียงใหม่ ตาก ยะลา ขอนแก่น สุรินทร์ นอนบัวลำภู สระแก้ว และสตูล) จำนวน 199 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 26 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง - แนะนำการควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ หากพบการระบาดรุนแรงควรพ่นสารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร - แนะนำเกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทาน และคลุมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช
สับปะรด	1. ไรเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง และภูเก็ต) จำนวน 84 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่แนะนำให้ถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง และใช้หน่อพันธุ์ปลอดโรค กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. ไรแดงแอฟริกา 5. โรครากเน่าโคนเน่า 6. โรคใบดกหรือใบไหม้ 7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ยะลา และชุมพร) จำนวน 283 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (พิษณุโลก จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 78 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 802 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และยะลา) จำนวน 485 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 108 ไร่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,664 ไร่ การระบาดลดลง 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 785 ไร่ การระบาดลดลง 43 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา และสงขลา) จำนวน 563 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเข้าทำลาย 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไก่แจ้ ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคใบดกหรือใบไหม้ หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่น นำไปทำลายนอกแปลงปลูก ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อลดความชื้นสะสมใต้ทรงพุ่ม ลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง ในพื้นที่ปลูกที่มีความชื้นสูง - โรคใบจุดสาหร่าย หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มมีอาการของโรคให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หรือฝังดิน ดูแลการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสมไม่ให้ต้นมีทรงพุ่มแน่น เพื่อให้ทุเรียนได้รับแสงแดด และอากาศถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้น

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคนิวโมโตส 3. หนอนคืบกินใบ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และ ชุมพร) จำนวน 8 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 49 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี และระยอง) จำนวน 18 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่าย เก็บรวบรวมไปเผาทำลาย ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เมื่อพบใบแก่ถูกทำลายมากกว่าร้อยละ 30 ตัดทิ้ง และแนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์ไฮดรอกไซด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ โดยให้สังเกตดูใบเพสลาด ใบอ่อน และใบแก่ ในกรณีโคนโล่งเตียน ให้เขย่ากิ่งเงาะเพื่อให้ตัวหนอนทั้งตัวลงสู่พื้นดิน ไปทำลายทิ้งนอกแปลง ในระยะแตกใบ ถ้าพบหนอน ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล 85% WP อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ระยอง ตรัง และจันทบุรี) จำนวน 256 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 114 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 435 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 189 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และ ชุมพร) จำนวน 85 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	- หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอน จะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนขอนใบ อย่างสม่ำเสมอ โดยให้สังเกตดูที่ใต้ใบมังคุดจะพบรอยทางยาวเป็นเส้นสีขาว
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. มวนลำไย 3. โรคมดไม้กวาด 4. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี ระยอง และสมุทรสาคร) จำนวน 25 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 15 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และระยอง) จำนวน 252 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา จันทบุรี และอุบลราชธานี) จำนวน 667 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 12 ไร่	- ตัดส่วนที่พบการระบาดของเพลี้ยแป้งไปเผาทำลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง - มวนลำไย ตัดแต่งกิ่ง ไม่ให้ทรงพุ่มหนาทึบ เพื่อทำลายที่หลบซ่อนและที่พักอาศัยของตัวเต็มวัย หากพบการระบาดจับตัวอ่อน ตัวเต็มวัยและไข่ มาทำลาย แล้วใช้ศัตรูธรรมชาติ ฉีดพ่นก่อนลำไยออกดอก - โรคมดไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ ถอนวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ

9. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

9.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ. 66)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 29 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 36 จุด ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เลย มหาสารคาม นครพนม สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง และสงขลา ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้

9.2 โรคล้มปัสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 66)

พบการระบาดของสสตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 70 จังหวัด 899 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 632,405 ตัว ปัจจุบันยังมีสัตว์ป่วย 19,476 ตัว สัตว์ตายสะสม 67,476 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 207,416 ราย 2) หยอดหรือร่ายยาป้องกันแมลง 38,467 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 228,002 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 175,180 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 138,631 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 444,383 ราย