



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 27 เมษายน 2566 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.


บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน แต่ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ขอให้ประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้ ส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันน้อย เนื่องจากยังคงมีฝนตกในบริเวณดังกล่าวและมีการระบายของอากาศดี เว้นแต่ภาคเหนือที่มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 26 เม.ย. 66 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 27 เม.ย. 66



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	พิษณุโลก	31.0	ฝนตกปานกลาง
2	อ.เมือง	พะเยา	30.0	ฝนตกปานกลาง
3	อ.บางพลี	สมุทรปราการ	25.0	ฝนตกปานกลาง
4	อ.เมือง	ประจวบคีรีขันธ์	24.3	ฝนตกปานกลาง
5	อ.ตากฟ้า	นครสวรรค์	20.7	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 66)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 44,553 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 20,612 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (44,285 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 58) มากกว่าปี 2565 จำนวน 268 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 16.15 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 136.64 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 31,784 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 41,829 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 18,292 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (41,057 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 58) มากกว่าปี 2565 จำนวน 772 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 11.30 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 124.08 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 29,098 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	13,741	55	6,996	39	80	1,083	577	53	487	49	88	25,908	14,318	55	7,483	39	11,590
ตอน.	12	8,368	3,831	46	2,180	32	226	2,061	1,018	49	851	45	238	10,429	4,849	46	3,031	35	5,580
กลาง	3	1,419	515	36	455	33	27	419	156	37	131	33	30	1,838	671	37	586	33	1,166
ตะวันตก	2	26,605	18,176	68	4,899	37	8	164	100	61	89	58	10	26,769	18,276	68	4,987	37	8,493
ตะวันออก	6	1,515	613	40	519	37	52	1,006	471	47	415	44	58	2,520	1,084	43	933	39	1,436
ใต้	4	8,194	4,953	60	3,243	50	42	679	402	59	349	56	46	8,874	5,355	60	3,592	51	3,518
รวม	35	70,926	41,829	59	18,292	39	435	5,411	2,724	50	2,320	46	470	76,337	44,553	58	20,612	39	31,784

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 13,470 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 6,774 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 37) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 1.54 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 51.42 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 11,401 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	8,366	62	4,566	47	0.00	0.00	28.00	28.00	5,096
สิริกิตี	4,557	48	1,707	26	0.13	1.95	16.92	17.00	4,953
ภูมิพล+สิริกิตี	12,923	56	6,273	38	0.13	1.95	44.92	45.00	10,049
แควน้อยฯ	302	32	259	29	0.56	0.00	3.46	3.46	637
ป่าสักชลสิทธิ์	245	26	242	25	0.85	1.62	3.04	3.51	715
รวมทั้งหมด	13,470	54	6,774	37	1.54	3.57	51.42	51.96	11,401

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 12 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ สิริกิตี (26%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (29%) อ่างฯ แม่มอก (23%) อ่างฯ จุฬารักษ์ (16%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (14%) อ่างฯ สิรินคร (29%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (25%) อ่างฯ วชิราลงกรณ์ (23%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (25%) อ่างฯ คลองสิียด (22%) อ่างฯ นฤปดินทรจินดา (23%) และ อ่างฯ ปรามบุรี (23%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ คือ อ่างฯ บางหลวง (83%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 358 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 338 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.84 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.86 ม.)

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.30 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.31 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.41 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.41 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 118 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 103 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มนรมย์) 101 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 15 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 2 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 10 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 15 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 56 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 56 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 15 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 31 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 113 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 114 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 5 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) ปิด แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 45 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 50 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 13 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 73 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 91 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		21 เม.ย. 66	22 เม.ย. 66	23 เม.ย. 66	24 เม.ย. 66	25 เม.ย. 66	26 เม.ย. 66	27 เม.ย. 66		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาเกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนายนทบุรี จ.นนทบุรี	0.26	0.25	0.32	0.38	0.39	0.54	0.57	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนากกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.39	0.39	0.57	0.72	0.74	0.93	1.10	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 27 เม.ย. 66	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.98	-10.82
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	3.04	-12.96
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	0.64	-11.56
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.35	-10.65
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.61	-10.89
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	1.98	-12.52

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2565/66

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 (วันที่ 1 พ.ย.65 ถึง 30 เม.ย.66) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 43,740 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ จำนวน 27,685 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 24,786 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ) วันนี้ใช้น้ำไป 51.42 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 8,556 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 99 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 (1 พ.ย.65 - 30 เม.ย.66)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	2,535	8,270	16,330	550	27,685	24,786	90
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	2,020	5,795	135	9,100	8,556	99



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66

ทั้งประเทศ จำนวน 16.30 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 13.55 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.75 ล้านไร่

กลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 9.23 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.51 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.72 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2566)

ทั้งประเทศ จำนวน 15.20 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 13.42 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.78 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.25 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 8.14 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 5.28 ล้านไร่)

กลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 8.74 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.25 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.49 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.69 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 6.50 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 1.75 ล้านไร่)

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2565/66			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2565/66						ข้าวรอบที่ 2	
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	รวมข้าว	%รวมข้าว	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวมทั้งหมด	%รวมทั้งหมด	พื้นที่เก็บเกี่ยว	พื้นที่รอเก็บเกี่ยว
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	10.42	0.64	11.06	10.44	100.19	0.67	104.69	11.11	100.45	6.32	4.12
	นอกเขตชลประทาน	3.13	2.11	5.24	2.98	95.21	1.11	52.61	4.09	78.05	1.82	1.16
	รวม	13.55	2.75	16.30	13.42	99.04	1.78	64.73	15.20	93.25	8.14	5.28
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	6.64	0.10	6.74	6.41	96.54	0.15	150.00	6.56	97.33	5.06	1.35
	นอกเขตชลประทาน	1.87	0.62	2.49	1.84	98.40	0.34	54.84	2.18	87.55	1.44	0.40
	รวม	8.51	0.72	9.23	8.25	96.94	0.49	68.06	8.74	94.69	6.50	1.75

พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน รวม 45 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 1.12 ล้านไร่ ได้แก่

- ในเขตชลประทาน 36 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.88 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิษณุโลกแพร่ ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ชัยนาท อ่างทอง จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้วราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี เพชรบุรี ตรัง และจังหวัดกระบี่

- นอกเขตชลประทาน 25 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.24 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก แม่ฮ่องสอน พะเยา พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน สุโขทัย นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองคาย ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม สุรินทร์ สกลนคร อำนาจเจริญ ชัยนาท ระยอง สระแก้ว สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร นครนายก ลพบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 11 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลกแพร่ ลพบุรี กาญจนบุรี อุตรดิตถ์ นครราชสีมา จันทบุรี อำเภอดงขี้เหล็ก ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างกักเก็บน้ำ รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16 - 26 เมษายน 2566)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร(6) ตาก(3) น่าน(15) พะเยา(7) พิจิตร(4) พิษณุโลก(3) ลำปาง(13) ลำพูน(1) สุโขทัย(4) อุตรดิตถ์(9) เชียงราย(12) เชียงใหม่(6) เพชรบูรณ์(9) แพร่(5) แม่ฮ่องสอน(7)
กลาง	กาญจนบุรี(10) ชัยนาท(2) นครสวรรค์(12) ลพบุรี(10) สระบุรี(5) สิงห์บุรี(2) สุพรรณบุรี(3) อุทัยธานี(4) อ่างทอง(1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์(18) ขอนแก่น(26) ชัยภูมิ(11) นครพนม(2) นครราชสีมา(22) บึงกาฬ(7) บุรีรัมย์(9) มหาสารคาม(3) มุกดาหาร(7) ยโสธร(5) ร้อยเอ็ด(4) ศรีสะเกษ(4) สกลนคร(7) สุรินทร์(8) หนองคาย(4) หนองบัวลำภู(4) อำนาจเจริญ(4) อุตรดิตถ์(11) อุบลราชธานี(6) เลย(9)
ตะวันออก	จันทบุรี(9) ฉะเชิงเทรา(4) ชลบุรี(5) ตราด(2) ปราจีนบุรี(4) ระยอง(8) สระแก้ว(9)
ใต้	กระบี่(8) ชุมพร(8) นครศรีธรรมราช(23) นครราชสีมา(7) ประจวบคีรีขันธ์(7) พังงา(8) ระนอง(5) ภูเก็ต(3) ราชบุรี(5) สงขลา(6) เพชรบุรี(4) สุราษฎร์ธานี(10)
รวม	63 จังหวัด (459 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ที่ 26 เมษายน 2566

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	4	ภารกิจบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.เชียงใหม่(แม่แจ่ม ฮอด แม่วาง) จ.พะเยา(แม่ใจ เมืองพะเยา)
2. พิษณุโลก	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวงเนื่องจาก ช่วงเช้าสภาพอากาศปิดกับมีฝนตกบริเวณโดยรอบสนามบิน ช่วงบ่าย กลุ่มเมฆไม่เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เฝ้าระวัง
3. แพร่	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจาก มีเมฆชั้นกลางถึงชั้นสูงปกคลุมพื้นที่เป้าหมายเป็นระยะๆ ส่งผลให้ เมฆคิวมูลัสบริเวณพื้นที่เป้าหมายพัฒนาตัวและสลายตัวไป
4. ลพบุรี	6	1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.ลพบุรี(ท่าหลวง พัฒนานิคม สระโบสถ์ ลำสนธิ โคกสำโรง โคกเจริญ หนองม่วง เมืองลพบุรี) จ.สระบุรี(วังม่วง มวกเหล็ก) จ.นครสวรรค์(ตากฟ้า ท่าตะโก ไพศาล) จ.เพชรบูรณ์(วิเชียรบุรี) 2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(วังแหม)จ.ลพบุรีอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กจ.สระบุรี
5. กาญจนบุรี	4	1. ภารกิจบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.กาญจนบุรี(ทองผาภูมิ ศรีสวัสดิ์ สังขละบุรี เลาชะวัญ บ่อพลอย) จ.อุทัยธานี (บ้านไร่ ห้วยคต) จ.สุพรรณบุรี(ด่านช้าง ดอนเจดีย์ เมืองสุพรรณบุรี) 2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์จ.อุทัยธานีเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี
6. อุตรธานี	5	1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.กาฬสินธุ์(คำม่วง ท่าคันโท) จ.อุตรธานี(วังสามหมอ ศรีธาตุ กุมภวาปี ไชยวาน กุแก้ว หนองหาน) จ.สกลนคร(ส่องดาว) 2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง จ.สกลนคร
7. นครราชสีมา	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้ามีเมฆชั้นสูงปกคลุมพื้นที่เป้าหมาย ช่วงบ่ายมีฝนฟ้าคะนอง บริเวณสนามบิน
8. จันทบุรี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
9. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	2	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.เพชรบุรี(แก่งกระจาน) จ.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน สามร้อยยอด กุยบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก) 2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
10. สุราษฎร์ธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และรอสนับสนุนเครื่องบิน
11. หาดใหญ่ จ.สงขลา	2	1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช(ปากพนัง) จ.สุราษฎร์ธานี (พุนพิน ตาขุน คีรีรัฐนิคม พนม) 2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
รวม	23	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (15 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน 2566)

ตั้งแต่เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 26 เมษายน 2566 การขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 49 วันขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 947 เที่ยวบิน (1,527:42 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 706.9 ตัน พลุสารพัดความขึ้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 141 นัด พลุสารพัดความขึ้นแคลเซียมคลอไรด์จำนวน 115 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1,276 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 54 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย สกลนคร นครพนม หนองคาย บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ บึงกาฬ มุกดาหาร หนองบัวลำภู นครราชสีมา อุตรธานี กาญจนบุรี ร้อยเอ็ด อุทัยธานี นครสวรรค์ จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ลพบุรี ระยอง ระนอง สระแก้ว สระบุรี ปราจีนบุรี กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง พัทลุง สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

6. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- **เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่** เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบล-บรี-บรีโกค พืชไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/2566 จำนวน 2,188 เครื่อง ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ จำนวน 136 เครื่อง โดยแบ่งแยกดังนี้

1. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 87 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด
2. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 15 เครื่อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด
3. ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 34 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด

- **เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ** รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

7. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 66)

7.1 วาดภัย ช่วงภัย 4 ก.พ. 66 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ แพร่ จันทบุรี อุทัยธานี ลำปาง ตราด ลำพูน เชียงราย ขุมพร และจังหวัดเลย เกษตรกร 5,483 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 15,392 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4,328 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 6,393 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,671 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 397 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 682 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่และพืชผัก 503 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 179 ไร่ คิดเป็นเงิน 1.72 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 174 ราย (คิดเป็นร้อยละ 43.83 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 468 ไร่ วงเงิน 0.93 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 53.81 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.2 อุทกภัย (ภาคใต้) ช่วงภัย 1 ธ.ค. 65 – 29 ม.ค. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ตรัง ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 10,364 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 82,071 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 26,099 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 8,162 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 47,809 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,577 ราย พื้นที่ 6,805 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4,569 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,742 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 494 ไร่ คิดเป็นเงิน 11.57 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ตรัง สุราษฎร์ธานี ปัตตานี สตูล กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร 7,836 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 19,599 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 13,407 ไร่ บ่อกุ้ง 6,192 ไร่ กระชัง 23,228 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 7,836 ราย พื้นที่ 19,599 ไร่ กระชัง 23,228 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 141.17 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 969 ราย (คิดเป็นร้อยละ 12.37 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 671 ไร่ กระชัง 5,559 ตร.ม. วงเงิน 5.65 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ปัตตานี พัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 65,308 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 5,948,600 ตัว แบ่งเป็น โค 146,148 ตัว กระบือ 3,119 ตัว สุกร 103,573 ตัว แพะ/แกะ 40,742 ตัว สัตว์ปีก 5,655,018 ตัว แผลงหญ้า 2,999 ไร่ **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 1,250 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 51,102 ตัว แผลงหญ้า 83 ไร่ คิดเป็นเงิน 20.56 ล้านบาท

7.3 อุทกภัย ช่วงภัย ส.ค. - 23 พ.ย. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 65 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร หนองคาย หนองบัวลำภู ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุธรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชัยนาท เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ตรด ปราจีนบุรี ปทุมธานี นครนายก นครปฐม กาญจนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ภูเก็ต ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สตูล สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 463,134 ราย พื้นที่ 4,147,759 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,770,252 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,343,928 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 33,579 ไร่ คิดเป็นเงิน 6,509.06 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 425,063 ราย (คิดเป็นร้อยละ 91.78 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 3,788,015 ไร่ วงเงิน 5,910.63 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 90.81 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พะเยา ลำปาง ลำพูน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุธรธานี หนองคาย มหาสารคาม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ตรด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก นครปฐม ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ราชบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 26,121 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย 44,523 ไร่ กระชัง 36,864 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 301.52 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 21,111 ราย (คิดเป็นร้อยละ 80.82 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 37,428 ไร่ กระชัง 33,263 ตร.ม. วงเงิน 266.02 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 88.23 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ตาก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง เกษตรกร 3,918 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 412,405 ตัว แบ่งเป็น โค 43 ตัว กระบือ 13 ตัว สุกร 44 ตัว แพะ/แกะ 241 ตัว สัตว์ปีก 411,225 ตัว แปลงหญ้า 1,900 ไร่ คิดเป็นเงิน 21.77 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,590 ราย (คิดเป็นร้อยละ 91.63 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) สัตว์ตาย/สูญหาย 382,961 ตัว แปลงหญ้า 1,850 ไร่ คิดเป็นเงิน 20.01 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 91.91 ของวงเงินช่วยเหลือ)

7.4 อุทกภัย ช่วงภัย พ.ค. – 31 ก.ค. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ สระบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 21,164 ราย พื้นที่ 271,038 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 229,422 ไร่ พืชไร่ และพืชผัก 41,299 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ 317 ไร่ คิดเป็นเงิน 390.48 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 13,508 ราย (คิดเป็นร้อยละ 63.82 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 120,410 ไร่ วงเงิน 175.95 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 45.06 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 1,489 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,509 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 1,500 ไร่ บ่อกุ้ง 10 ไร่ กระชัง 563 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 7.340 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

8. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 66)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. แมลงสี 2. หนอนกอข้าว 3. หนอนกระทู้ข้าว 4. เพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล 5. เพลี้ยไฟ 6. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นราธิวาส และสงขลา) จำนวน 21 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เพชรบูรณ์) จำนวน 42 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุบลราชธานี ชลบุรี และราชบุรี) จำนวน 7 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 135 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และอุตรดิตถ์) จำนวน 1,850 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1,810 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) จำนวน 62 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ลำพูน) จำนวน 4 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 300 ไร่	- แมลงสี ให้กำจัดวัชพืชในนาข้าว ค่นาและรอบๆ แปลง จับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในนาข้าวทำลาย ตัวเต็มวัยขบ กินเนื้อเน่า นำเนื้อเน่าแขวนไว้ตามนาข้าวและจับมาทำลาย หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวต่อเนื่องเพื่อลดการแพร่ขยายพันธุ์ - หนอนกอข้าว ใช้น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ ของหนอนกอข้าวอยู่ตามตอซัง ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อตัดวงจร ชีวิตของหนอนกอข้าว ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป ทำให้ ใบข้าวงามหนอนกอชอบวางไข่ ใช้แสงไฟล่อตัวเต็มวัยและทำลาย เมื่อมีการระบาดรุนแรงให้ใช้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ดในนาข้าว - หนอนกระทู้ข้าว ให้หมั่นสำรวจ ไกล่กลิ้งดินในแปลง เพื่อทำลาย ดักแด้ที่อยู่ในดินหรือตอซัง กำจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณ ใกล้เคียงเพื่อทำลายแหล่งอาศัย ใช้สารฆ่าแมลง เช่น มาลาไธออน 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร เบนโทโรไทออน 50% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบมีการระบาดรุนแรง - เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แนะนำวิธีวิธีการผลิตขยายเชื้อรา บิวเวอร์เรีย แนะนำให้ปลูกข้าวพันธุ์ค่อนข้างต้านทานเพลี้ย กระโดดสีน้ำตาล เช่น สุพรรณบุรี1 สุพรรณบุรี2 สุพรรณบุรี90 สุพรรณบุรี60 ปทุมธานี1 เป็นต้น และคุมน้ำในแปลงนาให้พอ ดินเปียก หรือมีน้ำเรี่ยผิวดินนาน 7-10 วัน แล้วปล่อยซังทิ้งไว้ ให้แห้งเองสลายกันไป - เพลี้ยไฟ ให้หมั่นสำรวจ ดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน 7 วัน อย่าน้ำขาดน้ำ ให้น้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบ เพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวอายุ 6-7 วัน หลังหว่าน ใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อ เร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว ใช้สารฆ่าแมลง มาลาไธออน 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อไร่ 20 ลิตร หรือคาร์บาริล 85% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบข้าวมีวนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในระยะข้าวอายุ 10 - 15 วันหลังหว่าน - โรคไหม้ข้าว หมั่นสำรวจแปลงนาถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าว แนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตรา ตามคำแนะนำในฉลาก ฟันเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร ถ้ามีความจำเป็นใช้สารเคมี ฟันเฉพาะ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			บริเวณที่พบการระบาดเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่กระจาย ขยายเป็นวงกว้างออกไป สารเคมีที่แนะนำมี อิติเฟนฟอส (Edifenphos) 50% EC อัตรา 20-25 มิลลิกรัม บลาสติดิซินเอส (Blastidiclin-s) 2% EC อัตรา 20-25 มิลลิกรัม ไตรไซคราโซล (Tricyclazole) 75% WP อัตรา 10-16 กรัม โดยเลือกใช้สาร ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร และให้สลับกลุ่มสารเพื่อ ป้องกันเชื้อราสร้างความต้านทาน
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนกินใบมะพร้าว 3. แมลงดำหนาม 4. ดั้วงวง 5. ดั้วแรด 6. โรสี้ขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวต สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,166 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ราชบุรี นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,057 ไร่ การระบาดลดลง 27 ไร่ พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวต สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,632 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 37 ไร่ พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ชลบุรี ตรวต กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี สมุทรปราการ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,098 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรวต ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,454 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ชัยภูมิ จันทบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ตรวต นครปฐม สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 488 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่	- รณรงค์ให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และ เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมหนอนของแมลงดำหนามมะพร้าวในพื้นที่ - ใช้กำดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงและด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรด ในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - โรสี้ขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในหัวผลมะพร้าวทำให้การพ่น สารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัด ให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะ ผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ โรสี้ขามะพร้าวเข้าทำลายใช้สารเคมีตามคำแนะนำของ กรมวิชาการเกษตร
ปาล์ม น้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. ดั้วกู่หลาบ 3. หนอนปลอกเล็ก 4. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,986 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 202 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,221 ไร่ การระบาดลดลง 293 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สตูล และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,885 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่	- ใช้กำดักไฟโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไร เซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - พ่นด้วงกู่หลาบด้วยสารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน (Sevin) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 20% EC อัตรา 40 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7-10 วัน ในตอนเย็น - หนอนปลอกเล็ก พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) อัตรา 100 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 5 มิลลิกรัม พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที โดยใช้เครื่องพ่น ที่ปรับความดันได้ไม่น้อยกว่า 30 บาร์ และพ่นติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ห่างกัน 5 - 7 วัน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	5. โรคทะลายเน่า 6. โรคใบจุด 7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (นครสวรรค์ ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 69 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 71 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร และตรัง) จำนวน 125 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - รมรังค์ให้เกษตรกรตัดทะลายที่เป็นโรคทะลายเน่าของปาล์มน้ำมันออกไปเผาทำลายนอกแปลง - แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลง ตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - สำรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายในช่วงฤดูฝน โดยสำรวจสัปดาห์ละครั้ง ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลงเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ของสปอร์ไปยังต้นอื่นๆ หากพบการระบาดรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ยางพารา	1. โรคกลากขาว 2. โรคราแป้ง 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ปัตตานี นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 726 ไร่ การระบาดลดลง 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ลำปาง นครศรีธรรมราช และสตูล) จำนวน 165 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 18 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ปัตตานี พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 3,993 ไร่ การระบาดลดลง 71 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 80,165 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำวิธีป้องกันกำจัดโรคกลากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารารุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรังค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ และทำร่องบริเวณโคนต้นยางพาราให้ร่องขวางกับลำต้น เพื่อป้องกันไม่ให้โรคคลุกกลามลงสู่ราก
กาแฟ	1. หนอนเจาะกิ่ง/ลำต้นกาแฟ 2. โรคราสนิม 3. โรคใบจุดตากบ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 38 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 73 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และระยอง) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรค - หนอนเจาะกิ่ง/ลำต้นกาแฟ ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเฟนิโตรไธออน (fenitrothion) (ซูมิไธออน (sumithion) 50% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ในระยะเวลาของช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู 3. เพลี้ยหอย 4. ไรแดงมันสำปะหลัง 5. โรคพุ่มแจ้ 6. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ขอนแก่น สกลนคร มุกดาหาร ชลบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี และระยอง) จำนวน 834 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 616 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (น่าน กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร ชลบุรี และกาญจนบุรี) จำนวน 23 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (อุทัยธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ ลพบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และกาญจนบุรี) จำนวน 9,012 ไร่ การระบาดลดลง 453 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กำแพงเพชร สกลนคร อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และกาญจนบุรี) จำนวน 358 ไร่ การระบาดลดลง 46 ไร่ พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี และเพชรบุรี) จำนวน 52,501 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 151 ไร่	- เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ไถและพรวนดิน ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด เมื่อพบการระบาด ถอนต้นมันสำปะหลังและเก็บทำลายนอกแปลง - การควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ปลอ่ยให้กระจายตัวแปลง ให้เจริญเติบโต และขยายพันธุ์ได้อย่างน้อย 10 เท่า ในทุกชั่วอายุ โดยปลอ่ยในอัตรา 50 คู่ ต่อไร่ เมื่อเริ่มพบการระบาด หรือปลอ่ยในอัตรา 200 คู่ต่อไร่ เมื่อพบการระบาดรุนแรง และหลังปลอ่ย แตนเบียนและหลังปลอ่ยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ให้งดการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช - เพลี้ยหอย ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากเพลี้ยหอย ให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลง ได้แก่ มาลาไทออน (malathion) 83% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร ไทอะมีโทกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรา 4 กรัม อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG อัตรา 4 กรัม โดยเลือกใช้สารและแช่ท่อนพันธุ์นาน 10 นาที ผึ่งให้แห้งก่อนปลูก - ไรแดง ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน หากเริ่มพบการเข้าทำลายของไรแดงควรเก็บทิ้งหรือทำลาย - โรคพุ่มแจ้ ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด และกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			- โรคใบด่างมันสำปะหลัง ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่างด้วย 3 วิธี ดังนี้ วิธีฝังกลบ วิธีใส่ถุง/กระสอบ วิธีบดสับ
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคเส้ดำ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา) จำนวน 120 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (อุทัยธานี) จำนวน 6 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ใช้ช่วงที่พบกลุ่มไข่ของหนอนกออ้อย ปล่อยแมลงหางหนีบอัตรา 500 ตัวต่อไร่ เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือน ควรพ่นสารฆ่าแมลงเคลทาเมทริน 3% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2-3 ครั้ง ห่าง 14 วัน เมื่อพบการระบาดของหนอนกออ้อย ควรพ่นสารฆ่าแมลง ได้แก่ อินดอกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 15 มิลลิลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อน้ำ 20 ลิตร - โรคเส้ดำ เมื่อพบกออ้อยเริ่มแสดงอาการเส้ดำ ควรตัดออกขณะเริ่มปรากฏอาการ ก่อนที่เยื่อหุ้มเส้ดำจะหลุดออก นำใส่ถุงไปทำลายนอกแปลงปลูก หรือขุดกอเป็นโรคทำลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังกอข้างเคียง
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กาญจนบุรี ยะลา สงขลา และสตูล) จำนวน 63 ไร่ <u>การระบาดลดลง 21 ไร่</u>	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง - แนะนำการควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ หากพบการระบาดรุนแรงควรพ่นสารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร - แนะนำเกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทาน และคลุมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง และภูเก็ต) จำนวน 95 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ทำความสะอาดแปลง เตรียมดินให้ตัดต้นและปั่นตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากเหง้าต้นสับปะรดและซากวัชพืช หรือเมื่อพบต้นเป็นโรคให้ถอนต้นสับปะรดที่แสดงอาการใส่ถุงพลาสติกไปทำลายนอกแปลง
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. ไรแดงแอฟริกา 5. โรครากเน่าโคนเน่า 6. โรคใบติดหรือใบไหม้ 7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ยะลา สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 638 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 111 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (พิษณุโลก จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช) จำนวน 152 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 612 ไร่ <u>การระบาดลดลง 18 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และยะลา) จำนวน 714 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 16 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,331 ไร่ <u>การระบาดลดลง 22 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 553 ไร่ <u>การระบาดลดลง 10 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา และสงขลา) จำนวน 452 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่</u>	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไก่แจ้ ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - ไรแดงแอฟริกา กำจัดวัชพืชในสวน การใช้สารฆ่าไรไม่ควรฉีดพ่นสารชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวลานาน เมื่อพบแดงแอฟริการะบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ โพรพาร์ไกต์ (propargite) 30 % WP อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ (amitraz) 20 % EC อัตรา 30 มิลลิลิตร เฮกซีไทอะซอกซ์ (hexythiazox) 2% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร พ่นทุก 7-10 วัน - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคใบติดหรือใบไหม้ หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่น นำไปทำลายนอกแปลง ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก ลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง ในพื้นที่ปลูกที่มีความชื้นสูง - โรคใบจุดสาหร่าย หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มมีอาการของโรคให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หรือฝังดิน ดูแลการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม ไม่ให้ต้นมีทรงพุ่มแน่น เพื่อให้ทุเรียนได้รับแสงแดด และอากาศถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้น

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 13 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 32 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 16 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่าย เก็บรวบรวมไปเผาทำลาย ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เมื่อพบใบแก่ถูกทำลายมากกว่าร้อยละ 30 ตัดทิ้ง และแนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ให้สังเกตดูใบเพสลาด ใบอ่อน และใบแก่
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 519 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 237 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 417 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 83 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	- หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน - หมั่นสำรวจและสังเกตการณ์เข้าทำลายของหนอนขอนใบอย่างสม่ำเสมอ โดยให้สังเกตดูที่ใต้ใบมังคุดจะพบรอยทางยาวเป็นเส้นสีขาว
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. มวนลำไย 3. โรคพุ่มไม้กวาด 4. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี ระยอง และสมุทรสาคร) จำนวน 23 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 279 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ น่าน พะเยา และจันทบุรี) จำนวน 693 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่	- เพลี้ยแป้ง ให้หมั่นสำรวจแปลงลำไยทุกสัปดาห์หากพบการระบาดแนะนำให้ตัดส่วนของกิ่งก้านที่มีเพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ไปทำลาย หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไยของเรา ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด มาลาไทออน (Malathion) 83% W/V EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และไพรีทรอยด์ (Pyrethroids) (อัตราส่วนตามฉลาก) พ่นให้ทั่ว - มวนลำไย ให้ตัดแต่งกิ่งเพื่อทำลายที่พักอาศัยของตัวเต็มวัย หากพบการระบาดให้จับมาทำลาย แล้วใช้ศัตรูธรรมชาติฉีดพ่น - โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ - โรคราดำ ให้ป้องกันและกำจัดแมลงพวกปากดูดเช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยเพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยอ่อน เป็นต้น โดยพ่นสารเคมีเช่น คาร์บาริล (Carbaryl) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อราได้แก่ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ (Copper Oxychloride) 85% WP อัตรา 40-50 กรัม และเบตาไซฟลูทริน (Betacyfluthrin) 2.5 % EC อัตรา 40-50 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร หรือตามที่ฉลากกำหนด

9. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

9.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 66)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 26 เมษายน 2566 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 33 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 173 จุด ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร เลย หนองบัวลำภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคได้

9.2 โรคลัมปีสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 66)

พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 23 เมษายน 2566 รวม 70 จังหวัด 899 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 632,466 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 19,459 ตัว สัตว์ตายสะสม 67,312 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจรอยโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 207,471 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 38,467 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 228,002 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 175,180 ราย 5) ฉีดยาก็กำจัดแมลงแก่เกษตรกร 138,631 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 444,383 ราย