



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ


1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “พายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวเบงกอล (มีผลกระทบถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566)” ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 05.00 น.

เมื่อเวลา 04.00 น.ของวันนี้ (11 พ.ค. 66) พายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 10.8 องศาเหนือ ลองจิจูด 88.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กม./ชม. พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนทางตะวันตกเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 15 กม./ชม. คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศบังกลาเทศ และเมียนมาในช่วงวันที่ 14-15 พ.ค. 66 ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 11-15 พ.ค. 66 ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 3 เมตร และมีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นในวันที่ 14 -15 พ.ค. 66 ทำให้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 16 พ.ค. 65

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 10 พ.ค. 66 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 11 พ.ค. 66



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	จันทบุรี	153.5	ฝนตกหนักมาก
2	อ.เมือง	แม่ฮ่องสอน	64.5	ฝนตกหนัก
3	อ.เมือง	ยโสธร	60.5	ฝนตกหนัก
4	อ.รัฐประศาสน์	สระแก้ว	56.8	ฝนตกหนัก
5	อ.พระสมุทรเจดีย์	สมุทรปราการ	53.9	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 66)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 42,785 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 18,844 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 36) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (42,868 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 56) มากกว่าปี 2565 จำนวน 83 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 45.64 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 123.89 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 33,552 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 40,201 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 16,664 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (39,644 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 56) มากกว่าปี 2565 จำนวน 557 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 35.85 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 113.95 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 30,725 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	12,999	52	6,255	35	80	1,083	537	50	446	45	88	25,908	13,536	52	6,701	35	12,371
ตอน.	12	8,368	3,657	44	2,006	30	226	2,061	984	48	817	43	238	10,429	4,641	44	2,823	33	5,788
กลาง	3	1,419	443	31	383	28	27	419	149	36	124	31	30	1,838	592	32	506	29	1,246
ตะวันตก	2	26,605	17,737	67	4,460	33	8	164	93	57	82	54	10	26,769	17,830	67	4,543	34	8,938
ตะวันออก	6	1,515	578	38	484	34	52	1,006	443	44	386	41	58	2,520	1,021	41	870	37	1,499
ใต้	4	8,194	4,787	58	3,076	47	42	679	378	56	324	52	46	8,874	5,165	58	3,400	48	3,709
รวม	35	70,926	40,201	57	16,664	35	435	5,411	2,584	48	2,179	44	470	76,337	42,785	56	18,844	36	33,552

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี๊ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 12,707 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 6,011 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 15.46 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 51.50 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,164 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับ ได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	7,928	59	4,128	43	7.66	0.00	28.00	28.00	5,534
สิริกิตี๊	4,325	45	1,475	22	5.93	4.21	17.00	17.02	5,185
ภูมิพล+สิริกิตี๊	12,253	53	5,603	34	13.59	4.21	45.00	45.02	10,719
แควน้อยฯ	254	27	211	24	0.06	0.00	3.46	3.46	685
ป่าสักชลสิทธิ์	201	21	198	21	1.81	3.35	3.04	3.03	759
รวมทั้งหมด	12,707	51	6,011	33	15.46	7.56	51.50	51.51	12,164

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาตรน้ำใช้การ จำนวน 12 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ สิริกิตี๊ (22%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (24%) อ่างฯ แม่มอก (22%) อ่างฯ จุฬารักษ์ (16%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (12%) อ่างฯ สิรินคร (24%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (21%) อ่างฯ วชิราลงกรณ์ (21%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (20%) อ่างฯ คลองสิียด (19%) อ่างฯ นฤปดินทรจินดา (21%) และ อ่างฯ ปรานบุรี (21%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิธิ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 360 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 376 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.85 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.85 ม.)

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.13 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.14 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.41 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.41 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 130 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 136 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 104 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 24 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 2 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 10 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 10 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 66 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 66 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 16 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 32 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 146 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 147 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 10 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 3 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 55 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 65 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 13 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 104 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 101 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		5 พ.ค. 66	6 พ.ค. 66	7 พ.ค. 66	8 พ.ค. 66	9 พ.ค. 66	10 พ.ค. 66	11 พ.ค. 66		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแล จ.ปทุมธานี	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร - ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.27	0.27	0.28	0.28	0.31	0.31	0.34	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	29.00	0.28	0.31	0.30	0.35	0.35	0.42	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 11 พ.ค. 66	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.03	-10.77
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	3.28	-12.72
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	0.88	-11.32
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.56	-10.44
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.92	-10.58
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.25	-12.25

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66

ทั้งประเทศ จำนวน 16.30 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 13.55 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.75 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 9.23 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.51 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.72 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566)

ทั้งประเทศ จำนวน 15.24 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 13.45 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.79 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.50 ของแผน (ข้าว เกือบเกี่ยวแล้ว 10.11 ล้านไร่ รอเกี่ยวเกี่ยว 3.34 ล้านไร่)

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 8.76 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.26 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.50 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.91 ของแผน (ข้าว เกือบเกี่ยวแล้ว 7.57 ล้านไร่ รอเกี่ยวเกี่ยว 0.69 ล้านไร่)

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2565/66			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2565/66						ข้าวรอบที่ 2	
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	รวมข้าว	%รวมข้าว	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวมทั้งหมด	%รวมทั้งหมด	พื้นที่ เกี่ยวแล้ว	พื้นที่ รอเกี่ยว
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	10.42	0.64	11.06	10.45	100.29	0.67	104.69	11.12	100.54	7.76	2.69
	นอกเขตชลประทาน	3.13	2.11	5.24	3.00	95.85	1.12	53.08	4.12	78.63	2.35	0.65
	รวม	13.55	2.75	16.30	13.45	99.26	1.79	65.09	15.24	93.50	10.11	3.34
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	6.64	0.10	6.74	6.41	96.54	0.15	150.00	6.56	97.33	5.84	0.57
	นอกเขตชลประทาน	1.87	0.62	2.49	1.85	98.93	0.35	56.45	2.20	88.35	1.73	0.12
	รวม	8.51	0.72	9.23	8.26	97.06	0.50	69.44	8.76	94.91	7.57	0.69

พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน รวม 45 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 1.14 ล้านไร่ ได้แก่

- ในเขตชลประทาน 36 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.89 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิษณุโลกแพร่ ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา บึงกาฬบุรีรัมย์ ร้อยเอ็ดเลย สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ชัยนาท อ่างทอง จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้วราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี เพชรบุรี ตรัง และจังหวัดกระบี่

- นอกเขตชลประทาน 26 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.25 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน พะเยา พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน สุโขทัย นครราชสีมาบุรีรัมย์หนองคายขอนแก่นนครพนมมหาสารคามสุรินทร์สกลนครอำนาจเจริญชัยนาทระยองสระแก้วสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครนครนายกลพบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 12 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิชณุโลก ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี จันทบุรี อำเภอดงหลวง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2566)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร(7) ตาก(6) น่าน(15) พะเยา(6) พิจิตร(4) พิชณุโลก(3) ลำปาง(2) ลำพูน(1) สุโขทัย(4) อุตรดิตถ์(9) เชียงราย(5) เชียงใหม่(3) เพชรบูรณ์(11) แพร่(5)
กลาง	กาญจนบุรี(10) ชัยนาท(3) นครสวรรค์(12) ลพบุรี(10) สระบุรี(5) สิงห์บุรี(2) สุพรรณบุรี(3) อุทัยธานี(8) อ่างทอง(1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์(18) ขอนแก่น(26) ชัยภูมิ(11) นครพนม(2) นครราชสีมา(17) บึงกาฬ(7) บุรีรัมย์(10) มหาสารคาม(4) มุกดาหาร(7) ยโสธร(5) ร้อยเอ็ด(4) ศรีสะเกษ(7) สกลนคร(7) สุรินทร์(8) หนองคาย(4) หนองบัวลำภู(4) อำนาจเจริญ(4) อุตรดิตถ์(10) อุบลราชธานี(8) เลย(10)
ตะวันออก	จันทบุรี(8) ฉะเชิงเทรา(4) ชลบุรี(5) ตราด(1) นครนายก(4) ปราจีนบุรี(6) ระยอง(4) สระแก้ว(9)
ใต้	กระบี่(8) ชุมพร(8) นครศรีธรรมราช(23) นราธิวาส(7) ประจวบคีรีขันธ์(8) พังงา(8) พัทลุง(11) ภูเก็ต(3) ระนอง(5) ราชบุรี(7) สงขลา(7) สุราษฎร์ธานี(3) เพชรบุรี(4)
รวม	64 จังหวัด (451 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	0	ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง จากการติดตามด้วยเรดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมพบเมฆก่อตัวเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเล็กน้อยในบริเวณใกล้เคียง พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2. ตาก	1	ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก
3. พิชณุโลก	4	1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.กำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร) จ.พิจิตร(โพทะเล) 2. ภารกิจยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของ การเกิดพายุลูกเห็บบริเวณ จ.เพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์ หนองไผ่) หลังปฏิบัติการพบมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง และไม่พบรายงานลูกเห็บตกบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ในช่วงเวลาปฏิบัติการ ในเวลา 14:06 - 16:06 น.
4. ลพบุรี	2	1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากภัยมีฝนตก เล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.นครสวรรค์(หนองบัว ไผ่ศาลี ท่าตะโก พยุหะคีรี เมืองนครสวรรค์) 2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
5. กาญจนบุรี	3	1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.กาญจนบุรี (ทองผาภูมิ สังขละบุรี) 2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี
6. ขอนแก่น	4	1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.ขอนแก่น(บ้านไผ่ มัญจาคีรี หนองเรือ โคกโพธิ์ไชย) จ.ชัยภูมิ(แก้งคร้อ บ้านแท่น คอนสวรรค์ ภูเขียว) จ.อุดรธานี(เมืองอุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม หนองแสง หนองวัวซอ) 2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี
7. นครราชสีมา	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้าท้องฟ้าปิด มีฝนตกบริเวณสนามบินและบริเวณโดยรอบ ช่วงบ่ายเมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
8. อุบลราชธานี	1	1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.ศรีสะเกษ(กันทรลักษณ์ เบญจลักษณ์ ศรีรัตนะ น้ำเกลี้ยง) 2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่รับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จ.ศรีสะเกษ

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
9. จันทบุรี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้าท้องฟ้ามีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้า ช่วงบ่ายสภาพอากาศปิด มีฝนตกบริเวณสนามบิน และพื้นที่โดยรอบ
10. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้าท้องฟ้าปิดมีฝนตกบริเวณสนามบินและพื้นที่ใกล้เคียง และช่วงบ่ายมีเมฆชั้นกลางปกคลุมเต็มท้องฟ้า ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
11. สุราษฎร์ธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเครื่องบิน BT67 ของกองทัพอากาศตรวจซ่อมประจำสัปดาห์
12. สงขลา	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้าส่งผลให้เมฆคิวมูลัส ในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
รวม	15	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (15 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2566)

ตั้งแต่เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 10 พฤษภาคม 2566 การขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 63 วัน ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 1,404 เที่ยวบิน (2,227:45 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 1,099.8 ตัน พลุสารพัดความขึ้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 207 นัด พลุสารพัดความขึ้นแคลเซียมคลอไรด์จำนวน 197 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1,481 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 61 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย สกลนคร นครพนม นongคาย บัรรัมย์ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ บึงกาฬ มุกดาหาร นongบัวลำภู นครราชสีมา อุรธานี กาญจนบุรี ร้อยเอ็ด อุทัยธานี นครสวรรค์ สุรินทร์ จันทบุรี ตรวต ยโสธร อุบลราชธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก ลพบุรี ระยอง ระนอง สระแก้ว สระบุรี ปราจีนบุรี กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง พัทลุง สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- **เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่** เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบโภค-บริโภค พืชไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/2566 จำนวน 2,188 เครื่อง ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ จำนวน 136 เครื่อง โดยแบ่งแยกดังนี้

1. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 87 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด
2. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 15 เครื่อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด
3. ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 34 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด

- **เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ** รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

6. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 66)

6.1 วาดภัย ช่วงภัย 4 ก.พ. 66 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ แพร่ จันทบุรี อุทัยธานี ลำปาง เลย ตรวต ลำพูน เชียงราย พิจิตร ชุมพร กระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 6,458 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 16,750 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4,338 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 6,374 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 6,037 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 680 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1,090 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่และพืชผัก 555 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 535 ไร่ คิดเป็นเงิน 3.26 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 183 ราย (คิดเป็นร้อยละ 26.91 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 479 ไร่ วงเงิน 0.97 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 29.81 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6.2 อุทกภัย (ภาคใต้) ช่วงภัย 1 ธ.ค. 65 – 29 ม.ค. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ตรัง ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 10,364 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 82,071 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 26,099 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 8,162 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 47,809 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,577 ราย พื้นที่ 6,805 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4,569 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,742 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 494 ไร่ คิดเป็นเงิน 11.57 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ตรัง สุราษฎร์ธานี ปัตตานี สตูล กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร 7,836 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 19,599 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 13,407 ไร่ บ่อกุ้ง 6,192 ไร่ กระชัง 23,228 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 7,836 ราย พื้นที่ 19,599 ไร่ กระชัง 23,228 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 141.17 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 969 ราย (คิดเป็นร้อยละ 12.37 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 671 ไร่ กระชัง 5,559 ตร.ม. วงเงิน 5.65 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ปัตตานี พัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 65,308 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 5,948,600 ตัว แบ่งเป็น โค 146,148 ตัว กระบือ 3,119 ตัว สุกร 103,573 ตัว แพะ/แกะ 40,742 ตัว สัตว์ปีก 5,655,018 ตัว แปลงหญ้า 2,999 ไร่ **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 1,250 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 51,102 ตัว แปลงหญ้า 83 ไร่ คิดเป็นเงิน 20.56 ล้านบาท

6.3 อุทกภัย ช่วงภัย ส.ค. - 23 พ.ย. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 65 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร หนองคาย หนองบัวลำภู ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชัยนาท เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ตรด ปราจีนบุรี ปทุมธานี นครนายก นครปฐม กาญจนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ภูเก็ต ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สตูล สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 463,244 ราย พื้นที่ 4,147,759 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,770,252 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,343,928 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 33,579 ไร่ คิดเป็นเงิน 6,509.06 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 434,150 ราย (คิดเป็นร้อยละ 93.72 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 3,870,905 ไร่ วงเงิน 6,051.98 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 92.98 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พะเยา ลำปาง ลำพูน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ตรด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก นครปฐม ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ราชบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 26,121 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย 44,523 ไร่ กระชัง 36,864 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 301.52 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 23,106 ราย (คิดเป็นร้อยละ 88.46 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 40,184 ไร่ กระชัง 35,009 ตร.ม. วงเงิน 279.59 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 92.72 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ตาก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง เกษตรกร 3,918 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 412,405 ตัว แบ่งเป็น โค 43 ตัว กระบือ 13 ตัว สุกร 44 ตัว แพะ/แกะ 241 ตัว สัตว์ปีก 411,225 ตัว แปลงหญ้า 1,900 ไร่ คิดเป็นเงิน 21.77 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,590 ราย (คิดเป็นร้อยละ 91.63 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) สัตว์ตาย/สูญหาย 382,961 ตัว แปลงหญ้า 1,850 ไร่ คิดเป็นเงิน 20.01 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 91.91 ของวงเงินช่วยเหลือ)

6.4 อุทกภัย ช่วงภัย พ.ค. - 31 ก.ค. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ สระบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 21,164 ราย พื้นที่ 271,038 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 229,422 ไร่ พืชไร่ และพืชผัก 41,299 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ 317 ไร่ คิดเป็นเงิน 390.48 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 13,508 ราย (คิดเป็นร้อยละ 63.82 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 120,410 ไร่ วงเงิน 175.95 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 45.06 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 1,489 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,509 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 1,500 ไร่ บ่อกุ้ง 10 ไร่ กระชัง 563 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 7.340 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 66)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. แมลงสี	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นราธิวาส และสงขลา) จำนวน 15 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 6 ไร่	- แมลงสี ให้กำจัดด้วยพืชนาข้าว คั้นนาและรอบๆ แปลง จับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในนาข้าวนำมาทำลาย ตัวเต็มวัย
	2. หนอนกระทู้ข้าว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชลบุรี ราชบุรี และ พัทลุง) จำนวน 4 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 6 ไร่	ชอบกินเนื้อเน่า นำเนื้อเน่าแขวนไว้ตามนาข้าวและจับมาทำลาย หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวต่อเนื่องเพื่อลดการแพร่ขยายพันธุ์
	3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 200 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1,650 ไร่	- หนอนกระทู้ข้าว ให้หมั่นสำรวจ ไกล่กลัดดินในแปลง เพื่อทำลาย ดักแด้ที่อยู่ในดินหรือตอซัง กำจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณ
	4. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาญจนบุรี และเพชรบุรี) จำนวน 67 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	ไกล่เคียงเพื่อทำลายแหล่งอาศัย ไซสารมาแมลง เช่น มาลาไทออน 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร เพนโทโรไทออน 50% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบมีการระบาดรุนแรง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			- เพี้ยกระโดดสีน้ำตาล แนะนำวิธีวิธีการผลิตขยายเชื้อรา บิวเวอร์เรีย แนะนำให้ปลูกข้าวพันธุ์ค่อนข้างต้านทาน เพี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 60 ปทุมธานี 1 เป็นต้น และคุมน้ำในแปลงนาให้พอดีดินเปียก ปล่อยให้แห้งเองสลับกันไป - เพลี้ยไฟ ให้หมั่นสำรวจ ดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ ให้น้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบ เพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวอายุ 6-7 วัน หลังหว่าน ใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว ใช้สารฆ่าแมลง มาลาไธออน 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์บาริล 85% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบข้าวมีหนอนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในระยะข้าวอายุ 10-15 วันหลังหว่าน
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนกินใบมะพร้าว 3. แมลงดำหนาม 4. ตัวงวง 5. ตัวแรด 6. ไรสีขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ จันทบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,200 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 540 ไร่ การระบาดลดลง 514 ไร่ พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,614 ไร่ การระบาดลดลง 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (นครสวรรค์ ชลบุรี ตราด กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี สมุทรปราการ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,105 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ปัตตานี ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,369 ไร่ การระบาดลดลง 44 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ชัยภูมิ จันทบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ตราด นครปฐม สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 499 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	- รมรณรงค์ให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปลออยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมหนอนของแมลงดำหนามมะพร้าวในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับตัวงวงและตัวแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตตาโรเซียม เพื่อกำจัดตัวแรดในระยะดักด้ และระยะตัวหนอน - ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลายอยู่ภายในข้อผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัด ให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลายใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ปาล์ม น้ำมัน	1. ตัวแรด 2. ตัวงูหลาบ	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,126 ไร่ การระบาดลดลง 69 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 277 ไร่ การระบาดคงที่	- ใช้กาดักไฟโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาโรเซียม เพื่อกำจัดตัวแรดในระยะดักด้ และระยะตัวหนอน - พ่นตัวงูหลาบด้วยสารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน (Sevin) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์บิซัลแฟน (carbosulfan) 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7-10 วัน ในตอนเย็น

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. หนอนปลอกเล็ก 4. โรคลำต้นเน่า 5. โรคทะลายเน่า 6. โรคใบจุด 7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,548 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,901 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (นครสวรรค์ ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 78 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ยะลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 69 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 160 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนปลอกเล็ก พันธุ์เชอปีที (Bacillus thuringiensis) อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 5 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที โดยใช้เครื่องพ่นที่ปรับความดันได้ไม่น้อยกว่า 30 บาร์ และพ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - รณรงค์ให้เกษตรกรตัดทะลายที่เป็นโรคทะลายเน่าของปาล์มน้ำมันออกไปเผาทำลายนอกแปลง - แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลง ตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - สำรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายในช่วงฤดูฝน โดยสำรวจสัปดาห์ละครั้ง ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลงเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ของสปอร์ไปยังต้นอื่นๆ
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคราแป้ง 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ปัตตานี นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 599 ไร่ การระบาดลดลง 107 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ลำปาง นครศรีธรรมราช และสตูล) จำนวน 134 ไร่ การระบาดลดลง 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ปัตตานี พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,090 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง และภูเก็ต) จำนวน 64,885 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนานาคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารารุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ และทำร่องบริเวณโคนต้นยางพาราให้ร่องขวางกับลำต้น เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามลงสู่ราก
กาแฟ	1. หนอนเจาะกิ่ง/ลำต้นกาแฟ 2. โรคราสนิม 3. โรคใบจุดตากบ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 38 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 73 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และระยอง) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรค - หนอนเจาะกิ่ง/ลำต้นกาแฟ ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเฟนิโตรไธออน (fenitrothion) (ซูมิไธออน (sumithion) 50% EC) ในอัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ในระยะเวลาของช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู 3. เพลี้ยหอย 4. ไรแดงมันสำปะหลัง 5. โรคพุ่มแฉ้	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ขอนแก่น สกลนคร ชลบุรี มุกดาหาร จันทบุรี กาญจนบุรี และระยอง) จำนวน 654 ไร่ การระบาดลดลง 180 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 607 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (น่าน กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร ชลบุรี และกาญจนบุรี) จำนวน 23 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และกาญจนบุรี) จำนวน 6,967 ไร่ การระบาดลดลง 2,162 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กำแพงเพชร สกลนคร อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และกาญจนบุรี) จำนวน 394 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 36 ไร่	- เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ไถและพรวนดิน ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด เมื่อพบการระบาด ถอนต้นมันสำปะหลังและเก็บทำลาย - การควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ปลอ่ยให้กระจายทั่วแปลง ให้เจริญเติบโต และขยายพันธุ์ได้อย่างน้อย 10 เท่า ในทุกชั่วอายุ โดยปลอ่ยในอัตรา 50 คู่ ต่อไร่ เมื่อพบการระบาดรุนแรง และหลังปลอ่ยแตนเบียนและหลังปลอ่ยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ให้งดการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช - เพลี้ยหอย ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากเพลี้ยหอย ให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลง ได้แก่ มาลาไทออน (malathion) 83% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร ไทอะมีโทกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรา 4 กรัม อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG อัตรา 4 กรัม โดยเลือกใช้สารและแช่ท่อนพันธุ์นาน 10 นาที ผึ่งให้แห้งก่อนปลูก - ไรแดง ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน หากเริ่มพบการเข้าทำลายของไรแดงควรเก็บทิ้งหรือทำลาย

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	6. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว และกาญจนบุรี) จำนวน 39,174 ไร่ การระบาดลดลง 1,442 ไร่	- โรคพุ่มแจ้ ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่ แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด และกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - โรคใบด่างมันสำปะหลัง ไม่ใช่ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการ ระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของ โรคใบด่างด้วย 3 วิธี ดังนี้ วิธีฝังกลบ วิธีใส่ถุง/กระสอบ วิธีบดสับ
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคเส้ด้า	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุตรดิตถ์ ขอนแก่น และ นครราชสีมา) จำนวน 135 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (อุทัยธานี) จำนวน 6 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ใช้ช่วงที่พบกลุ่มไข่ของ หนอนกออ้อย ปล่อยแมลงหางหนีบอัตรา 500 ตัวต่อไร่ เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือน ควรพ่นสารฆ่าแมลงเคลทาเมทริน 3% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2-3 ครั้ง ห่าง 14 วัน เมื่อพบการระบาดของหนอนกออ้อย ควรพ่น สารฆ่าแมลง ได้แก่ อินโดกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 15 มิลลิลิตร หรือคลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร - โรคเส้ด้า เมื่อพบกออ้อยเริ่มแสดงอาการเส้ด้า ควรตัดออก ก่อนที่เหี่ยวหุ้มเส้ด้าจะหลุดออก นำใส่ถุงไปทำลายนอกแปลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังกอข้างเคียง
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กาญจนบุรี ยะลา สงขลา และสตูล) จำนวน 64 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง - แนะนำเกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทาน และคลุมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง และภูเก็ต) จำนวน 83 ไร่ การระบาดคงที่	- ทำความสะอาดแปลง เตรียมดินให้ตัดต้นและปั่นตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากเหง้าต้นสับปะรด และซากวัชพืช หรือเมื่อพบต้นเป็นโรคให้ถอนต้นสับปะรด ที่แสดงอาการใส่ถุงพลาสติกไปทำลายนอกแปลง
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. ไรแดงแอฟริกา 5. โรครากเน่าโคนเน่า 6. โรคใบติดหรือใบไหม้ 7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ยะลา ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 770 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (พิษณุโลก จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 162 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 616 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และยะลา) จำนวน 899 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 105 ไร่ พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,460 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 35 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 544 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 479 ไร่ การระบาดคงที่	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาดบริเวณ ผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไก่แจ้ ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่สำหรับต้น ที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - ไรแดงแอฟริกา กำจัดวัชพืชในสวน การใช้สารฆ่าไรไม่ควร ฉีดพ่นสารชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานาน เมื่อพบไรแดง แอฟริการะบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไพโรพาร์ไทด์ (propargite) 30 % WP อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ (amitraz) 20 % EC อัตรา 30 มิลลิลิตร เฮกซีไทอะซอกซ์ (hexythiazox) 2% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร พ่นทุก 7-10 วัน - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจ สวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคใบติดหรือใบไหม้ หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืช ที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่น นำไปทำลายนอกแปลง ตัดแต่ง ทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก ลดการใส่ปุ๋ย ไนโตรเจนสูง ในพื้นที่ปลูกที่มีความชื้นสูง - โรคใบจุดสาหร่าย หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มมีอาการของโรคให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไป ทำลาย หรือฝังดิน ดูแลการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม เพื่อ ให้ทุเรียนรับแสงแดด และอากาศถ่ายเทได้ดีเพื่อลดความชื้น

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคนิ่วจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 14 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 33 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 16 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคนิ่วจุดสาหร่าย เก็บรวบรวมไปเผาทำลาย ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เมื่อพบใบแก่ถูกทำลายมากกว่าร้อยละ 30 ตัดต้น แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ให้สังเกตดูใบเพสลาด ใบอ่อน และใบแก่
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง ระยอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 356 ไร่ การระบาดลดลง 156 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 417 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 83 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนขอนใบอย่างสม่ำเสมอ โดยให้สังเกตดูที่ใต้ใบมังคุดจะพบรอยทางยาวเป็นเส้นสีขาว
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคพุ่มไม้กวาด 3. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี ระยอง และสมุทรสาคร) จำนวน 14 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 255 ไร่ การระบาดลดลง 24 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ น่าน พะเยา และจันทบุรี) จำนวน 687 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่	- เพลี้ยแป้ง ให้หมั่นสำรวจแปลงลำไยทุกสัปดาห์หากพบการระบาดแนะนำให้ตัดส่วนของกิ่งก้านที่มีเพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ไปทำลาย หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด มาลาไธออน (Malathion) 83% W/V EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และไพรีทรอยด์ (Pyrethroids) (อัตราส่วนตามฉลาก) พ่นให้ทั่ว - โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ - โรคราดำ ให้ป้องกันและกำจัดแมลงพวกปากดูด เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยเพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยอ่อน เป็นต้น โดยพ่นสารเคมีเช่น คาร์บาริล (Carbaryl) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ และเบตาไซฟลูทรีน

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 66)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 7 พฤษภาคม 2566 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 33 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 26 จุด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์ และสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้

8.2 โรคล้มปัสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 66)

พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 23 เมษายน 2566 รวม 70 จังหวัด 899 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 632,468 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 19,456 ตัว สัตว์ตายสะสม 67,315 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคแก่เกษตรกรเพื่อเฝ้าระวังโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 207,473 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 38,467 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 228,002 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 175,180 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 138,631 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 444,383 ราย