



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

วันที่ 29 กันยายน 2566 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.

ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 28 ก.ย. 66 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 29 ก.ย. 66



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	นครนายก	122.9	ฝนตกหนักมาก
2	อ.ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	103.6	ฝนตกหนักมาก
3	อ.เมือง	เพชรบูรณ์	86.9	ฝนตกหนัก
4	อ.เมือง	ร้อยเอ็ด	83.7	ฝนตกหนัก
5	อ.เถิน	ลำปาง	77.5	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>900 มม.) ฝนตกหนัก (351-900 มม.) ฝนตกปานกลาง (101-350 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-100 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์อุทกภัย น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

จากสถานการณ์ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทย มีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่ 1 - 29 ก.ย. 66 รวม 43 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยาแพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรีอ่างทอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และจังหวัดสตูล ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 22 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 21 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ (อ.อมก๋อย อ.ฮอด อ.แม่ออน อ.จอมทอง อ.เมือง) ตาก (อ.เมือง อ.บ้านตาก อ.สามเงา อ.แม่สอด อ.อุ้มผาง)แพร่ (อ.วังชิ้น อ.ลอง) ลำปาง (อ.เถิน อ.แม่พริก) สุโขทัย (อ.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสำโรง อ.สวรรคโลก อ.กงไกรลาศ อ.บ้านด่านลานหอย) กาฬสินธุ์ (อ.เขาวง อ.นาคู อ.สมเด็จ อ.กุฉินารายณ์ อ.ห้วยผึ้ง อ.ดอนจาน อ.เมือง อ.ร่องคำ อ.กมลาไสย อ.ห้วยเม็ก อ.ท่าคันโท อ.สามชัย อ.ฆ้องชัย อ.นามน) ชัยภูมิ (อ.หนองบัวระเหว อ.คอนสาร) นครพนม (อ.เมือง อ.ปลาปาก อ.นาแก อ.นาทม อ.เรณูนคร อ.ธาตุพนม อ.ท่าอุเทน อ.โพนสวรรค์ อ.บ้านแพง อ.นาหว้า อ.ศรีสงคราม อ.วังยาง) มหาสารคาม (อ.เชียงยืน อ.โกสุมพิสัย) ยโสธร (อ.เมือง อ.กุตุ้ม อ.ทรายมูล อ.คำเขื่อนแก้ว อ.มหาชนะชัย อ.ค้อวัง อ.เลิงนกทา อ.ไทยเจริญ อ.ป่าดัว) ร้อยเอ็ด (อ.เสลภูมิ อ.อาจสามารถ อ.ทุ่งเขาหลวง อ.ธวัชบุรี อ.เชียงขวัญ อ.จันทาร อ.โพธิ์ชัย อ.สุวรรณภูมิ อ.เมืองสรวง อ.เมยวดี) เลย (อ.ภูกระดึง) ศรีสะเกษ (อ.กันทรารมย์) อุดรธานี (อ.ภูแก้ว อ.กุมภวาปี อ.ประจักษ์ศิลปาคม อ.หนองหาน อ.พิบูลย์รักษ์ อ.ทุ่งฝน อ.กุดจับ อ.โนนสะอาด

อ.หนองวัวซอ อ.เมือง อ.บ้านฝ้อ อ.บ้านดุง อ.หนองแสง อ.เพ็ญ อ.ศรีธาตุ) **อุบลราชธานี** (อ.เมือง อ.เดชอุดม อ.วารินชำราบ อ.ม่วงสามสิบ อ.ตระการพืชผล อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง อ.ตาลสุม อ.เซียงโน) **อำนาจเจริญ** (อ.เมือง อ.หัวตะพาน อ.พนา อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา อ.สิโสมอ.อำนาจ อ.ขามเฒ่า) **ปราจีนบุรี** (อ.กบินทร์บุรี อ.ประจันตคาม อ.นาดี อ.เมือง) **จันทบุรี** (อ.ขลุง อ.มะขาม อ.เขาฉกรรจ์ อ.นายายอาม อ.โป่งน้ำร้อน) **ตราด** (อ.เมือง อ.บ่อไร่ อ.เขาสมิง) **ลพบุรี** (อ.เมือง อ.บ้านหมี่) และ **สตูล** (อ.ท่าแพ อ.เมืองสตูล อ.ควนโดน)

ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 66)

● **ด้านพืช** พื้นที่ได้รับผลกระทบ 30 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลพบุรี จันทบุรี ตราด และจังหวัดสตูล เกษตรกร 93,328 ราย พื้นที่ 681,924 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 512,989 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 162,371 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 6,564 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 157 ราย พื้นที่ 1,194 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,123 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 34 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 37 ไร่ คิดเป็นเงิน 1.72 ล้านบาท

● **ด้านประมง** พื้นที่ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยา เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี ลพบุรี และจังหวัดตราด เกษตรกร 4,099 ราย พื้นที่ 4,312 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 4,302 ไร่ บ่อกุ้ง 10 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

● **ด้านปศุสัตว์** พื้นที่ได้รับผลกระทบ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และจังหวัดจันทบุรี เกษตรกร 4,627 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 199,302 ตัว แบ่งเป็น โค 10,196 ตัว กระบือ 3,636 ตัว สุกร 4,948 ตัว แพะ/แกะ 323 ตัว สัตว์ปีก 180,199 ตัว แปลงหญ้า 601 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 66)

1. สนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

- 1.1 เครื่องสูบน้ำ 25 เครื่อง แบ่งเป็น สุโขทัย(3) นครพนม(4) สกลนคร(3) ศรีสะเกษ(2) สุรินทร์(1) อุดรธานี(5) อุบลราชธานี(2) สตูล(2)
- 1.2 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 3 เครื่อง คือ พระนครศรีอยุธยา(3)
- 1.3 เครื่องผลักดันน้ำ 22 เครื่อง แบ่งเป็น นครพนม(4) สกลนคร(4) อุดรธานี(8) สตูล(6)
- 1.4 กระสอบทราย 1,750 ใบ แบ่งเป็น ร้อยเอ็ด(1,250) อุบลราชธานี(500)
- 1.5 เครื่องจักร-เครื่องมืออื่นๆ ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา(1)

2. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ 110 ตัน ถูยั้งชีพสัตว์ 364 ถูย ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 913 ชุด รักษาสัตว์ 311 ตัว และอพยพสัตว์ 14,874 ตัว

3. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 66)

3.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 50,652 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 ปริมาณน้ำใช้การได้ 26,712 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (56,347 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74) น้อยกว่าปี 2565 จำนวน 5,695 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 671.19 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 164.66 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 25,755 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 46,857 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 23,320 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (51,803 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 73) น้อยกว่าปี 2565 จำนวน 4,946 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 478.33 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 73.78 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 24,139 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่าง	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่าง	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่าง	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	13,330	54	6,586	36	80	1,083	723	67	633	64	88	25,908	14,053	54	7,218	38	11,854
ตอน.	12	8,368	6,644	79	4,993	74	226	2,061	1,738	84	1,570	83	238	10,429	8,382	80	6,564	76	2,117
กลาง	3	1,419	427	30	367	27	27	419	256	61	232	59	30	1,838	683	37	599	34	1,154
ตะวันออก	2	26,605	20,132	76	6,855	51	8	164	68	42	57	38	10	26,769	20,200	75	6,912	51	6,568
ตะวันออก	6	1,515	867	57	772	54	52	1,006	696	69	640	67	58	2,520	1,563	62	1,412	60	958
ใต้	4	8,194	5,457	67	3,746	58	42	679	314	46	260	42	46	8,874	5,771	65	4,006	56	3,103
รวม	35	70,926	46,857	66	23,320	49	435	5,411	3,795	70	3,392	68	470	76,337	50,652	66	26,712	51	25,755

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 12,913 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 6,217 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 171.75 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 7.79 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 11,958 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	6,809	51	3,009	31	121.81	46.22	3.00	3.00	6,653
สิริกิตี	5,368	56	2,518	38	20.20	30.02	3.92	4.00	4,142
ภูมิพล+สิริกิตี	12,177	53	5,527	34	142.01	76.24	6.92	7.00	10,795
แควน้อยฯ	449	48	406	45	9.78	10.76	0.43	0.86	490
ป่าสักชลสิทธิ์	287	30	284	30	19.96	19.94	0.44	0.44	673
รวมทั้งหมด	12,913	52	6,217	34	171.75	106.95	7.79	8.30	11,958

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 5 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (30%) อ่างฯ ทับเสลา (19%) อ่างฯ กระเสียว (21%) อ่างฯ คลองสิียด (17%) และอ่างฯ ปรานบุรี (26%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำน่าน แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำบางปะกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำยม แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วม

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 937 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 908 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +20.01 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 5.69 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 554 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 516 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.70 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.75 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +8.95 ม.รทก. (เมื่อวาน +8.75 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 71 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 108 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 50 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 20 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 1 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระราม 217 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 187 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 22 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 26 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลา) 7 ลบ.ม./วินาทีและผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 5 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 323 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 346 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 34 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 9 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 110 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 125 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 45 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 876 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 840 ลบ.ม./วินาที)

3.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		23 ก.ย. 66	24 ก.ย. 66	25 ก.ย. 66	26 ก.ย. 66	27 ก.ย. 66	28 ก.ย. 66	29 ก.ย. 66		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.13	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

3.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 29 ก.ย. 66	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	4.04	-8.76
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	8.84	-7.16
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	6.42	-5.78
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	7.78	-4.22
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	8.10	-4.40
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	10.79	-3.71

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 11 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ ระยอง อำเภอดำรงวิทยารพช. และจังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ที่ประสบภัยแล้ง และเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำ

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16 - 28 กันยายน 2566)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร(5) ตาก(3) พะเยา(1) พิจิตร(6) พิษณุโลก(4) ลำปาง(1) ลำพูน(6) สุโขทัย(8) อุตรดิตถ์(3) เพชรบูรณ์(5)
กลาง	กาญจนบุรี(9) ชัยนาท(1) นครสวรรค์(9) พระนครศรีอยุธยา(1) ลพบุรี(4) สระบุรี(13) สุพรรณบุรี(5) อุทัยธานี(8) อ่างทอง(1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น(8) ชัยภูมิ(4) นครราชสีมา(22) บุรีรัมย์(6) มหาสารคาม(6) ร้อยเอ็ด(4) สุรินทร์(3) เลย(1)
ตะวันออก	จันทบุรี(2) ฉะเชิงเทรา(4) ชลบุรี(10) ปราจีนบุรี(5) ระยอง(8) สระแก้ว(9)
ใต้	ชุมพร(1) นครศรีธรรมราช(8) ประจวบคีรีขันธ์(8) พัทลุง(11) ภูเก็ต(3) ราชบุรี(8) สงขลา(6) สมุทรสงคราม(2) สุราษฎร์ธานี(3) เพชรบุรี(7)
รวม	43 จังหวัด (242 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 28 กันยายน 2566

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวน เที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
เชียงใหม่	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากท้องฟ้าปิดกับมีฝนตกเป็นระยะ ประกอบกับติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่
ตาก	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากท้องฟ้าปิดกับมีฝนตกเป็นระยะ ประกอบกับติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่
พิษณุโลก	1	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกปานกลางบริเวณ จ.เพชรบูรณ์ (หนองไผ่ ชนแดน เมืองเพชรบูรณ์) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนา อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จ.เพชรบูรณ์

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวน เที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
ลพบุรี	4	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุภัยแล้ง มีฝนตกปานกลางบริเวณ จ.นครสวรรค์ (ตากลี ตากฟ้า พยุหะคีรี ไผ่ศาลี ท่าตะโก หนองบัว) จ.ลพบุรี (บ้านหมี่ หนองม่วง โคกเจริญ ชัยบาดาล) จ.สระบุรี (พระพุทธบาท เสาไห้) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี จ.เพชรบูรณ์ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จ.ลพบุรี บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
กาญจนบุรี	6	การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.กาญจนบุรี (เลาขวัญ ห้วยกระเจา) จ.สุพรรณบุรี (อู่ทอง ดอนเจดีย์ หนองหญ้าไซ)
ขอนแก่น	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากท้องฟ้าปิด มีฝนตกบริเวณสนามบินและพื้นที่โดยรอบเป็นระยะ ตลอดทั้งวัน
นครราชสีมา	3	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.นครราชสีมา (สีคิ้ว เทพารักษ์ ด่านขุนทด พระทองคำ ขามสะแกแสง) จ.ชัยภูมิ (เทพสถิต บำเหน็จณรงค์ ชัยใหญ่ จัตุรัส เนินสง่า หนองบัวระเหว บ้านเขว้า เมืองชัยภูมิ) จ.ลพบุรี (ลำสนธิบ้านหมี่ หนองม่วง โคกเจริญ ชัยบาดาล) จ.สระบุรี (พระพุทธบาท เสาไห้) จ.เพชรบูรณ์ (ศรีเทพ วิเชียรบุรี) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
สุรินทร์	3	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.บุรีรัมย์ (โนนดินแดง ปะคำ ละหานทราย) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์
ระยอง	2	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.ฉะเชิงเทรา (ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต) จ.ชลบุรี (บ่อทอง) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสิียด จ.ฉะเชิงเทรา
อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากลมที่ระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง ส่งผลให้กลุ่มเมฆเคลื่อนตัว ออกจากพื้นที่เป้าหมายรวดเร็ว
นครศรีธรรมราช	2	การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุภัยแล้ง มีฝนตกบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง จุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ พระพรหม เมืองนครศรีธรรมราช เขียวใหญ่) และบริเวณพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช
รวม	21	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (15 กุมภาพันธ์ – 28 กันยายน 2566)

ตั้งแต่เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 28 กันยายน 2566 การขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 178 วัน ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 3,834 เที่ยวบิน (5,879:02 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 3,244.1 ตัน พลุสารพัดความขึ้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 268 นัด พลุสารพัดความขึ้นแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน 386 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์ สำหรับการกักปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1,578 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 67 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย สกลนคร นครพนม หนองคาย บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ บึงกาฬ มุกดาหาร หนองบัวลำภู นครราชสีมา อุรธานี มหาสารคาม กาญจนบุรี ร้อยเอ็ด อุทัยธานี นครสวรรค์ สุรินทร์ จันทบุรี ตรัง ยโสธร อุบลราชธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม ชัยนาท นครนายก ลพบุรี ระยอง สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง พัทลุง ภูเก็ต สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบลโกศ-บริโกศ พืชไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2566 จำนวน 2,289 เครื่อง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ ประจำวันที่ 28 กันยายน 2566 ไม่มีการช่วยเหลือ

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

6. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 66)

6.1 อุทกภัย ช่วงภัย 6 มิ.ย. – 29 ส.ค. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ตาก พิชณุโลก แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ นครพนมหนองคาย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตรัง หนอง และจังหวัดสตูล เกษตรกร 38,714 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 195,277 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 182,637 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 8,290 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,350 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 10,678 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 84,098 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 79,412 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 4,602 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 84 ไร่ คิดเป็นเงิน 115.88 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 85 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.80 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 191 ไร่ วงเงิน 0.34 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน นครพนม กระบี่ หนอง และจังหวัดสตูล เกษตรกร 797 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 548 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 545 ไร่ บ่อกุ้ง 3 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 289 ราย พื้นที่ 170 ไร่ กระชัง 854 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 1.08 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 216 ราย (คิดเป็นร้อยละ 74.74 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 128 ไร่ กระชัง 755 ตร.ม. วงเงิน 0.88 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 81.48 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6.2 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 22 พ.ค. 66 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร อุทัยธานี นครราชสีมา ชัยนาท สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 64,218 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1,148,605 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 842,445 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 306,031 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 129 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 6,271 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 97,706 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 40,301 ไร่ พืชไร่ และพืชผัก 57,349 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 56 ไร่ คิดเป็นเงิน 167.78 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 29 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.46 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 427 ไร่ วงเงิน 0.84 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6.3 วาตภัย ช่วงภัย 8 พ.ค. 66 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พะเยา เพชรบูรณ์ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร เพชรบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ตรัง หนอง และจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 1,508 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 7,155 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,245 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 2,973 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 937 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 491 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 2,596 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 938 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,328 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 330 ไร่ คิดเป็นเงิน 5.22 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 327 ราย (คิดเป็นร้อยละ 66.60 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 1,319 ไร่ วงเงิน 2.68 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 51.34 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6.4 ภัยแล้ง ช่วงภัย 27 มี.ค. – 31 พ.ค. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร เกษตรกร 15,279 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 22,111 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 120 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,199 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 20,792 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 726 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 1,690 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 20 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 367 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 1,303 ไร่ คิดเป็นเงิน 6.03 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 648 ราย (คิดเป็นร้อยละ 89.26 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 1,311 ไร่ วงเงิน 5.14 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 85.21 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 66)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 3. เพลี้ยไฟ 4. โรคไหม้ข้าว 5. หนอนกอข้าว 6. แมลงดำหนาม 7. โรคใบจุดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี และสงขลา) จำนวน 935 ไร่ การระบาดลดลง 1,859 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และน่าน) จำนวน 137 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 59 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุรินทร์) จำนวน 10 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (ตาก น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ ลำพูน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี และจันทบุรี) จำนวน 6,013 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,128 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา มหาสารคาม และสงขลา) จำนวน 6 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 70 ไร่ การระบาดลดลง 130 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สกลนคร และสงขลา) จำนวน 31 ไร่ การระบาดลดลง 101 ไร่	- เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ให้อนุรักษศัตรูธรรมชาติเพื่อใช้ควบคุมการระบาด เช่น มวนเขียวจุดไข่ แมงมุมสุนัขป่า เป็นต้น ควบคุมระดับน้ำ โดยการระบายน้ำออกเป็นครั้งคราวแบบเปียกสลับแห้ง เมื่อตรวจพบตัวเต็มวัย หรือตัวอ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง - เพลี้ยกระโดดหลังขาว แนะนำปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน เช่น สุพรรณบุรี 60 ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 กข31 และชุมแพ 60 ปลูกสลับกันอย่างน้อย 2 พันธุ์ ป้องกันไม่ให้เพลี้ยกระโดดหลังขาวปรับตัวทำลายข้าวพันธุ์ต้านทานได้เร็ว หรือถ้าปลูกข้าวพันธุ์เดียวไม่ควรปลูกติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก เมื่อพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัวต่อต้นให้ใช้น้ำออกจากแปลงนาและปฏิบัติเช่นเดียวกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล - เพลี้ยไฟ ให้หมั่นสำรวจแปลงข้าวระยะกล้า 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ ไข่น้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อพบตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวอายุ 6-7 วัน หลังหว่าน ใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว และใช้สารฆ่าแมลงมาลาไธออน 83% EC อัตรา 20 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นใบข้าว - โรคไหม้ข้าว ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ฟันเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร - หนอนกอข้าว ให้เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ไข่น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง - แมลงดำหนาม หมั่นสำรวจแปลง และกำจัดวัชพืชบริเวณแปลงนา อนุรักษศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนไข่ แตนเบียนหนอน หากพบจำนวนตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามข้าว มากกว่า 2 ตัวต่อกอ ควรใช้สารป้องกันกำจัดแมลง - โรคใบจุดสีน้ำตาล แนะนำให้ปรับปรุงดินโดยการไถกลบฟาง คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าพบอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาลรุนแรง ควรพ่นด้วย สารป้องกันกำจัดเชื้อรา
มะพร้าว	1. หนอนกินใบมะพร้าว 2. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 8,886 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2,029 ไร่	- รมรงค์ให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวและหนอนหัวดำทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ อัตราไร่ละ 200 ตัว และปลอ่ยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเตส เพื่อควบคุมหนอนของแมลงดำหนามมะพร้าวในพื้นที่ และปลอ่ยแตนเบียนเตตระสตีดัส ควบคุมดักแด้แมลงดำหนามมะพร้าว

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,742 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 232 ไร่</u>	- ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงและด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้
	4. ด้วงงวง	พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,300 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่</u>	- โรสี้ชาจะเข้าทำลายอยู่ภายในข้อผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ เข้าทำลายใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
	5. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ปัตตานี ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,180 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่</u>	
	6. โรสี้ชามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร และชุมพร) จำนวน 497 ไร่ <u>การระบาดลดลง 4 ไร่</u>	
ปาล์ม น้ำมัน	1. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,665 ไร่ <u>การระบาดลดลง 24 ไร่</u>	- รมรงค์ให้เกษตรกรกำจัดทะลายที่เป็นโรคทะลายเน่าของปาล์มน้ำมันออกไปเผาทำลายนอกแปลง
	2. ด้วงกุหลาบ	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 498 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่</u>	- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน
	3. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,407 ไร่ <u>การระบาดลดลง 200 ไร่</u>	- พ่นด้วงกุหลาบด้วยสารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน (Sevin) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 20% EC
	4. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,826 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 320 ไร่</u>	- หนอนปลอกเล็ก พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน
	5. โรคทะลายเน่า	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 62 ไร่ <u>การระบาดลดลง 9 ไร่</u>	- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
	6. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 81 ไร่ <u>การระบาดลดลง 9 ไร่</u>	- แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลง ตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที
			- เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน และตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที
			- เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายในช่วงฤดูฝน สัปดาห์ละครั้งตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 979 ไร่ <u>การระบาดลดลง 23 ไร่</u>	
ยางพารา	1. โรคราขาว 2. โรคราแป้ง 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ปัตตานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา พัทลุง สงขลา และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,498 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครศรีธรรมราช) จำนวน 100 <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ตรัง ปัตตานี นครศรีธรรมราช พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,324 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1,174 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ปึงกาฬ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 93,985 ไร่ <u>การระบาดลดลง 855 ไร่</u>	- คำนแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคราขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนาตคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ และทำร่องบริเวณโคนต้นยางพารา ให้ร่องขวางกับลำต้น เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามลงสู่ราก
กาแฟ	1. โรคราสนิม 2. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่) จำนวน 8 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง - หนอนกาแฟสีแดง หมั่นทำความสะอาดแปลงและตรวจดู ตามกิ่งและลำต้นกาแฟอยู่เสมอ หากพบการเข้าทำลายของ หนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟสีแดง ให้ตัดกิ่งและลำต้น ออกไปเผาทำลายนอกแปลง ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเพนิโตรฮอน อัตรา 80 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และนำไปพ่นด้วยแปรัง ทาสีบริเวณลำต้นกาแฟให้ทั่ว
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลังสีชมพู 3. เพลี้ยหอย 4. ไรแดงมันสำปะหลัง 5. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง 6. โรคพุ่มแจ้	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ขอนแก่น จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 121 ไร่ <u>การระบาดลดลง 27 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และอุบลราชธานี) จำนวน 4 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 13 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (นครราชสีมา สุรินทร์ ชลบุรี อุบลราชธานี จันทบุรี ระยอง และกาญจนบุรี) จำนวน 583 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 32 จังหวัด (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร โยธะ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ชัยนาท สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ สุพรรณบุรี) จำนวน 97,170 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 3,728 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ขอนแก่น อุบลราชธานี จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 60 ไร่ <u>การระบาดลดลง 4 ไร่</u>	- เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ไถและพรวนดิน ใช้ท่อนพันธุ์ ที่สะอาด เมื่อพบการระบาด ถอนต้นมันสำปะหลังและ เก็บทำลาย - การควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติแตนเบียนเพลี้ยแป้งมัน สำปะหลังสีชมพู ปลอ่ยให้กระจายตัวแปลงให้เจริญเติบโต และ ขยายพันธุ์ได้น้อย 10 เท่า ในทุกชั่วอายุ - เพลี้ยหอย ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากเพลี้ยหอย ให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลง ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 80 มิลลิตร โทะอะมีโทกแซม 25% WG - ไรแดง ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน หากเริ่มพบการเข้าทำลาย ของไรแดงควรเก็บทิ้งหรือทำลาย - โรคใบด่างมันสำปะหลัง ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบ การระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - โรคพุ่มแจ้ ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่ แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด และกำจัดวัชพืชที่แหล่ง พักเชื้อ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (เชียงใหม่ ตาก พะเยา อุทัยธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยนาท จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี ยะลา สงขลา และสตูล) จำนวน 12,341 ไร่ การระบาดลดลง 39 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และภูเก็ต) จำนวน 91 ไร่ การระบาดคงที่	- ทำความสะอาดแปลง ส่วนการเตรียมดินให้ตัดต้นและปั่น ต่อเก่าสับปะรดทิ้งไว้ 2 - 3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้น สับปะรดทำลายนอกแปลง เพื่อกำจัดไวรัสและแมลงพาหะ ก่อนปลูกต้องมีการไถและพรวนดินหลายๆ ครั้ง ตากดิน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งแช่หน่อพันธุ์เพื่อกำจัดเชื้อ แบคทีเรียที่ติดมากับหน่อพันธุ์ ด้วยสารเคมีกำจัดแมลง เมื่อพบ ต้นเป็นโรคให้ถอนต้นสับปะรดที่แสดงอาการใส่ถุงพลาสติก ไปทำลายนอกแปลง
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนวดยาว 3. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยนาท และนครราชสีมา) จำนวน 3,867 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (พิจิตร) จำนวน 500 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา) จำนวน 61 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ในช่วงที่พบกลุ่มไข่ของ หนอนกออ้อย ปล่อยแมลงหางหนีบอัตรา 500 ตัวต่อไร่ - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว แช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนปลูก ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และ ให้น้ำอย่างเพียงพอ เมื่อพบต้นที่เป็นโรคชุดและนำไปทำลาย
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชุมพร และภูเก็ต) จำนวน 1 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 31 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 24 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น จันทบุรี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 57 ไร่ การระบาดลดลง 73 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบ โคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่าย เก็บรวบรวมไปเผาทำลาย ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ให้สังเกตดูใบเพสลาด ใบอ่อน และใบแก่ - โรคราแป้ง เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไป เผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผลหมั่น ตรวจดูหากพบว่าราแป้งเข้าทำลายให้ทำการพ่นด้วยผง กำมะถันละลายน้ำ 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทำให้การระบาด ในช่วงติดผลนั้นลดความรุนแรงลงได้ ในช่วงระยะผลอ่อน หากพบอาการของโรคราแป้งควรเลือกใช้สารป้องกันกำจัด โรคพืช ได้แก่ บีโนมิล คาร์เบนดาซิม ไตรดีมอร์ฟ ไตรฟลูโพรรีน ไพราโซฟอส ไดโนแคป โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 235 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสงขลา) จำนวน 406 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และยะลา) จำนวน 248 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยไก่แจ้ ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่สำหรับต้น ที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายทิ้งนอกแปลง หากบริเวณผลทุเรียน ให้ใช้น้ำพ่น - ไรแดงแอฟริกา กำจัดวัชพืชในสวน เมื่อพบระบาดรุนแรงให้ใช้ สารกำจัดแมลง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. ไรแดงแอฟริกา	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 369 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 5 ไร่	- โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคใบติดหรือใบไหม้ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่นนำไปทำลายนอกแปลง ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกลดการไล่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง ในพื้นที่ปลูกที่มีความชื้นสูง
	5. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (เพชรบูรณ์ บึงกาฬ จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 3,904 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5 ไร่	- โรคใบจุดสาหร่าย เมื่อเริ่มมีอาการของโรคให้ตัดใบหรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หรือฝังดิน ดูแลการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม - หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียนเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกทำลายเผาทิ้ง พบในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำ ผสมไวด์ออกซ์ 67% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่ว ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียนเข้าทำลาย
	6. โรคใบติดหรือใบไหม้	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 272 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่	- หมั่นสำรวจแปลงปลูกทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ คาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/ไซเปอร์เมทริน / โฟซิโลน 6.25% / 22.5% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตร โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน
	7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 458 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 13 ไร่	- ป้องกันวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% CS อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัม เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทั่วกันครั้งละ 1 สัปดาห์ เริ่มเมื่อผลอายุ 6 สัปดาห์ และ
	8. เพลี้ยหอยเกล็ด	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 141 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 21 ไร่	ห่อด้วยถุงพลาสติก เจาะกันถุงเพื่อระบายน้ำ เมื่อผลอายุ 10 สัปดาห์ เลือกห่อเฉพาะผลที่มีมาตรฐาน ก่อนห่อควรสำรวจ ถ้าพบเพลี้ยแบ่งระบาดควรพ่นสาร คลอร์ไพริฟอส อัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร และตัวเต็มวัยให้ใช้สารกำจัดแมลง
	9. เพลี้ยจักจั่นฝอย	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 339 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 15 ไร่	- กำจัดวัชพืชในแปลง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นการลดความชื้นสะสม หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบคราบราสีดำ พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดำ และสารเหนียวที่แมลงปากดูดซับเอาไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค
	10. หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน	พื้นที่ระบาด 4 ไร่ (ตราด กระบี่ นราธิวาส และยะลา) จำนวน 966 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1,365 ไร่	- ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อเป็นการลดความชื้นสะสม ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลงหรือเผื่อนเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% WVP ผสมน้ำขึ้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด
	11. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 191 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 93 ไร่	- หมั่นตรวจดูตามผลทุเรียน เมื่อพบรอยทำลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือสากแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทำลายควรเก็บทำลายโดยเผาไฟหรือฝังและการห่อผลด้วยถุงมุ้งไนลอน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำ ระบายออก โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปจะช่วยลดความเสียหายได้
	12. โรคราสีชมพู	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 182 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 6 ไร่	
	13. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 161 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 601 ไร่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนชอนใบ 4. โรคนิ่ว 5. โรคแอนแทรคโนส 6. โรคนิ่วสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง และ ชุมพร) จำนวน 180 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 289 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 106 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 341 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 102 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง สงขลา และนราธิวาส) จำนวน 189 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่	- หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอน จะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน - หมั่นสำรวจและสังเกตการณ์เข้าทำลายของหนอนชอนใบ อย่างสม่ำเสมอ - โรคนิ่ว หมั่นสำรวจ ทำความสะอาดแปลงปลูก และกำจัด วัชพืชที่เป็นแหล่งสะสมโรค พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคนิ่ว ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน ได้แก่ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 85% - โรคแอนแทรคโนส ให้หมั่นทำความสะอาดแปลงปลูกและ ทำลายส่วนที่เป็นโรค พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคนิ่ว ได้แก่ คาร์เบนดาซิม 50% WP อัตรา 10 -20 กรัม ไอโพรไดโวน 50% WP อัตรา 20-30กรัม แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามคำแนะนำในฉลาก - โรคนิ่วสาหร่าย ให้หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรค ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไป ทำลาย หรือฝังดินนอกแปลง ไม่ทิ้งไว้ในบริเวณแปลง หรือข้างแปลง เพื่อลดปริมาณและไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของ เชื้อสาเหตุโรค ช่วงการตัดแต่งกิ่ง ดูแลการตัดแต่งกิ่งให้ เหมาะสม ไม่ให้ต้นมีทรงพุ่มแน่นทึบ เพื่อให้มังคุดได้รับ แสงแดด และอากาศถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้น ทำให้ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคพุ่มไม้กวาด 3. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี ระยอง และสมุทรสาคร) จำนวน 13 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 142 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (พะเยา และจันทบุรี) จำนวน 547 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 202 ไร่	- เพลี้ยแป้ง ให้หมั่นสำรวจแปลงลำไยทุกสัปดาห์หากพบ การระบาดแนะนำให้ตัดส่วนของกิ่งก้านที่มีเพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ ไปทำลาย หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด มาลาไทออน (Malathion) 83% W/V EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และ ไพรีทรอยด์ (Pyrethroids) (อัตราส่วนตามฉลาก) พ่นให้ทั่ว - โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อ ไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ - โรคราดำ ให้ป้องกันและกำจัดแมลงพวกปากดูด เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยเพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยอ่อน เป็นต้น

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 66)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 17 กันยายน 2566 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 34 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 16 จุด ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ชลบุรี ระยอง สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เลย และพัทลุง ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้

8.2 โรคล้มปัสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย. 66)

พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 8 กันยายน 2566 รวม 70 จังหวัด 899 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 657,663 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 680 ตัว สัตว์ตายสะสม 75,548 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่

- 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 207,465 ราย
- 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 38,467 ราย
- 3) พ่นยากำจัดแมลง 228,002 ราย
- 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 175,180 ราย
- 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 138,631 ราย
- 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 444,383 ราย