



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566)” ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว และจะแผ่มาปกคลุมบริเวณอื่น ๆ ในระยะต่อไป ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ประกอบกับในช่วงวันที่ 16 – 17 ก.พ. 2566 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่า ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย และดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้

โดยพื้นที่ที่มีผลกระทบดังนี้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ภาคเหนือ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

ภาคกลาง : จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก : จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด


ภาคใต้ : จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร

วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

ภาคเหนือ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย และจังหวัดตาก

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2 - 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทย ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 66 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 15 ก.พ. 66



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เลิงนกทา	ยโสธร	48.0	ฝนตกหนัก
2	อ.เมือง	ปราจีนบุรี	18.8	ฝนตกปานกลาง
3	อ.ปากช่อง	นครราชสีมา	15.4	ฝนตกปานกลาง
4	อ.เมือง	นครราชสีมา	13.9	ฝนตกปานกลาง
5	อ.เมือง	สุรินทร์	7.4	ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 66)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 55,705 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 73 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 31,762 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (53,066 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70) มากกว่าปี 2565 จำนวน 2,639 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 26.17 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 162.38 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 20,632 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 51,630 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 73 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 28,093 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (49,142 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 69) มากกว่าปี 2565 จำนวน 2,487 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 18.45 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำระบายจำนวน 142.10 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 19,297 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	17,591	71	10,847	60	80	1,082	841	78	750	76	88	25,907	18,432	71	11,597	61	7,475
ตอน.	12	8,368	5,648	67	3,997	59	226	2,061	1,506	73	1,338	71	238	10,429	7,154	69	5,335	62	3,275
กลาง	3	1,419	992	70	932	69	27	419	281	67	256	65	30	1,838	1,273	69	1,188	68	564
ตะวันตก	2	26,605	20,773	78	7,496	56	8	164	141	86	130	85	10	26,769	20,914	78	7,626	57	5,854
ตะวันออก	6	1,515	1,007	66	913	64	52	1,006	763	76	706	74	58	2,520	1,770	70	1,619	68	750
ใต้	4	8,194	5,618	69	3,908	60	42	679	543	80	489	78	46	8,874	6,161	69	4,397	62	2,712
รวม	35	70,926	51,630	73	28,093	59	435	5,410	4,075	75	3,669	74	470	76,336	55,705	73	31,762	61	20,632

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี๊ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 17,434 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 10,738 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 6.60 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 61.25 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 7,437 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	10,511	78	6,711	69	1.47	0.00	33.00	33.00	2,951
สิริกิตี๊	5,689	60	2,839	43	3.83	3.83	17.01	17.04	3,821
ภูมิพล+สิริกิตี๊	16,200	71	9,550	59	5.30	3.83	50.01	50.04	6,772
แควน้อยฯ	631	67	588	66	0.21	0.55	4.32	4.32	308
ป่าสักชลสิทธิ์	603	63	600	63	1.09	0.00	6.92	6.07	357
รวมทั้งหมด	17,434	70	10,738	59	6.60	4.38	61.25	60.43	7,437

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 13 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ แม่จัดสมบูรณ์ชล (92%) อ่างฯ แม่กวงอุดมธารา (82%) อ่างฯ กิ่วคอหมา (94%) อ่างฯ ลำตะคอง (94%) อ่างฯ ลำพระเพลิง (87%) อ่างฯ มูลบ่น (91%) อ่างฯ ลำแซะ (85%) อ่างฯ ลำนางรอง (85%) อ่างฯ กระเสียว (98%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (86%) อ่างฯ ทนงปลาไหล (84%) อ่างฯ ประแสร์ (83%) และ อ่างฯ บางยาง (91%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 418 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 423 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.11 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.59 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.25 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.20 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.41 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.41 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 148 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 145 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 113 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 30 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 5 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 15 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 15 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 61 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 56 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลา) 10 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 30 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 176 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 174 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 18 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 60 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 80 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 18 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 140 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 188 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		9 ก.พ. 66	10 ก.พ. 66	11 ก.พ. 66	12 ก.พ. 66	13 ก.พ. 66	14 ก.พ. 66	15 ก.พ. 66		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.29	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.34	0.35	0.32	0.32	0.33	0.33	0.44	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 14 ก.พ. 66	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.18	-10.62
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.20	-11.80
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.24	-10.96
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.17	-10.83
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.65	-10.85
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.16	-12.34

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2565/66

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 (วันที่ 1 พ.ย.65 ถึง 30 เม.ย.66) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้งานได้ จำนวน 43,740 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ จำนวน 27,685 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 13,685 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ) วันนี้ใช้น้ำไป 61.25 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 4,645 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 (1 พ.ย.65 - 30 เม.ย.66)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	2,535	8,270	16,330	550	27,685	13,685	50
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	2,020	5,795	135	9,100	4,645	53



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66

ทั่วประเทศ จำนวน 16.30 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 13.55 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.75 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 9.23 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.51 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.72 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566)

ทั่วประเทศ จำนวน 12.22 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10.84 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.38 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.97 ของแผน

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 7.86 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.43 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.43 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.16 ของแผน

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2565/66			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2565/66					
		ข้าวนอกเขต 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวนอกเขต 2	% ข้าวนอกเขต 2	พืชไร่ พืชผัก	% พืชไร่ พืชผัก	รวมทั้งหมด	% รวมทั้งหมด
ทั่วประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	10.42	0.64	11.06	8.74	83.88	0.51	79.69	9.25	83.63
	นอกเขตชลประทาน	3.13	2.11	5.24	2.10	67.09	0.87	41.23	2.97	56.68
	รวม	13.55	2.75	16.30	10.84	80.00	1.38	50.18	12.22	74.97
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	6.64	0.10	6.74	6.00	90.36	0.15	150.00	6.15	91.25
	นอกเขตชลประทาน	1.87	0.62	2.49	1.43	76.47	0.28	45.16	1.71	68.67
	รวม	8.51	0.72	9.23	7.43	87.31	0.43	59.72	7.86	85.16

5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดระยอง ซึ่งมีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 4 วัน ขึ้นปฏิบัติการ จำนวน 18 เที่ยวบิน (32:15 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 13.30 ตัน จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร

6. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุปโภค-บริโภค พืชไร่ และอหุภักย์ ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/2566 จำนวน 2,188 เครื่อง ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ จำนวน 136 เครื่อง โดยแบ่งแยกดังนี้

1. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 87 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด
2. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 15 เครื่อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด
3. ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 34 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

7. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 66)

7.1 วาดภัย ช่วงภัย 4 ก.พ. 66 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 1 จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี เกษตรกร 262 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ(พืชไร่และพืชผัก) 895 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.2 อุทกภัย (ภาคใต้) ช่วงภัย 1 ธ.ค. 65 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ตรัง ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 10,161 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 80,430 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 24,404 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 8,184 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 47,842 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,411 ราย พื้นที่ 5,410 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,160 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,739 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 511 ไร่ คิดเป็นเงิน 9.75 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 531 ราย (คิดเป็นร้อยละ 37.63 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 1,879 ไร่ วงเงิน 3.25 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช ระนอง พัทลุง นราธิวาส ตรัง ยะลา สงขลา สุราษฎร์ธานี และจังหวัดปัตตานี เกษตรกร 7,727 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 23,664 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 13,215 ไร่ บ่อกุ้ง 6,005 ไร่ กระชัง 23,664 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 7,705 ราย พื้นที่ 19,204 ไร่ กระชัง 22,376 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 140.85 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 389 ราย (คิดเป็นร้อยละ 5.05 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 211 ไร่ กระชัง 876 ตร.ม. วงเงิน 1.59 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ปัตตานี พัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 59,790 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 4,064,060 ตัว แบ่งเป็น โค 157,876 ตัว กระบือ 5,296 ตัว สุกร 65,922 ตัว แพะ/แกะ 45,143 ตัว สัตว์ปีก 3,789,823 ตัว แปลงหญ้า 4,390 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

7.3 อุทกภัย ช่วงภัย ส.ค. - 23 พ.ย. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 65 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร หนองคาย หนองบัวลำภู ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชัยนาท เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ตรัง ปราจีนบุรี ปทุมธานี นครนายก นครปฐม กาญจนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ภูเก็ต ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สตูล สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 464,170 ราย พื้นที่ 4,158,521 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,778,367 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,346,573 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 33,581 ไร่ คิดเป็นเงิน 6,525.18 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 109,348 ราย (คิดเป็นร้อยละ 23.56 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 919,038 ไร่ วงเงิน 1,462.65 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 22.42 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พะเยา ลำปาง ลำพูน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ตรัง ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก นครปฐม ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ราชบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 27,128 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย 44,927 ไร่ กระชัง 36,883 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 303.447 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 8,486 ราย (คิดเป็นร้อยละ 31.28 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 12,045 ไร่ กระชัง 15,216 ตร.ม. วงเงิน 76.59 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 25.24 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ตาก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง เกษตรกร 1,996 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 267,228 ตัว แปลงหญ้า 1,479 ไร่ คิดเป็นเงิน 12.42 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 410 ราย (คิดเป็นร้อยละ 20.54 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) สัตว์ตาย/สูญหาย 195,777 ตัว แปลงหญ้า 188.15 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.47 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 19.89 ของวงเงินช่วยเหลือ)

7.4 อุทกภัย ช่วงภัย พ.ค. – 31 ก.ค. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ สระบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 21,164 ราย พื้นที่ 271,038 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 229,422 ไร่ พืชไร่ และพืชผัก 41,299 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ 317 ไร่ คิดเป็นเงิน 390.48 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 7,719 ราย (คิดเป็นร้อยละ 36.47 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 40,195 ไร่ วงเงิน 88.72 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 22.72 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 1,499 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,514 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 1,504 ไร่ บ่อกุ้ง 10 ไร่ กระชัง 563 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 7.32 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.5 วาตภัย ช่วงภัย ม.ค. – 17 ธ.ค. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ลำปาง ลำพูน น่าน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พะเยา พิจิตรแพร่ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครราชสีมา ปทุมธานี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี สระแก้ว สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา สตูล นราธิวาส นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 3,822 ราย พื้นที่ 8,830 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่และพืชผัก 6,425 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 2,405 ไร่ คิดเป็นเงิน 22.46 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,149 ราย (คิดเป็นร้อยละ 82.39 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 6,923 ไร่ วงเงิน 18.22 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 81.12 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

8. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 66)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. แมลงบัว 2. หอยเชอรี่ 3. โรคไหม้ข้าว 4. โรคขอบใบแห้งข้าว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (อุทัยธานี) จำนวน 6,752 ไร่ การระบาดลดลง 4,139 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ปัตตานี) จำนวน 10 ไร่ การระบาดลดลง 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ลำพูน อุบลราชธานี ปราจีนบุรี และสงขลา) จำนวน 463 ไร่ การระบาดลดลง 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงราย พิษณุโลก และพระนครศรีอยุธยา) จำนวน 3 ไร่ การระบาดคงที่	- ผลิตขยาย แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และชีวเวเรีย รมรวงให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์และสารเคมีอย่างถูกต้อง - แนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวต้านทานโรคเพื่อป้องกันการเกิดโรคไหม้ข้าว และโรคขอบใบแห้งข้าว - แนะนำให้เกษตรกรกำจัดหอยและกลุ่มไข่จากฤดูกาลที่แล้ว และป้องกันหอยไหม้ที่จะเข้ามา และปักไม้ไผ่ตามข้างคันนา เพื่อล่อให้หอยมาไข่แล้วเก็บไปทำลาย - สนับสนุนเชื้อราเมตาไรเซียมพร้อมแนะนำวิธีการผลิตขยายแก่เกษตรกร หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมี - ให้กำจัดวัชพืชซึ่งเป็นพืชอาศัยของแมลงบัว กำจัดวัชพืชรอบแปลงนา เช่น ข้าวป่า หญ้าข้าวหนวด หญ้าไซ หญ้าแดง หญ้าชันกาด และหญ้านกสีกมพู ก่อนตกกล้าหรือหว่านข้าว เพื่อทำลายพืชอาศัยของแมลงบัว ภาคเหนือควรปลูกข้าวหรือปักดำช่วงวันที่ 15 ก.ค.- ส.ค. หรือปรับวิธีปลูกโดยการปักดำ 2 ครั้ง เพื่อลดความรุนแรงที่เกิดจากการทำลายของแมลงบัวหลังปักดำจนถึงข้าวอายุ 45 วัน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรปลูกระหว่างเดือนมิ.ย.- ก.ค. ไม่ควรปลูกข้าวโดยวิธีหว่านหรือปักดำถี่ ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการระบาดของแมลงบัวเป็นประจำทำลายตัวเต็มวัย

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนกินใบมะพร้าว 3. แมลงดำหนาม 4. ดักแด้ 5. ดักแด้ 6. โรสซีขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,351 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ระยอง นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 268 ไร่ <u>การระบาดลดลง 10 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (สุรินทร์ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,623 ไร่ <u>การระบาดลดลง 17 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,103 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,504 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 116 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (บึงกาฬ จันทบุรี ตราด กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 532 ไร่ <u>การระบาดลดลง 73 ไร่</u>	- รมรณรงค์ให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้แหล่งแพร่พันธุ์ - ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมหนอนของแมลงดำหนามมะพร้าวในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - โรสซีขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในช่วงผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้น การป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสซีขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ปาล์มน้ำมัน	1. ดักแด้ 2. ดักแด้ 3. หนอนปลอกเล็ก 4. โรคลำต้นเน่า 5. โรคทะลายเน่า 6. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,904 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 109 ไร่ <u>การระบาดลดลง 2 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (นครราชสีมา ระยอง ฉะเชิงเทรา กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,173 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,706 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 20 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (นครสวรรค์ อุบลราชธานี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 171 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 26 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 339 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ใช้กาดักไฟโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - รมรณรงค์ให้เกษตรกรตัดทะลายที่เป็นโรคทะลายเน่าของปาล์มน้ำมันออกไปเผาทำลายนอกแปลง - พ่นดักแด้ด้วยสารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน (Sevin) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 20% EC อัตรา 40 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7-10 วัน ในตอนเย็น - แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลง ตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน และตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - สำรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายในช่วงฤดูฝน โดยสำรวจสัปดาห์ละครั้ง ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลงเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ของสปอร์ไปยัง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ตรัง และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 131 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่	ต้นอื่นๆ หากพบการระบาดรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์(copperoxychloride) 85% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่แผ่นใบ
ยางพารา	1. โรคครากขาว 2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคหน้ำยางแห้ง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 156 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (น่าน กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,318,012 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 218,654 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ปัตตานี พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,213 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (น่าน มุกดาหาร ระยอง อุบลราชธานี กระบี่ และชุมพร) จำนวน 53 ไร่ การระบาดคงที่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรคยางพาราให้เกษตรกรรับรู้อย่างต่อเนื่อง - คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกัน ข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารารุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ และทำร่องบริเวณโคนต้นยางพาราให้ร่องขวางกับลำต้น เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามลงสู่ราก
กาแฟ	1. โรคราสนิม 2. โรคใบจุดตากบ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 73 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และระยอง) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรค
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลังสีชมพู 3. เพลี้ยหอย 4. ไรแดงมันสำปะหลัง 5. โรคพุ่มแจ้ 6. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (มุกดาหาร สกลนคร จันทบุรี ชลบุรี และระยอง) จำนวน 432 ไร่ การระบาดลดลง 11 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 14 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (น่าน กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร และระยอง) จำนวน 16 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา สกลนคร ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 371 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 213 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สกลนคร อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) จำนวน 306 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (กำแพงเพชร อุทัยธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยนาท จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี) จำนวน 73,238 ไร่ การระบาดลดลง 3,512 ไร่	- รมรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แผลงข้างปีกใส่และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพุ่มแจ้ และแนะนำเกษตรกรให้สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ในพื้นที่ที่พบการระบาดให้ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคหรือต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่แสดงอาการของโรค - อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวเต่า Stethorus spp. ตัวปีกสั้น และไรตัวห้า หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน หากเริ่มพบการเข้าทำลายของไรแดงควรเก็บทิ้งหรือทำลาย เพื่อลดการเพิ่มปริมาณของไรแดง ในสภาพที่เหมาะสมอาจเกิดการระบาดขึ้นอย่างรวดเร็ว พ่นสารฆ่าแมลง เช่น อามีตราซ (amitraz) 20% EC พ่นเฉพาะบริเวณที่มีไรแดงทำลาย
อ้อย	1. โรคเส้ดำ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (อุทัยธานี) จำนวน 6 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำให้เกษตรกรถอนต้นที่เป็นโรคเส้ดำและนำไปทำลายนอกแปลง และไถทำลายอ้อยต่อที่เป็นโรครุนแรง - แนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ และหากเจอต้นที่เป็นโรคให้นำไปทำลายนอกแปลงปลูก
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี ยะลา และสตูล) จำนวน 138 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง - แนะนำการควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ หากพบการระบาดรุนแรงควรพ่นสารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร - แนะนำเกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทาน และคลุมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช และถอนต้นที่แสดงอาการของโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง และภูเก็ต) จำนวน 106 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่ แนะนำให้เกษตรกรถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง แนะนำให้ถอนพันธุ์ปลอดโรค กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. ไรแดงแอฟริกา 5. โรครากเน่าโคนเน่า 6. โรคใบติดหรือใบไหม้ 7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ยะลา และชุมพร) จำนวน 282 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (พิษณุโลก จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 78 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 843 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 27 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร และยะลา) จำนวน 227 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 18 ไร่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,710 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 852 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา และสงขลา) จำนวน 476 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไก่แจ้ ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคใบติดหรือใบไหม้ หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่น นำไปทำลายนอกแปลงปลูก ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อลดความชื้นสะสมใต้ทรงพุ่ม ลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง ในพื้นที่ปลูกที่มีความชื้นสูง - โรคใบจุดสาหร่าย หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มมีอาการของโรคให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หรือฝังดิน ดูแลการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม ไม่ให้ต้นมีทรงพุ่มแน่น เพื่อให้ทุเรียนได้รับแสงแดด และอากาศถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้น
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 3 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 61 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี และระยอง) จำนวน 19 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่องถูรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้งที่อาศัยอยู่ในดินได้ขึ้นมาบนต้นเงาะ - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่าย เก็บรวบรวมไปเผาทำลาย ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เมื่อพบใบแก่ถูกทำลายมากกว่าร้อยละ 30 ตัดทิ้ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบโดยให้สังเกตดูใบเพศสด ใบอ่อน และใบแก่ ในกรณีโคนโล่งเตียนให้เขย่ากิ่งเงาะเพื่อให้ตัวหนอนทั้งตัวลงสู่พื้นดิน ไปทำลายทั้งนอกแปลง ในระยะแตกใบ ถ้าพบหนอน ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล 85% WP อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ระยอง ตราด จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 136 ไร่ การระบาดลดลง 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 133 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 67 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน - หมั่นสำรวจและสังเกตการณ์เข้าทำลายของหนอนขอนใบอย่างสม่ำเสมอ โดยให้สังเกตดูที่ใต้ใบมังคุดจะพบรอยทางยาวเป็นเส้นสีขาว

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. มวนลำไย 3. โรคพุ่มไม้กวาด 4. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และระยอง) จำนวน 30 ไร่ การระบาดลดลง 45 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 15 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และระยอง) จำนวน 231 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา จันทบุรี และอุบลราชธานี) จำนวน 642 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่	- หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบไปเผาทำลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง - มวนลำไย ตัดแต่งกิ่ง ไม่ให้ทรงพุ่มหนาทึบ เพื่อทำลายที่หลบซ่อนและที่พักอาศัยของตัวเต็มวัย หากพบการระบาดจับตัวอ่อน ตัวเต็มวัยและไข่ มาทำลาย แล้วใช้ศัตรูธรรมชาติฉีดพ่นก่อนลำไยออกดอก - โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะถอนวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ

9. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

9.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 66)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 27 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 29 จุด ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สระแก้ว ชลบุรี ระยอง อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี เลย มหาสารคาม นครพนม สมุทรสงคราม พัทลุง และสงขลา ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้

9.2 โรคล้มปัสกีน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 66)

พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 70 จังหวัด 899 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 632,372 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 19,474 ตัว สัตว์ตายสะสม 67,231 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 207,394 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 38,467 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 228,002 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 175,180 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 138,631 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 444,383 ราย