



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งภาคตะวันออก ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและ ฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้ง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณา ที่ไม่แข็งแรงด้วย

สำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 3 ต.ค. 66 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 4 ต.ค. 66



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	ระยอง	94.8	ฝนตกหนักมาก
2	เขตบางแค	กรุงเทพมหานคร	76.5	ฝนตกหนัก
3	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	74.8	ฝนตกหนัก
4	อ.แหลมสิงห์	จันทบุรี	72.2	ฝนตกหนัก
5	อ.บางพลี	สมุทรปราการ	71.8	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์อุทกภัย น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

จากสถานการณ์ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลางตอนบน ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทย มีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่ 1 ก.ย. - 4 ต.ค. 66 รวม 46 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยาแพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพฯ นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรีอ่างทอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และจังหวัดสตูล ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 31 จังหวัด ยังมีสถานการณ์ 15 จังหวัด ได้แก่ ตาก (อ.บ้านตาก อ.สามเงา) ลำปาง (อ.แม่พริก) สุโขทัย (อ.ศรีสำโรง อ.ทุ่งเสลี่ยม อ.สวรรคโลก อ.กงไกรลาศ อ.เมือง) อุตรดิตถ์ (อ.พิชัย อ.ลับแล) กาฬสินธุ์ (อ.เมือง อ.ร่องคำ อ.กมลาไสย อ.ห้วยเม็ก อ.ท่าคันโท อ.สามชัย อ.ฆ้องชัย อ.นามน อ.สหัสขันธ์ อ.ยางตลาด อ.หนองกุงศรี) ชัยภูมิ (อ.บ้านเขว้า อ.จัตุรัส อ.หนองบัวเหว) นครพนม (อ.เมือง อ.ปลาปาก อ.นาแก อ.นาทม อ.เรณูนคร อ.ธาตุพนม อ.ท่าอุเทน อ.โพนสวรรค์ อ.บ้านแพง อ.นาหว้า อ.ศรีสงคราม อ.วังยาง) ยโสธร (อ.เมือง อ.กุดชุม อ.ทรายมูล อ.คำเขื่อนแก้ว อ.มหาชนะชัย อ.ค้อวัง อ.เลิงนกทา อ.ไทยเจริญ อ.ป่าดัว) ร้อยเอ็ด (อ.จตุรพักตรพิมาน อ.เมือง อ.เสลภูมิ อ.อาจสามารถ อ.ทุ่งเขาหลวง อ.พนมไพร อ.ธวัชบุรี อ.เชียงขวัญ อ.จังหาร อ.โพธิ์ชัย อ.สุวรรณภูมิ อ.โพนทอง อ.เมืองสรวง อ.โพนทราย อ.หนองฮี อ.เมยวดี) ศรีสะเกษ (อ.กันทรารมย์ อ.ภูสิงห์ อ.ยางชุมน้อย) อุดรธานี

(อ.กุ่มกวาปี อ.ทุ่งฝน อ.เมือง อ.บ้านดุง อ.ศรีธาตุ อ.เพ็ญ อ.นาแก) **อุบลราชธานี** (อ.เมือง อ.เดชอุดม อ.วารินชำราบ อ.ม่วงสามสิบ อ.ตระการพืชผล อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง อ.ตาลสุม อ.เซียงโน) **อำนาจเจริญ** (อ.หัวตะพาน) **ลพบุรี** (อ.บ้านหมี่) และ **ตราด** (อ.บ่อไร่)

ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 66)

● **ด้านพืช** พื้นที่ได้รับผลกระทบ 31 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ พะเยา เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลพบุรี จันทบุรี ตราด และจังหวัดสตูล เกษตรกร 121,314 ราย พื้นที่ 900,932 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 681,086 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 207,751 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 12,095 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 2,554 ราย พื้นที่ 28,135 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 27,513 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 548 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 75 ไร่ คิดเป็นเงิน 38.25 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 2 ราย พื้นที่ 0.50 ไร่ วงเงิน 830 บาท

● **ด้านประมง** พื้นที่ได้รับผลกระทบ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยา แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ลพบุรี และจังหวัดตราด เกษตรกร 6,984 ราย พื้นที่ 6,878 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 6,485 ไร่ บ่อกึ่ง 383 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

● **ด้านปศุสัตว์** พื้นที่ได้รับผลกระทบ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก แพร่ พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และจังหวัดจันทบุรี เกษตรกร 11,443 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 293,342 ตัว แบ่งเป็น โค 19,655 ตัว กระบือ 4,446 ตัว สุกร 7,382 ตัว แพะ/แกะ 1,462 ตัว สัตว์ปีก 260,397 ตัว แปลงหญ้า 2,422 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 66)

1. สนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

- 1.1 เครื่องสูบน้ำ 45 เครื่อง แบ่งเป็น สุโขทัย(6) นครพนม(4) ยโสธร(13) ศรีสะเกษ(2) สกลนคร(3) สุรินทร์(1) อุดรธานี(5) อุบลราชธานี(6) อ่างทอง(3) สตูล(2)
- 1.2 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 3 เครื่อง คือ พระนครศรีอยุธยา(3)
- 1.3 เครื่องผลักดันน้ำ 22 เครื่อง แบ่งเป็น นครพนม(4) สกลนคร(4) อุดรธานี(8) สตูล(6)
- 1.4 กระสอบทราย 9,250 ใบ แบ่งเป็น ร้อยเอ็ด(1,250) อุบลราชธานี(8,000)
- 1.5 เครื่องจักร-เครื่องมืออื่นๆ 2 หน่วย แบ่งเป็น พระนครศรีอยุธยา(1) อำนาจเจริญ(1)

2. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ 168.26 ตัน ถูยั้งชีพสัตว์ 449 ถู ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 2,557 ชุด รักษาสัตว์ 321 ตัว และอพยพสัตว์ 36,621 ตัว

3. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 66)

3.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 53,065 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70 ปริมาณน้ำใช้การได้ 29,122 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (59,961 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79) น้อยกว่าปี 2565 จำนวน 6,896 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 523.23 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 141.44 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 23,331 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ปริมาณน้ำในอ่างฯ 49,095 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 25,557 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (55,086 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78) น้อยกว่าปี 2565 จำนวน 5,991 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 428.15 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 69.96 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 21,890 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	14,353	58	7,608	42	80	1,083	797	74	706	71	88	25,908	15,150	58	8,314	44	10,762
ตอน.	12	8,368	7,044	84	5,394	80	226	2,061	1,774	86	1,606	85	238	10,429	8,818	85	7,000	81	1,665
กลาง	3	1,419	543	38	483	36	27	419	274	65	249	63	30	1,838	817	44	732	42	1,020
ตะวันออก	2	26,605	20,674	78	7,397	55	8	164	70	43	59	39	10	26,769	20,744	77	7,456	55	6,025
ตะวันออก	6	1,515	949	63	855	60	52	1,006	739	73	683	72	58	2,520	1,688	67	1,538	65	832
ใต้	4	8,194	5,531	67	3,820	59	42	679	316	47	262	42	46	8,874	5,847	66	4,082	57	3,027
รวม	35	70,926	49,095	69	25,557	54	435	5,411	3,970	73	3,565	71	470	76,337	53,065	70	29,122	56	23,331

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 13,995 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 7,299 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 173.22 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 2.21 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 10,876 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	7,587	56	3,787	39	107.49	155.58	1.50	1.50	5,875
สิริกิตี	5,505	58	2,655	40	22.45	29.69	0.00	1.36	4,005
ภูมิพล+สิริกิตี	13,091	57	6,441	39	129.94	185.27	1.50	2.86	9,881
แควน้อยฯ	504	54	461	51	14.78	9.33	0.27	0.00	435
ป่าสักชลสิทธิ์	400	42	397	42	28.51	19.62	0.44	0.44	560
รวมทั้งหมด	13,995	56	7,299	40	173.22	214.22	2.21	3.30	10,876

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาตรน้ำใช้การ จำนวน 4 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ อ่างฯ ทับเสลา (20%) อ่างฯ กระเสียว (22%) อ่างฯ คลองสี่ยัด (18%) และอ่างฯ ปรานบุรี (29%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย แม่น้ำปิง แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำวัง แม่น้ำน่าน แม่น้ำบางปะกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก แม่น้ำยม แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วม

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,673 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,640 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +22.13 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 3.57 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,449 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,280 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.49 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.76 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +12.64 ม.รทก. (เมื่อวาน +12.03 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 120 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 99 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 20 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 1 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระราม 149 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 141 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 24 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 20 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 6 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 4 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 269 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 272 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 34 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 9 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 60 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 125 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 41 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,359 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,149 ลบ.ม./วินาที)

3.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)								เกณฑ์	หมายเหตุ
		28 ก.ย. 66	29 ก.ย. 66	30 ก.ย. 66	1 ต.ค. 66	2 ต.ค. 66	3 ต.ค. 66	4 ต.ค. 66			
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแล่ จ.ปทุมธานี	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา	
เจ้าพระยา	ทำน่านนทบุรี จ.นนทบุรี	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	ปกติ	เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร	
เจ้าพระยา	ทำนักรมชลประทานสามเสน กทม.	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร	
										ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

3.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 4 ต.ค. 66	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	3.35	-9.45
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	8.97	-7.03
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	6.92	-5.28
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	7.94	-4.06
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	7.70	-4.80
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	9.95	-4.55

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 11 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ ระยอง อำเภอดำรงวิทยะปาริชาติ และจังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ที่ประสบภัยแล้ง และเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำ

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2566)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	อุตรดิตถ์(2)
กลาง	กาญจนบุรี(8) นครสวรรค์(8) ลพบุรี(4) สระบุรี(2) สุพรรณบุรี(3) อุทัยธานี(8)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น(4) ชัยภูมิ(1) นครราชสีมา(12) บุรีรัมย์(3) มหาสารคาม(4) ร้อยเอ็ด(2) สุรินทร์(2)
ตะวันออก	จันทบุรี(1) ฉะเชิงเทรา(3) ชลบุรี(5) ระยอง(4) สระแก้ว(2)
ใต้	นครศรีธรรมราช(6) ประจวบคีรีขันธ์(8) สงขลา(6) สุราษฎร์ธานี(3) เพชรบุรี(7)
รวม	24 จังหวัด (108 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ที่ 3 ตุลาคม 2566

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวน เที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
เชียงใหม่	1	ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่
ตาก	2	ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่
พิษณุโลก	3	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกบริเวณ จ.นครสวรรค์(ไพศาล) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.น่าน
ลพบุรี	5	1. ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.ลพบุรี(โคกเจริญ สระโบสถ์ ชัยบาดาล ท่าหลวง พัฒนานิคม โคกสำโรง บ้านหมี่) จ.สระบุรี(พระพุทธบาท เฉลิมพระเกียรติ แก่งคอย) จ.นครสวรรค์(ไพศาล แม่เปิน ชุมตาบง ตาคี) จ.อุทัยธานี(ลานสัก ห้วยคต บ้านไร่) 2. ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแหม) อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน จ.ลพบุรี อ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำ ห้วยขุนแก้ว จ.อุทัยธานี อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวน เที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
กาญจนบุรี	4	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.กาญจนบุรี (ศรีสวัสดิ์ หนองปรือ บ่อพลอย ห้วยกระเจา เลาขวัญ เมืองกาญจนบุรี) จ.สุพรรณบุรี(ด่านช้าง) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน อ่างเก็บน้ำห้วยกระพือย จ.กาญจนบุรี อ่างเก็บน้ำกระเสียว อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเตื่อ จ.สุพรรณบุรี
ขอนแก่น	2	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.ขอนแก่น(พล หนองสองห้อง) จ.นครราชสีมา(ประทาย คง โนนสูง สีดา พิมาย โนนแดง ชุมพวง) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำละเลิงหาย จ.ขอนแก่น
นครราชสีมา	2	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.นครราชสีมา (ปากช่อง วังน้ำเขียว ด่านขุนทด พระทองคำ โนนไทย) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนบน) อ่างเก็บน้ำ ลำเชียงไกร(ตอนล่าง) อ่างเก็บน้ำหนองกก จ.นครราชสีมา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.เพชรบูรณ์
สุรินทร์	4	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.ขอนแก่น (เปือยน้อย หนองสองห้อง พล) จ.นครราชสีมา(ประทาย บัวลาย บัวใหญ่ เมืองยาง เลิงสา) จ.บุรีรัมย์ (บ้านใหม่ไชยพจน์ โนนดินแดง) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ จ.นครราชสีมา
ระยอง	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้าเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุม ช่วงบ่ายสภาพอากาศปิด มีฝนตกบริเวณสนามบินและพื้นที่โดยรอบ
อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	4	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายุภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.ราชบุรี(บ้านคา ปากท่อ เมืองราชบุรี วัดเพลง) จ.สมุทรสงคราม(บางคนที อัมพวา) จ.เพชรบุรี(หนองหญ้าปล้อง แก่งกระจาน บ้านลาด บ้านแหลม เขาย้อย เมืองเพชรบุรี ท่าช้างชะอำ) จ.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแก่งกระจาน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อ่างเก็บน้ำห้วยเกษม อ่างเก็บน้ำหนองเปาะ อ่างเก็บน้ำห้วยพุน้อย อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม อ่างเก็บน้ำบ้านกระหว่างสาม จ.เพชรบุรี อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งกระทิง อ่างเก็บน้ำ บ้านไทยประจันต์ อ่างเก็บน้ำพริกูด จ.ราชบุรี
นครศรีธรรมราช	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีเมฆชั้นกลางและเมฆชั้นสูงปกคลุม ส่งผลให้เมฆคิวมูลัส ไม่พัฒนาตัว
รวม	27	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (15 กุมภาพันธ์ – 2 ตุลาคม 2566)

ตั้งแต่เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 3 ตุลาคม 2566 การขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 182 วัน ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 3,899 เที่ยวบิน (5,975:42 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 3298.6 ตัน พลุสารพัดความขึ้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 268 นัด พลุสารพัดความขึ้นแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน 386 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์ สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1,589 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 67 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย สกลนคร นครพนม หนองคาย บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ บึงกาฬ มุกดาหาร หนองบัวลำภู นครราชสีมา อุรธานี มหาสารคาม กาญจนบุรี ร้อยเอ็ด อุทัยธานี นครสวรรค์ สุรินทร์ จันทบุรี ตรัง ยโสธร อุบลราชธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม ชัยนาท นครนายก ลพบุรี ระยอง สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง พัทลุง ภูเก็ต สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบลโกศ-บริโกศ พืชไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2566 จำนวน 2,289 เครื่อง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ ประจำวันที่ 28 กันยายน 2566 ไม่มีการช่วยเหลือ

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

6. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 66)

6.1 อุทกภัย ช่วงภัย 6 มิ.ย. – 29 ส.ค. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ตาก พิชณุโลก แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ นครพนมหนองคาย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตรัง หนอง และจังหวัดสตูล เกษตรกร 37,133 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 195,492 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 183,025 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 8,238 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,229 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 11,344 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 88,692 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 83,312 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 5,283 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 97 ไร่ คิดเป็นเงิน 122.51 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 270 ราย (คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 1,046 ไร่ วงเงิน 1.57 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน นครพนม กระบี่ หนอง และจังหวัดสตูล เกษตรกร 436 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 259 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 256 ไร่ บ่อกุ้ง 3 ไร่ กระชัง 854 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 425 ราย พื้นที่ 253 ไร่ กระชัง 854 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 1.47 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 289 ราย (คิดเป็นร้อยละ 68.00 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 170 ไร่ กระชัง 854 ตร.ม. วงเงิน 1.08 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 73.47 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6.2 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 22 พ.ค. 66 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร อุทัยธานี นครราชสีมา ชัยนาท สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 64,198 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1,148,503 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 842,403 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 305,971 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 129 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 7,559 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 118,844 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 49,516 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 69,219 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 109 ไร่ คิดเป็นเงิน 203.85 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 29 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 427 ไร่ วงเงิน 0.84 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6.3 วาตภัย ช่วงภัย 8 พ.ค. 66 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พะเยา เพชรบูรณ์ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร เพชรบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ตรัง หนอง และจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 1,633 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 7,814 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,245 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,432 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 1,137 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 585 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 2,859 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 939 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,449 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 471 ไร่ คิดเป็นเงิน 6.04 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 365 ราย (คิดเป็นร้อยละ 62.39 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 1,501 ไร่ วงเงิน 3.07 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 50.83 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 66)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี และสงขลา) จำนวน 131 ไร่ การระบาดลดลง 804 ไร่	- เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ให้อนุรักษศัตรูธรรมชาติเพื่อใช้ควบคุมการระบาด เช่น มวนเขียวดูดไข่ แมงมุมสุนัขป่า เป็นต้น ควบคุมระดับน้ำ โดยการระบายน้ำออกเป็นครั้งคราวแบบเปียกสลับแห้ง เมื่อตรวจพบตัวเต็มวัย หรือตัวอ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง
	2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ น่าน และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 167 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 30 ไร่	- เพลี้ยกระโดดหลังขาว แนะนำปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน เช่น สุพรรณบุรี 60 ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 กข31 และชุมแพ 60
	3. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุรินทร์) จำนวน 10 ไร่ การระบาดคงที่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. โรคไหม้ข้าว 5. หนอนกอข้าว 6. แมลงดำหนาม 7. โรคใบจุดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (ตาก น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ ลำพูน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี และจันทบุรี) จำนวน 5,669 ไร่ การระบาดลดลง 344 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา มหาสารคาม และสงขลา) จำนวน 5 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุพรรณบุรี) จำนวน 70 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สกลนคร และสงขลา) จำนวน 28 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	ปลูกสลับกันอย่างน้อย 2 พันธุ์ ป้องกันไม่ให้เพลี้ยกระโดดหลังขาวปรับตัวทำลายข้าวพันธุ์ต้านทานได้เร็ว หรือถ้าปลูกข้าวพันธุ์เดียวไม่ควรปลูกติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก เมื่อพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัวต่อต้นให้ไถน้ำออกจากแปลงนาและปฏิบัติเช่นเดียวกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล - เพลี้ยไฟ ให้หมั่นสำรวจแปลงข้าวระยะกล้า 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ ให้น้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อพบตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวอายุ 6-7 วัน หลังหว่าน ใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว และใช้สารฆ่าแมลงมาลาไธออน 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นใบข้าว - โรคไหม้ข้าว ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร - หนอนกอข้าว ให้เฝ้าตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ให้น้ำท่วมและไถดิน เพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง - แมลงดำหนาม หมั่นสำรวจแปลง และกำจัดวัชพืชบริเวณแปลงนา อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนไข่ แตนเบียน หนอน หากพบจำนวนตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามข้าว มากกว่า 2 ตัวต่อกอ ควรใช้สารป้องกันกำจัดแมลง - โรคใบจุดสีน้ำตาล แนะนำให้ปรับปรุงดินโดยการไถกลบฟาง คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าพบอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาลรุนแรง ควรพ่นด้วย สารป้องกันกำจัดเชื้อรา
มะพร้าว	1. หนอนกินใบมะพร้าว 2. หนอนหัวดำ 3. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวดี สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 8,276 ไร่ การระบาดลดลง 610 ไร่ พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวดี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,739 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	- รมรงคให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวและหนอนหัวดำทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทิ้งทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมระยะหนอนของ หนอนหัวดำ อัตราไร่ละ 200 ตัว และปลอ่ยแตนเบียน ไข่ไตรโคแกรมมา เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส เพื่อควบคุมหนอนของแมลงดำหนามมะพร้าวในพื้นที่ และปลอ่ยแตนเบียนเตตระสตีดัส ควบคุมดักแด้แมลงดำหนามมะพร้าว - ใช้กับดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงและด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตตาโรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ - โรสี้ชาจะเข้าทำลายอยู่ภายในช่วงผลมะพร้าวทำให้การพ่น สารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัด ให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผล ขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ เข้าทำลายใช้สารเคมี ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. ดั้วงวง 5. ดั้วแรด 6. โรสี้ขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,294 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ปัตตานี ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,228 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 48 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร ชุมพร และสงขลา) จำนวน 494 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	
ปาล์ม น้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. ดั้วกู่ทาบ 3. หนอนปลอกเล็ก 4. โรคลำต้นเน่า 5. โรคทะลายเน่า 6. โรคใบจุด 7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,695 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 30 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 753 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 255 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,420 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,040 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 214 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 62 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 81 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 995 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 16 ไร่	- รณรงค์ให้เกษตรกรตัดทะลายที่เป็นโรคทะลายเน่าของปาล์มน้ำมันออกไปเผาทำลายนอกแปลง - ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาโรเซียมเพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - พ่นด้วงกู่ทาบด้วยสารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน (Sevin) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 20% EC - หนอนปลอกเล็ก พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลง ตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายในช่วงฤดูฝน สำนวจสัปดาห์ละครั้งตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค นำไปเผาทำลายทั้งนอกแปลง
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ปัตตานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,498 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครศรีธรรมราช) จำนวน 100 การระบาดคงที่	- คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไบทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ปีงาฬ กระทบ ชุมพร ตรัง ปัตตานี นครศรีธรรมราช พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,352 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 28 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ปีงาฬ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 93,985 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ และทำร่องบริเวณโคนต้นยางพาราให้ร่องขวางกับลำต้น เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามลงสู่ราก
กาแฟ	1. โรคราสนิม 2. หนอนกาฬสีกแดง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง - หนอนกาฬสีกแดง หมั่นทำความสะอาดแปลงและตรวจดูตามกิ่งและลำต้นกาแฟอยู่เสมอ หากพบการเข้าทำลายของหนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาฬสีกแดง ให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลง ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเฟนิโตรโทออน อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลังสีชมพู 3. เพลี้ยหอย 4. โรคเน่ามันสำปะหลัง 5. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง 6. โรคพุ่มแจ้ 7. โรคโคนเน่าหัวเน่า	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ขอนแก่น จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 68 ไร่ การระบาดลดลง 53 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และอุบลราชธานี) จำนวน 4 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 13 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (นครราชสีมา สุรินทร์ ชลบุรี อุบลราชธานี จันทบุรี ระยอง และกาญจนบุรี) จำนวน 561 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่ พื้นที่ระบาด 31 จังหวัด (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อุบลราชธานี ชัยนาท สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 100,763 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3,593 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ขอนแก่น อุบลราชธานี จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 60 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร อุบลราชธานี และชลบุรี) จำนวน 122 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 122 ไร่	- เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ไกลและพรวนดิน ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด เมื่อพบการระบาด ถอนต้นมันสำปะหลังและเก็บทำลาย - การควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ปลอ่ยให้กระจายตัวแปลงให้เจริญเติบโต และขยายพันธุ์ได้อย่างน้อย 10 เท่า ในทุกชั่วอายุ - เพลี้ยหอย ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากเพลี้ยหอย ให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลง ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร/โตะมีทอกแซม 25% WG - โรคเน่า ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน หากเริ่มพบการเข้าทำลายของโรคควรเก็บทิ้งหรือทำลาย - โรคใบด่างมันสำปะหลัง ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - โรคพุ่มแจ้ ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด และกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - โรคโคนเน่าหัวเน่า ในแปลงปลูกควรยกทรง เพื่อไม่ให้ให้น้ำท่วมขัง ให้ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีโรคระบาดของโรค ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล 25% อัตรา 20-50 กรัม/ฟอสฟอรัส-อะลูมิเนียม 80% อัตรา 50 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร แช่เป็นเวลา 10 นาที ควรจัดระยะปลูกให้เหมาะสม เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะต่อการระบาดของโรค และเมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรค ถอนนำไปทำลายนอกแปลงแล้วโรยปูนขาว หรือราดด้วยสาร เมทาแลกซิล และฟอสฟอรัส-อะลูมิเนียม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณที่ถอนและโดยรอบห่างออกไปประมาณ 1 เมตร
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทุ้งข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (เชียงใหม่ ตาก อุทัยธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยนาท จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี ยะลา สงขลา และสตูล) จำนวน 12,340 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และภูเก็ต) จำนวน 91 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ทำความสะอาดแปลง ส่วนการเตรียมดินให้ตัดต้นและ ปักตอเก่าสับปะรดทิ้งไว้ 2 - 3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้น สับปะรดทำลายนอกแปลง เพื่อกำจัดไวรัสและแมลงพาหะ ก่อนปลูกต้องมีการไถและพรวนดินหลายๆ ครั้ง ควรตากดิน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งแช่หน่อพันธุ์เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง ที่ติดมากับหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีกำจัดแมลง เมื่อพบต้นเป็นโรค ให้ถอนต้นสับปะรดที่แสดงอาการไปทำลายนอกแปลง
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ด่างหนวดยาว 3. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยนาท และนครราชสีมา) จำนวน 3,867 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (พิจิตร) จำนวน 500 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา) จำนวน 66 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 66 ไร่</u>	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ใช้ช่วงที่พบกลุ่มไข่ของ หนอนกออ้อย ปล่อยแมลงหางหนีบอัตรา 500 ตัวต่อไร่ - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว แช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชุมพร และภูเก็ต) จำนวน 1 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 55 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 24 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 21 ไร่ <u>การระบาดลดลง 3 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น และ จันทบุรี) จำนวน 34 ไร่ <u>การระบาดลดลง 23 ไร่</u>	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบ โคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่าย เก็บรวบรวมไปเผาทำลาย ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ให้สังเกตดูใบเพลสลาด ใบอ่อน และใบแก่ - โรคราแป้ง เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไป เผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล หมั่นตรวจดูหากพบว่าร่าแป้งเข้าทำลายให้ทำการพ่นด้วย ผงกำมะถันละลายน้ำ 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทำให้การระบาด ในช่วงติดผลนั้นลดความรุนแรงลงได้ ในช่วงระยะผลอ่อน
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง 4. ไรแดงแอฟริกา 5. โรครากรเน่าโคนเน่า 6. โรคใบติดหรือใบไหม้	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 222 ไร่ <u>การระบาดลดลง 13 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสงขลา) จำนวน 413 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และยะลา) จำนวน 246 ไร่ <u>การระบาดลดลง 2 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 358 ไร่ <u>การระบาดลดลง 11 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (เพชรบูรณ์ บึงกาฬ จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 3,942 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 38 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 301 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 29 ไร่</u>	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยไก่แจ้ ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่สำหรับ ต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง หากบริเวณผลทุเรียน ให้ใช้น้ำพ่น - ไรแดงแอฟริกา กำจัดวัชพืชในสวน เมื่อพบระบาดรุนแรงให้ใช้ สารกำจัดแมลง - โรครากรเน่าโคนเน่าทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคใบติดหรือใบไหม้ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่ เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่นนำไป ทำลายนอกแปลง ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืช ในแปลงปลูกลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง ในพื้นที่ปลูกที่มีความชื้นสูง - โรคใบจุดสาหร่าย เมื่อเริ่มมีอาการของโรคให้ตัดใบหรือส่วน ที่เป็นโรคนำไปทำลาย หรือฝังดิน ดูแลการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม - หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียนเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกทำลาย เผาทิ้ง พบในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำ ผสมไวด์ออกซ์ 67% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่ว ระบาดรุนแรงให้ใช้ สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	7. โรคใบจุดสำหรับ่าย 8. เพลี้ยหอยเกล็ด 9. เพลี้ยจักจั่นฝอย 10. หนอนเจาะเมล็ด ทุเรียน 11. โรคคราดำ 12. โรคราสีชมพู 13. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 544 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 86 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 155 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 14 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 338 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 ไร่ (ตราด กระบี่ นราธิวาส และยะลา) จำนวน 548 ไร่ การระบาดลดลง 418 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 175 ไร่ การระบาดลดลง 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 182 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ตราด ชุมพร ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 155 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่	- หมั่นสำรวจแปลงปลูกทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ คาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/ไร่โพราเมทริน /โพซาโลน 6.25% / 22.5% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตร โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน - ป้องกันวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% CS อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัม เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์ เริ่มเมื่อผลอายุ 6 สัปดาห์ - กำจัดวัชพืชในแปลง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นการลดความชื้นสะสม หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบคราบราสีดํา พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดํา และสารเหนียวที่แมลงปากดูดซับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค - ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อเป็นการลดความชื้นสะสม ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลาย นอกแปลงหรือเือนเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 85% WP ผสมน้ำ ชื่นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด - หมั่นตรวจดูตามผลทุเรียน เมื่อพบรอยทำลายของหนอน ให้ใช้ไม้หรือสากแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทำลายควรเก็บทำลายโดยเผาไฟหรือฝัง และการทอผลด้วยถุงมุ้งในลอน ถูรีเมย์
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนซอนใบ 4. โรคใบจุด 5. โรคแอนแทรคโนส 6. โรคใบจุดสำหรับ่าย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง และชุมพร) จำนวน 178 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 314 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 108 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 341 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 104 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง สงขลา และนราธิวาส) จำนวน 190 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	- หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน - หมั่นสำรวจและสังเกตการณ์เข้าทำลายของหนอนซอนใบอย่างสม่ำเสมอ - โรคใบจุด หมั่นสำรวจ ทำความสะอาดแปลงปลูก และกำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งสะสมโรค พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน ได้แก่ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 85% - โรคแอนแทรคโนส ให้หมั่นทำความสะอาดแปลงปลูกและทำลายส่วนที่เป็นโรค พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช - โรคใบจุดสำหรับ่าย ให้หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรค ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หรือฝังดินนอกแปลง ไม่ทิ้งไว้ในบริเวณแปลง หรือข้างแปลง เพื่อลดปริมาณและไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค ช่วงการตัดแต่งกิ่ง ดูแลการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม ไม่ให้ต้นมีทรงพุ่มแน่นทึบ เพื่อให้มังคุดได้รับแสงแดด และอากาศถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้น ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคราดำ 3. โรคคราดำ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี ระยอง และสมุทรสาคร) จำนวน 14 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 142 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (พะเยา และจันทบุรี) จำนวน 547 ไร่ การระบาดลดลง 202 ไร่	- เพลี้ยแป้ง ให้หมั่นสำรวจแปลงลำไยทุกสัปดาห์หากพบการระบาดแนะนำให้ตัดส่วนของกิ่งก้านที่มีเพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ไปทำลาย หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไยควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด มาลาไทออน (Malathion) 83% W/V EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และไพรีทรอยด์ (Pyrethroids) (อัตราส่วนตามฉลาก) พ่นให้ทั่ว - โรคราดำ เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ - โรคคราดำ ให้ป้องกันและกำจัดแมลงพวกปากดูด เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยเพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยอ่อน เป็นต้น

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 66)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 17 กันยายน 2566 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 34 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 16 จุด ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ชลบุรี ระยอง สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เลย และพัทลุง ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้

8.2 โรคล้มปัสกีน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย. 66)

พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 8 กันยายน 2566 รวม 70 จังหวัด 899 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 657,663 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 680 ตัว สัตว์ตายสะสม 75,548 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคแก่ตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 207,465 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 38,467 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 228,002 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 175,180 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 138,631 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 444,383 ราย