



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก อ่าวไทย และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 7 พ.ย. 66 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 8 พ.ย. 66



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	สุรินทร์	41.7	ฝนตกหนัก
2	อ.เมือง	สมุทรปราการ	38.8	ฝนตกหนัก
3	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	38.0	ฝนตกหนัก
4	อ.สะเดา	สงขลา	29.6	ฝนตกปานกลาง
5	อ.ถลาง	ภูเก็ต	28.2	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์อุทกภัย น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

จากสถานการณ์ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทย มีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่ 1 ก.ย. - 7 พ.ย. 66 รวม 61 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ ชัยนาท นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรวดี เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา และจังหวัดสตูล ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 54 จังหวัด **ยังคงมีสถานการณ์ 7 จังหวัด** ได้แก่ กาฬสินธุ์ (อ.เมือง อ.ร่องคำ อ.กมลาไสย อ.ห้วยเม็ก อ.ท่าคันโท อ.สามชัย อ.ฆ้องชัย อ.สหัสขันธ์ อ.ยางตลาด อ.หนองกุงศรี) ชัยภูมิ (อ.คอนสวรรค์) ยโสธร (อ.เมือง อ.กุดชุม อ.ทรายมูล อ.คำชะโนด อ.มหาชนะชัย อ.ค้อวัง อ.เลิงนกทา อ.ไทยเจริญ อ.ป่าติ้ว) ร้อยเอ็ด (อ.เสลภูมิ อ.อาจสามารถ อ.ทุ่งเขาหลวง อ.ธวัชบุรี อ.เชียงขวัญ อ.จังหาร อ.โพธิ์ชัย อ.สุวรรณภูมิ อ.โพนทอง อ.โพนทราย อ.เมยวดี อ.เมือง อ.ศรีสมเด็จ อ.พนมไพร) ศรีสะเกษ (อ.กันทรารมย์ อ.ภูสิงห์ อ.ยางชุมน้อย) พระนครศรีอยุธยา (อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางบาล อ.มหาราช อ.บางซ้าย อ.พระนครศรีอยุธยา) และ จังหวัดสุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง)

ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 66)

● **ด้านพืช** พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 58 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพฯ ชัยนาท นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตรวดี นครปฐม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช ยะลา และจังหวัดสตูล เกษตรกร 241,597 ราย พื้นที่ 1,828,678 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,337,478 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 472,941 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 18,259 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 121,955 ราย พื้นที่ 1,067,372 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 819,551 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 246,332 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 1,484 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,591.97 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,535 ราย พื้นที่ 5,135 ไร่ วงเงิน 7.90 ล้านบาท

● **ด้านประมง** พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 36 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพฯ นครนายก ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ตรวดี สมุทรปราการ และจังหวัดยะลา เกษตรกร 9,152 ราย พื้นที่ 14,014 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 12,760 ไร่ บ่อกุ้ง 1,254 ไร่ กระชัง 2,700 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,626 ราย พื้นที่ 1,531 ไร่ กระชัง 106 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 9.01 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 54 ราย พื้นที่ 26.75 ไร่ วงเงิน 135,170 บาท

● **ด้านปศุสัตว์** พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และจังหวัดจันทบุรี เกษตรกร 72,138 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 3,687,298 ตัว แบ่งเป็น โค 183,487 ตัว กระบือ 55,454 ตัว สุกร 85,543 ตัว แพะ/แกะ 11,230 ตัว สัตว์ปีก 3,351,584 ตัว แปลงหญ้า 9,483 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 76 ราย สัตว์รวม 2,998 ตัว แบ่งเป็น โค 46 ตัว กระบือ 2 ตัว สุกร 133 ตัว และสัตว์ปีก 2,817 ตัว แปลงหญ้า 13 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.39 ล้านบาท

การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 66)

1. สนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

1.1 เครื่องสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 129 เครื่อง ได้แก่ ลำปาง(1) สุโขทัย(14) เพชรบูรณ์(2) ขอนแก่น(7) นครพนม(4) บุรีรัมย์(8) ยโสธร(13) ร้อยเอ็ด(1) เลย(2) ศรีสะเกษ(2) สกลนคร(3) สุรินทร์(1) หนองคาย(26) หนองบัวลำภู(5) อุดรธานี(5) อุบลราชธานี(6) นนทบุรี(4) ฉะเชิงเทรา(2) ปทุมธานี(1) ปราจีนบุรี(1) พระนครศรีอยุธยา(3) ลพบุรี(2) สระบุรี(5) สุพรรณบุรี(2) อ่างทอง(4) สมุทรสาคร(3) สตูล(2)

1.2 Hydro Flow 9 เครื่อง ได้แก่ มหาสารคาม(1) ฉะเชิงเทรา(7) สมุทรปราการ(1)

1.3 เครื่องผลักดันน้ำ 37 เครื่อง ได้แก่ นครพนม(4) ยโสธร(12) สกลนคร(4) อุดรธานี(8) ฉะเชิงเทรา(1) ปทุมธานี(2) สตูล(6)

1.4 กระสอบทราย 9,250 ใบ ได้แก่ ร้อยเอ็ด(1,250) อุบลราชธานี(8,000)

1.5 เครื่องจักร-เครื่องมืออื่นๆ 7 หน่วย ได้แก่ ยโสธร(6) อำนาจเจริญ(1)

2. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ 488.72 ตัน ถูยั้งชีพสัตว์ 963 ถูย ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 5,871 ชุด รักษาสัตว์ 688 ตัว และ อพยพสัตว์ 83,971 ตัว (อพยพสัตว์กลับสู่ที่ตั้งแล้ว 83,971 ตัว)

3. สนับสนุนหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา 520 ขวด และเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 805 กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ 8,605 ไร่

4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชผัก 34,800 ของ และต้นกล้าพืชผัก 14,000 ต้น

3. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 66)

3.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 61,472 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81 ปริมาณน้ำใช้การได้ 37,531 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (64,068 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84) น้อยกว่าปี 2565 จำนวน 2,596 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 177.34 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 114.94 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 15,126 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 56,944 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 33,407 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (59,258 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84) น้อยกว่าปี 2565 จำนวน 2,314 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 128.83 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 76.09 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,244 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง					รวม					รับได้อีก		
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ			จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ					
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ			% ใช้การ	ในอ่างฯ	% รณก.		ใช้การ	% ใช้การ
เหนือ	8	24,825	18,107	73	11,362	63	80	1,083	978	90	888	89	829	25,908	19,085	74	12,249	64	6,868
ตอน.	12	8,368	7,917	95	6,267	93	226	2,061	1,897	92	1,729	91	238	10,429	9,814	94	7,996	93	775
กลาง	3	1,419	1,206	85	1,146	84	27	419	341	81	316	81	30	1,838	1,547	84	1,462	83	347
ตะวันตก	2	26,605	22,625	85	9,348	70	8	164	94	57	83	54	10	26,769	22,719	85	9,431	70	4,050
ตะวันออก	6	1,515	1,185	78	1,091	77	52	1,006	840	83	783	83	58	2,520	2,025	80	1,874	79	496
ใต้	4	8,194	5,905	72	4,194	65	42	679	378	56	325	52	46	8,874	6,283	71	4,519	64	2,591
รวม	35	70,926	56,944	80	33,407	70	435	5,411	4,528	84	4,124	82	470	76,337	61,472	81	37,531	72	15,126

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 18,237 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 73 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 11,541 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 53.01 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 17.04 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 6,696 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับ ได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	10,182	76	6,382	66	33.61	36.27	3.00	3.00	3,280
สิริกิตี	6,094	64	3,244	49	8.93	10.99	4.04	4.02	3,416
ภูมิพล+สิริกิตี	16,276	71	9,626	59	42.54	47.26	7.04	7.02	6,696
แควน้อยฯ	946	101	903	101	2.83	3.44	1.30	1.30	0
ป่าสักชลสิทธิ์	1,016	106	1,013	106	7.65	12.57	8.70	8.71	0
รวมทั้งหมด	18,237	73	11,541	64	53.01	63.27	17.04	17.02	6,696

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปของความจุอ่างฯ จำนวน 18 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ แม่จัดสมบูรณ์ชล (107%) อ่างฯ กัวลม (97%) อ่างฯ กัวคหมา (111%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (101%) อ่างฯ แม่มอก (101%) อ่างฯ ห้วยหลวง (95%) อ่างฯ น้ำอูน (88%) อ่างฯ น้ำพุง (89%) อ่างฯ จุฬาภรณ์ (83%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (106%) อ่างฯ ลำปาว (100%) อ่างฯ สิรินคร (95%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (106%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (82%) อ่างฯ วชิราลงกรณ์ (90%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (100%) อ่างฯ หนองปลาไหล (97%) อ่างฯ ประแสร์ (96%) และ อ่างฯ นฤปดินทรจินดา (94%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำพระสทิ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำยม ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วม

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,662 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,766 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +22.10 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 3.60 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,358 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,479 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.90 ม.รทก. (เมื่อวาน +17.00 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +12.31 ม.รทก. (เมื่อวาน +12.75 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 235 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 235 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 185 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 50 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระราม 132 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 149 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 94 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 72 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 17 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 35 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 319 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 352 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 35 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 9 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 135 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 90 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 50 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,422 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,609 ลบ.ม./วินาที)

3.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		2 พ.ย. 66	3 พ.ย. 66	4 พ.ย. 66	5 พ.ย. 66	6 พ.ย. 66	7 พ.ย. 66	8 พ.ย. 66		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	1.09	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกพรุ จ.นนทบุรี	0.12	0.13	0.11	0.11	0.10	0.10	1.10	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกพรุสามเสน กทม.	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	1.11	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

3.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 8 พ.ย. 66	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.24	-10.56
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	6.90	-9.10
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	3.83	-8.37
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	3.72	-8.28
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	3.74	-8.76
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	0.00	-14.50

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบลโกศ-บริโกศ พืชไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2566 จำนวน 2,289 เครื่อง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ ประจำวันที่ 31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 1 เครื่อง ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 66)

5.1 อุทกภัย ช่วงภัย 6 มิ.ย. – 29 ส.ค. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ นครพนมหนองคาย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตรัง หนอง และจังหวัดสตูล เกษตรกร 37,862 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 200,426 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 187,390 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 8,645 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 4,391 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 17,924 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 142,676 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 135,782 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 6,217 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 677 ไร่ คิดเป็นเงิน 197.02 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 2,239 ราย (คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 11,808 ไร่ วงเงิน 17.04 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 8.65 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กระบี่ หนอง และจังหวัดสตูล เกษตรกร 511 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 311 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 307 ไร่ บ่อกุ้ง 4 ไร่ กระชัง 854 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 511 ราย พื้นที่ 311 ไร่ กระชัง 854 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 1.79 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 436 ราย (คิดเป็นร้อยละ 85.32 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 260 ไร่ กระชัง 881 ตร.ม. วงเงิน 1.55 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 86.59 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.2 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 22 พ.ค. 66 – 18 ก.ย. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยนาท สระบุรี สระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 56,184 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 821,822 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 511,990 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 309,682 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 150 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 11,638 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 167,399 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 67,634 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 99,677 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 87 ไร่ คิดเป็นเงิน 288.34 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 210 ราย (คิดเป็นร้อยละ 1.80 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 2,565 ไร่ วงเงิน 3.85 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.3 วาตภัย ช่วงภัย 8 พ.ค. 66 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พะเยา เพชรบูรณ์ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร เพชรบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ชุมพร ตรัง หนอง และจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 1,753 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 8,237 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,245 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,806 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 1,186 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 712 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 3,146 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 955 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,710 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 481 ไร่ คิดเป็นเงิน 6.61 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 511 ราย (คิดเป็นร้อยละ 71.77 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 2,644 ไร่ วงเงิน 5.33 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 80.64 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 66)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (พะเยา สกลนคร สุรินทร์ กาญจนบุรี และเพชรบุรี) จำนวน 77 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 127 ไร่	- เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ให้ความคุมระดับน้ำในนาข้าว แบบเปียกสลับแห้ง เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยหรือตัวอ่อน เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้นให้ใช้สารกำจัดแมลง
	2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (เชียงใหม่ น่าน สกลนคร พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 72 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- เพลี้ยกระโดดหลังขาว ให้ใช้พันธุ์ต้านทานโดยปลูกสลับกันอย่างน้อย 2 พันธุ์ เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัวต่อต้นให้ใช้น้ำออกจากแปลงนาและปฏิบัติเช่นเดียวกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. โรคไหม้ข้าว 4. หนอนกอข้าว 5. แมลงบั่ว 6. โรคใบจุดสีน้ำตาล 7. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ ลำพูน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สกลนคร สุรินทร์ และอุบลราชธานี) จำนวน 3,717 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 51 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี และฉะเชิงเทรา) จำนวน 398 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 263 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตาก และพัทลุง) จำนวน 508 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 47 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ลำพูน นครราชสีมา และ สกลนคร) จำนวน 18 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา สกลนคร พังงา สตูล) จำนวน 299 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 77 ไร่	- โรคไหม้ข้าว ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก - ฟันเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร - หนอนกอข้าว ให้เฝ้าตอซึ่งหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดิน เพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซึ่ง - แมลงบั่ว ให้กำจัดวัชพืชก่อนหว่านข้าวเพื่อทำลายพืชอาศัยของแมลงบั่ว ไม่ควรปลูกข้าวโดยวิธีหว่านหรือปักดำถี่ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการระบาดของแมลงบั่วเป็นประจำ ทำลายตัวเต็มวัยช่วงเวลาตั้งแต่ 19:00-21:00 น. โดยใช้ไม้ตีแมลงวัน - โรคใบจุดสีน้ำตาล แนะนำให้ปรับปรุงดินโดยการไถกลบใช้ฟางคลุมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าพบอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาลรุนแรง ควรพ่นสารกำจัดเชื้อรา - หนอนห่อใบข้าว หมั่นสำรวจแปลงนาและกำจัดพืชอาศัยเมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัวต่อตารางเมตร และพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์
มะพร้าว	1. หนอนกินใบมะพร้าว 2. หนอนหัวดำ 3. แมลงดำหนาม 4. ตัวงวง 5. ตัวงแตร	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 25 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร สตูล พังงา นครศรีธรรมราช ปัตตานี ภูเก็ต สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,312 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1,215 ไร่ พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,470 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 494 ไร่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,314 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,340 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 28 ไร่	- รมรงค์ให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวและหนอนหัวดำทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ อัตราไร่ละ 200 ตัว และปลอ่ยแตนเบียนไข่หรีโครแกรมมา เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส เพื่อควบคุมหนอนของแมลงดำหนามมะพร้าวในพื้นที่ และปลอ่ยแตนเบียนเตตระสตีดัส ควบคุมดักแด้แมลงดำหนามมะพร้าว - ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับตัวงวงและตัวงแตรในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดตัวงแตรในระยะดักแด้ - ไร่สีขาจะเข้าทำลายอยู่ภายในช่วงผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไร่ไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไร่ในระยะมะพร้าวติดจั่น

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	6. โรสสีขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสงขลา) จำนวน 414 ไร่ การระบาดคงที่	
ปาล์ม น้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. ดั้วกุหลาบ 3. หนอนปลอกเล็ก 4. โรคลำต้นเน่า 5. โรคทะลายเน่า 6. โรคใบจุด 7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,671 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 718 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,520 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 11,734 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4,739 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 95 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 84 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,118 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่	- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียมเพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - พ่นด้วงกุหลาบด้วยสารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน (Sevin) หรือคาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) - หนอนปลอกเล็ก พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบ และต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบเป็นโรค นำออกไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง และกำจัดวัชพืช - แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลง ตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ลดการใช้น้ำไนโตรเจน และตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายในช่วงฤดูฝน สรรวจสภาพแต่ละครั้งตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคราแป้ง 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ปัตตานี พัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,494 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครศรีธรรมราช) จำนวน 100 การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (มุกดาหาร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,354 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 92,213 ไร่ การระบาดคงที่	- กำหนดแนววิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารารุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรังค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ และทำร่องบริเวณโคนต้นยางพาราให้ร่องขวางกับลำต้น เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามลงสู่ราก

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
กาแฟ	1. โรคราสนิม 2. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง - หนอนกาแฟสีแดง ควรหมั่นทำความสะอาดแปลงและตรวจดูตามกิ่งและลำต้นกาแฟอยู่เสมอ หากพบการเข้าทำลายของหนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟสีแดง ให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลง ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเพนิโตรโซอน อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลังสีชมพู 3. เพลี้ยหอย 4. ไรแดงมันสำปะหลัง 5. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง 6. โรคพุ่มแจ้ 7. โรคโคนเน่าหัวเน่า	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 84 ไร่ การระบาดลดลง 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และอุบลราชธานี) จำนวน 4 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 13 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี ชลบุรี และระยอง) จำนวน 31 ไร่ การระบาดลดลง 65 ไร่ พื้นที่ระบาด 34 จังหวัด (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์หนองบัวลำภู อุบลราชธานี ชัยนาท สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 177,053 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10,954 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 30 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตาก ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร อุบลราชธานี และชลบุรี) จำนวน 2,186 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 129 ไร่	- เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด เมื่อพบการระบาดถอนต้นมันสำปะหลังไปทำลาย - การควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ปล่อยให้กระจายตัวแปลง ให้เจริญเติบโต และขยายพันธุ์ได้น้อย 10 เท่า ในทุกชั่วอายุ - เพลี้ยหอย ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากเพลี้ยหอย ให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลง - ไรแดง ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน หากเริ่มพบการเข้าทำลายของไรแดงควรเก็บทิ้งหรือทำลาย - โรคใบด่างมันสำปะหลัง ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - โรคพุ่มแจ้ ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด และกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - โรคโคนเน่าหัวเน่า ควรยกแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วย เมทาแลกซิล หรือฟอสอีทีลอะลูมิเนียม เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรค ถอนนำไปทำลายนอกแปลงแล้วโรยปูนขาว หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บเศษเหง้าและเศษซากมันสำปะหลัง ไปทำลายนอกแปลงปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทุ้งข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (เชียงใหม่ นครราชสีมา ชัยนาท จันทบุรี สระแก้ว พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล) จำนวน 686 ไร่ การระบาดลดลง 7,071 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และระยอง) จำนวน 88 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	- ทำความสะอาดแปลง ส่วนการเตรียมดินให้ตัดต้นและปักตอเก่าสับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลายนอกแปลง เพื่อกำจัดไวรัสและแมลงพาหะก่อนปลูกต้องมีการไถและพรวนดินหลายๆ ครั้ง ควรตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งแช่ท่อนพันธุ์เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง
อ้อย	1. หนอนกออ้อย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (อุทัยธานี ขอนแก่น นครพนม ชัยนาท นครราชสีมา และบุรีรัมย์) จำนวน 3,860 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน ปล่อยให้ต้นอ้อยโตโรจนครบ 30,000 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ปล่อยให้ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ใช้ช่วงที่พบกลุ่มไข่ของ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. ดั๋งหนวดยาว 3. โรคราขาว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (พิจิตร และนครราชสีมา) จำนวน 503 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ขอนแก่น) จำนวน 16 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	หนอนกออ้อย ปล่องแมลงทางหนี้อัตรา 500 ตัวต่อไร่ - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคราขาว แช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคราใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชุมพร และภูเก็ต) จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 102 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 21 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และจันทบุรี) จำนวน 4 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 10 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคราใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ให้สังเกตดูใบอ่อน และใบแก่ - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล หมั่นตรวจดูหากพบวราแป้งเข้าทำลายให้ทำการพ่นด้วยผงกำมะถันละลายน้ำ 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทำให้การระบาดในช่วงติดผลนั้นลดความรุนแรงลงได้ ในช่วงระยะผลอ่อน
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง 4. ไรแดงแอฟริกา 5. โรครากเน่าโคนเน่า 6. โรคราใบดกหรือใบไหม้ 7. โรคราใบจุดสาหร่าย 8. เพลี้ยหอยเกล็ด 9. เพลี้ยจักจั่นฝอย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 204 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 485 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 28 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และยะลา) จำนวน 241 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 360 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,616 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 841 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 334 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 533 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 222 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 395 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 43 ไร่	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยไก่แจ้ ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง หากบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่น - ไรแดงแอฟริกา กำจัดวัชพืชในสวน เมื่อพบระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคราใบดกหรือใบไหม้ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่นนำไปทำลายนอกแปลง ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง ในพื้นที่ปลูกที่มีความชื้นสูง - โรคราใบจุดสาหร่าย เมื่อเริ่มมีอาการของโรคให้ตัดใบหรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หรือฝังดิน - หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียนเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกทำลายเผาทั้ง พบบนปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวด์ออกซ์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่ว ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียน - หมั่นสำรวจแปลงปลูกทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงได้แก่ คาร์โบซัลแฟน 20% อัตรา 50 มิลลิลิตร โซเปอร์เมทริน/โพซาโลน 6.25% / 22.5% อัตรา 40 มิลลิลิตร อิมิดาโคลพริด 10% อัตรา 10 มิลลิลิตร โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน - ป้องกันวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง ผสมน้ำ 20 ลิตรพ่นห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์ เริ่มเมื่อผลอายุ 6 สัปดาห์

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	10. หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 11. โรคราดำ 12. โรคราสีชมพู 13. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 2 ไร่ (ตราด และกระบี่) จำนวน 156 ไร่ การระบาดลดลง 147 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 165 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 195 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตราด) จำนวน 6 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	- กำจัดวัชพืชในแปลง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกลดความชื้นสะสม เมื่อพบการระบาดสีดำนด้วยน้ำเปล่า และสารเหนียวเพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค - ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อเป็นการลดความชื้นสะสม หากพบอาการของโรคที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลงหรือเผื่อนเปลี่ยนบริเวณที่เป็นโรครอก และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ ผสมน้ำทาบริเวณแผลที่ตัด - หมั่นตรวจดูตามผลทุเรียน เมื่อพบรอยทำลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือสวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงให้ทำลายโดยเผาไฟหรือฝัง และห่อผลด้วยถุง
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนซอนใบ 4. โรคใบจุด 5. โรคแอนแทรคโนส 6. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง และชุมพร) จำนวน 178 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 280 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 103 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 112 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 54 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง และนราธิวาส) จำนวน 223 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 36 ไร่	- หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงและไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน - หมั่นสำรวจและสังเกตการณ์เข้าทำลายของหนอนซอนใบอย่างสม่ำเสมอ - โรคใบจุด ควรหมั่นสำรวจทำความสะอาดแปลงปลูก และกำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งสะสมโรค พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน ได้แก่ คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ 85% - โรคแอนแทรคโนส ให้หมั่นทำความสะอาดแปลงปลูกและทำลายส่วนที่เป็นโรค พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช - โรคใบจุดสาหร่าย ให้หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรค ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หรือฝังดินนอกแปลง ไม่ทิ้งไว้ในบริเวณแปลง
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคพุ่มไม้กวาด 3. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 12 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 88 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (พะเยา และจันทบุรี) จำนวน 525 ไร่ การระบาดลดลง 16 ไร่	- เพลี้ยแป้ง ให้หมั่นสำรวจแปลงลำไยทุกสัปดาห์หากพบการระบาดแนะนำให้ตัดส่วนของกิ่งก้านที่มีเพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ไปทำลาย หากพบว่าเพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไยควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด มาลาไธออน 83% อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่ว - โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ - โรคราดำ ให้ป้องกันและกำจัดแมลงพวกปากดูด เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยเพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยอ่อน เป็นต้น

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 66)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – ตุลาคม 2566 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 13 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 17 จุด ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค(ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้

7.2 โรคล้มปัสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 66)

พบการระบาดของสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 27 ตุลาคม 2566 รวม 70 จังหวัด 899 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 657,682 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 2 ตัว สัตว์ตายสะสม 75,557 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 207,465 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 38,467 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 228,002 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 175,180 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 138,631 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 444,383 ราย