



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819959 E-mail : droughtcenter@gmail.com
[http:// www.moac.go.th](http://www.moac.go.th)



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

วันที่ 9 เมษายน 2567 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 เมษายน 2567) ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 05.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป ประกอบกับในช่วงวันที่ 9-11 เมษายน 2567 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาและผ่านภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่น ๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย

จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้

วันที่ 9 เมษายน 2567

ภาคเหนือ จังหวัดน่าน แพร่ อุดรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและจังหวัดตราด

วันที่ 10 เมษายน 2567

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุดรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และจังหวัดตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย และจังหวัดชัยภูมิ


ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง

วันที่ 11 เมษายน 2567

ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ และจังหวัดตาก

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 8 เม.ย. 67 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 9 เม.ย. 67



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เดชอุดม	อุบลราชธานี	21.2	ฝนตกปานกลาง
2	อ.สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	1.1	ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เม.ย. 67)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 45,025 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59 ปริมาณน้ำใช้การได้ 21,085 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (47,339 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 2,314 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 11.34 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 136.00 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 31,312 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 42,193 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 18,655 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (44,289 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 2,096 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 6.54 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 120.77 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 28,733 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณ.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณ.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณ.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณ.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณ.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณ.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	12,553	51	5,808	32	80	1,083	644	59	553	56	88	25,908	13,197	51	6,361	33	12,711
ตอน.	12	8,368	4,272	51	2,620	39	226	2,061	1,133	55	967	51	238	10,429	5,405	52	3,587	42	5,024
กลาง	3	1,419	392	28	332	24	27	419	168	40	144	37	30	1,838	560	30	476	27	1,277
ตะวันตก	2	26,605	18,937	71	5,660	42	8	164	66	40	55	36	10	26,769	19,003	71	5,715	42	7,766
ตะวันออก	6	1,515	560	37	465	33	52	1,006	433	43	377	40	58	2,520	993	39	842	36	1,528
ใต้	4	8,194	5,480	67	3,770	58	42	679	388	57	334	53	46	8,874	5,868	66	4,104	58	3,005
รวม	35	70,926	42,193	59	18,655	39	435	5,411	2,832	52	2,430	49	470	76,337	45,025	59	21,085	40	31,312

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 12,294 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 5,598 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 31) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 1.88 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 40.08 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,577 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับ ได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	7,340	55	3,540	37	0.00	0.00	23.00	23.00	6,122
สิริกิตี	4,349	46	1,499	23	1.66	1.61	11.03	10.99	5,161
ภูมิพล+สิริกิตี	11,689	51	5,039	31	1.66	1.61	34.03	33.99	11,283
แควน้อยฯ	349	37	306	34	0.22	0.46	3.46	3.46	590
ป่าสักชลสิทธิ์	256	27	253	26	0.00	0.00	2.60	2.59	704
รวมทั้งหมด	12,294	49	5,598	31	1.88	2.07	40.08	40.03	12,577

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 8 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ สิริกิตี (23%) อ่างฯ แม่มอก (23%) อ่างฯ จุฬารักษ์ (17%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (26%) อ่างฯ กระเสียว (11%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (27%) อ่างฯ คลองสิียด (5%) และอ่างฯ ปราณบุรี (23%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโกลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 264 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 268 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.17 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.53 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.82 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.85 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.41 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.41 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 76 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 76 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 60 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 11 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 5 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เชื่อนพระรามหก 6 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 6 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 56 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 57 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศรัศดิ์) 13 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 17 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 78 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 77 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุโมง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุโมง) - ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว 2 ลบ.ม./วินาที) แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 30 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 37 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 9 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 92 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 182 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		3 เม.ย. 67	4 เม.ย. 67	5 เม.ย. 67	6 เม.ย. 67	7 เม.ย. 67	8 เม.ย. 67	9 เม.ย. 67		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาเกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.71	0.58	0.55	0.48	0.45	0.44	0.46	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	1.13	0.83	0.77	0.64	0.59	0.63	0.63	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 9 เม.ย. 67	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.54	-11.26
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	3.12	-12.88
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	0.80	-11.40
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.14	-10.86
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.64	-10.86
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.17	-12.33

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (วันที่ 1 พ.ย.66 ถึง 30 เม.ย.67) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 40,387 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ จำนวน 24,985 ล้าน ลบ.ม. สำหรับในเขตลุ่มเจ้าพระยา ได้วางแผนจัดสรรน้ำ จำนวน 8,700 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 20,950 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ) วันนี้ใช้น้ำไป 40.08 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 7,569 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 87 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	3,050	7,760	13,555	620	24,985	20,950	84
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	2,722	4,693	135	8,700	7,569	87



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

ทั่วประเทศ จำนวน 10.66 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.13 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.53 ล้านไร่

กลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 4.90 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.20 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.70 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2567)

ทั่วประเทศ จำนวน 13.29 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.52 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.56 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 124.67 ของแผน

กลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 7.80 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.23 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.36 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 159.18 ของแผน

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2566/67			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2566/67						ข้าวรอบที่ 2	
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวรอบที่ 2	%ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวมทั้งหมด	%รวมทั้งหมด	พื้นที่เก็บเกี่ยว	พื้นที่รอเก็บเกี่ยว
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	5.80	0.57	6.37	9.06	156.21	0.52	91.23	9.79	153.69	4.50	4.77
	นอกเขตชลประทาน	2.33	1.96	4.29	2.46	105.58	1.04	53.06	3.50	81.59	1.22	1.24
	รวม	8.13	2.53	10.66	11.52	141.70	1.56	61.66	13.29	124.67	5.72	6.01
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	3.03	0.13	3.16	5.68	187.46	0.09	69.23	5.98	189.24	3.61	2.28
	นอกเขตชลประทาน	1.17	0.57	1.74	1.55	132.48	0.27	47.37	1.82	104.60	1.09	0.46
	รวม	4.20	0.70	4.90	7.23	172.14	0.36	51.43	7.80	159.18	4.70	2.74

พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน รวม 54 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 4.21 ล้านไร่ ได้แก่

- ในเขตชลประทาน 49 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 3.69 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร นครนายกหนองคายหนองบัวลำภูอำนาจเจริญอุดรธานีอุบลราชธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามระยองสระแก้วกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและจังหวัดกระบี่

- นอกเขตชลประทาน 23 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.46 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก น่าน นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม หนองบัวลำภูอำนาจเจริญชัยนาทตราดนครนายกสุพรรณบุรีและจังหวัดตรัง

5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 16 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 4 เมษายน 2567

ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง 2 หน่วย 6 เที่ยวบิน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการฯ เชียงใหม่ และศูนย์ปฏิบัติการฯ สงขลา

- การกักการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบริเวณพื้นที่การเกษตร จังหวัดกระบี่ ตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร กระบี่ (เขาพนม ลำทับ) ตรัง (กันตัง ย่านตาขาว หาดสำราญ ปะเหลียน) และจังหวัดนครศรีธรรมราช (ถ้าพรธรธา ฉวาง ลานสกา ทุ่งใหญ่ ช้างกลาง นาบอน ทุ่งสง บางขัน ร่อนพิบูลย์)

- การกักตุนแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ที่เกินค่ามาตรฐาน มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบริเวณพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ และจังหวัดลำปาง หลังการปฏิบัติการได้มีการติดตามปริมาณค่าฝุ่นละออง (PM_{2.5}) พบว่าในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ และจังหวัดลำปาง มีแนวโน้มลดลง

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2567)

- การปฏิบัติการฝนหลวง 63 วัน จำนวน 584 เที่ยวบิน (902:45 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 296.725 ตัน และปริมาณการใช้น้ำ 257,800 ลิตร พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 194 นัด รายงานพื้นที่ฝนตก รวม 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี กระบี่ พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา

- การปฏิบัติการภารกิจดับไฟป่า จำนวน 10 วัน จำนวน 132 เที่ยวบิน (24:35 ชั่วโมงบิน) ปริมาณน้ำ 72,500 ลิตร พื้นที่ปฏิบัติการ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกระบี่

6. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- **เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่** เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบล-โคก-บรีโคก พืชไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 จำนวน 2,289 เครื่อง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ ประจำวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2567 งานขาดแคลนน้ำ จำนวน 5 เครื่อง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก

- **เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ** รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

7. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 67)

7.1 อุทกภัย ช่วงภัย 25 ม.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง เกษตรกร 7 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ (บ่อปลา) 2 ไร่ กระชัง 256 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 7 ราย พื้นที่(บ่อปลา) 2 ไร่ กระชัง 256 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 103,572 บาท

ด้านพืช และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.2 วาตภัย ช่วงภัย 13 ม.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี บึงกาฬ เลย และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 1,391 ราย รวมพื้นที่ 16,458 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8,955 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 6,495 ไร่ และไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 1,008 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 170 ราย รวมพื้นที่ 1,204 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 702 ไร่ พืชไร่ และพืชผัก 494 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 8 ไร่ คิดเป็นเงิน 1.95 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 14 ราย (คิดเป็นร้อยละ 8.24 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 58 ไร่ วงเงิน 123,112 บาท (คิดเป็นร้อยละ 6.31 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.3 อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัย 22 – 28 ธ.ค. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 20,928 ราย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 28,983 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,002 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,246 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 18,735 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,179 ราย พื้นที่ 2,142 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 366 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 205 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 1,571 ไร่ คิดเป็นเงิน 7.25 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 939 ราย (คิดเป็นร้อยละ 79.64 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 1,747 ไร่ วงเงิน 6.30 บาท (คิดเป็นร้อยละ 86.80 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา เกษตรกร 716 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 278 ไร่ กระชัง 13,283 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 6.20 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 467 ราย (คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 157 ไร่ กระชัง 3,019 ตร.ม. วงเงิน 2.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 33.96 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 34,889 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 577,782 ตัว แบ่งเป็น โค 54,435 ตัว กระบือ 2,217 ตัว สุกร 5,574 ตัว แพะ/แกะ 30,560 ตัว สัตว์ปีก 484,996 ตัว แปลงหญ้า 1,183 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 219 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 1,389 ตัว แบ่งเป็น โค 245 ตัว กระบือ 6 ตัว สุกร 18 ตัว แพะ/แกะ 107 ตัว และสัตว์ปีก 1,013 ตัว คิดเป็นเงิน 8.70 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

7.4 อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัย 1 พ.ย. 66 – 30 พ.ย. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง พัทลุง ปัตตานี นครศรีธรรมราช ยะลา ระนอง นราธิวาส สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 44,131 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 67,238 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 30,355 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 10,649 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 26,234 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 3,001 ราย พื้นที่ 14,992 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10,577 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 2,910 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 1,505 ไร่ คิดเป็นเงิน 26.02 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,396 ราย (คิดเป็นร้อยละ 46.52 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 8,946 ไร่ วงเงิน 16.12 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 61.96 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 7,342 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 20,068 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 12,707 ไร่ บ่อกุ้ง 7,361 ไร่ กระชัง 20,319 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 7,342 ราย พื้นที่ (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 20,068 ไร่ กระชัง 20,319 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 153.58 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 235 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3.20 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 261 ไร่ กระชัง 1,245 ตร.ม. วงเงิน 2.12 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย เกษตรกร 371 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 6,063 ตัว แบ่งเป็น โค 200 ตัว กระบือ 29 ตัว สุกร 38 ตัว แพะ/แกะ 236 ตัว และสัตว์ปีก 5,560 ตัว คิดเป็นเงิน 7.77 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

7.5 อุทกภัย ช่วงภัย 10 ก.ย. – 6 พ.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตรัง สระแก้ว นครศรีธรรมราช และจังหวัดยะลา เกษตรกร 155,188 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 1,310,189 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 990,971 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 316,499 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 2,718 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,965.58 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 80,267 ราย (คิดเป็นร้อยละ 51.72 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 611,179 ไร่ วงเงิน 891.19 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 45.34 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 43 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พิจิตร พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ตรัง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ยะลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 8,424 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 10,365 ไร่ กระชัง 2,316 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 53.96 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 5,230 ราย (คิดเป็นร้อยละ 62.08 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 6,255 ไร่ กระชัง 413 ตร.ม. วงเงิน 31.90 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 59.11 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน แพร่ เพชรบูรณ์ ลำพูน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ขอนแก่น ชัยภูมิ และจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกร 466 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 7,250 ตัว แบ่งเป็น โค 26 ตัว กระบือ 3 ตัว สุกร 12 ตัว และสัตว์ปีก 7,209 ตัว แปลงหญ้า 1,354 ไร่ คิดเป็นเงิน 3.85 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

7.6 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 22 พ.ค. 66 – 18 ก.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยนาท สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 32,033 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 357,679 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 240,176 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 117,410 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 93 ไร่ คิดเป็นเงิน 554.68 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 12,993 ราย (คิดเป็นร้อยละ 40.52 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 175,574 ไร่ วงเงิน 299.00 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 53.17 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

8. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 67)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 3. โรคไหม้ข้าว 4. หนอนกอข้าว 5. โรคใบจุดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ สุรินทร์ พัทลุง และกรุงเทพมหานคร) จำนวน 17 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ น่าน และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 39 ไร่ การระบาดลดลง 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (เพชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท จันทบุรี และกาญจนบุรี) จำนวน 87 ไร่ การระบาดลดลง 65 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร และร้อยเอ็ด) จำนวน 7 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สกลนคร และสงขลา) จำนวน 35 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้ความคุมระดับน้ำในนาข้าว แบบเปียกสลับแห้ง เมื่อตรวจพบ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยหรือตัวอ่อน เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง - ให้ใช้พันธุ์ต้านทานโดยปลูกสลับกันอย่างน้อย 2 พันธุ์ เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัวต่อต้น - เมื่อพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ พ่นเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร - ให้กำจัดวัชพืชรากก่อนหว่านข้าวเพื่อทำลายพืชอาศัย ไม่ควร ปลูกข้าวโดยวิธีหว่านหรือปักดำ - ให้เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดิน เพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วงวง 4. หนอนกินใบมะพร้าว 5. ดั้วแรด 6. ไรสีขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 28 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรว สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 16,040 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 11 ไร่ พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรว ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 14,954 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 413 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 15 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรว สมุทรปราการ กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,481 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรว ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,761 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรว สระแก้ว สมุทรปราการ นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร ชุมพร ตรัง และพัทลุง) จำนวน 494 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	- หนอนหัวดำ ปล่อยแตนเบียนบราคอน อัตราไร่ละ 200 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ปล่อยแตนเบียน ไชทริโคแกรมมา อัตราไร่ละ 10 แผ่น ๆ ละ 2,000 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน และใช้สารเคมีอิมิมาเม็กดิน เบนโซโท โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน - ดัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย และ เก็บเศษซากพืชน้ำไปเผานอกแปลงทันที และหมั่นสำรวจ สวมมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและแมลงดำหนาม กัดกินไปเผาทำลาย ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส 3-5 ครั้ง เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว ปล่อยแตนเบียน เตตระสติคัส (โดยปล่อยทุก 7 วัน ต่อเนื่อง 1 เดือน) - ใช้กับดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงและด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ปาล์ม น้ำมัน	1. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,705 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่	- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับดั้วแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน
	2. ดั้วงูหลาบ	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 705 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	- หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอกปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซพวิน อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน
	3. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,437 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่	- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน
	4. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 10,032 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 69 ไร่	- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
	5. โรคทะลายเน่า	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 183 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 71 ไร่	- ตัดใบย่อยที่มีหนอนหน้าแมว หรือเก็บดักแด้ตามใบ และชอกโคนมาทำลาย พ่นแบคทีเรีย Bt อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นสารฆ่าแมลงบริเวณผิวใบ เฉลี่ย 20 ตัวต่อทางใบ
	6. หนอนหน้าแมว	พื้นที่ปลูก 4 จังหวัด (ระยอง พัทลุง สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 423 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฟ่อ และทะลายที่พบเป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง ให้ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน
	7. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ยะลา นราธิวาส สงขลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 94 ไร่ การระบาดคงที่	- เผ่าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคใบจุดสาหร่าย ในช่วงฤดูฝน สำรวจสัปดาห์ละครั้ง
	8. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 910 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่	- ก้านทางใบเน่า แนะนำแก่เกษตรกรให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตราส่วนตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
	9. ก้านทางใบเน่า	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กระบี่ นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 467 ไร่ การระบาดคงที่	
ยางพารา	1. โรคราขาว	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,826 ไร่ การระบาดลดลง 13 ไร่	- คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคราขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น
	2. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครศรีธรรมราช) จำนวน 100 ไร่ การระบาดคงที่	- ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
	3. โรคใบร่วงยางพารา	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ปัตตานี นครศรีธรรมราช พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,004 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา
	4. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา	พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (น่าน แพร่ สุโขทัย ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,459,856 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ
	5. โรคหน้ำยางแห้ง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ยโสธร สกลนคร จันทบุรี ตรัง สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,438 ไร่ การระบาดลดลง 78 ไร่	- เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือ จนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบกรีด การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งในรูปปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยพืชสด
กาแฟ	1. โรคราสนิม	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง
	2. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่	
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง) จำนวน 675 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและป็นตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี จันทบุรี สระแก้ว ยะลา สงขลา และสตูล) จำนวน 204 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) และนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครราชสีมา) จำนวน 45 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ปล่อยแมลงหางหนีบอัตรา 500 ตัวต่อไร่
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. ไรแดงมันสำปะหลัง 3. โรคโคนเน่าหัวเน่า 4. โรคพุ่มแจ้ 5. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร อุบลราชธานี จันทบุรี ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 157 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 15,030 ไร่ การระบาดลดลง 1,178 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา อุบลราชธานี และชลบุรี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี ชลบุรี และกาญจนบุรี) จำนวน 317 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 50 ไร่ พื้นที่ระบาด 29 จังหวัด (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี ชัยนาท สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 216,382 ไร่ การระบาดลดลง 3,989 ไร่	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่างด้วย 3 วิธี - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด และกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - ควรกรองแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสฟิไทล-อะลูมิเนียม
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี) จำนวน 10 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 108 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 31 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ขอนแก่น) จำนวน 1 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ให้สังเกตดูใบอ่อน และใบแก่ - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตรด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,311 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 42 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ตรด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 641 ไร่ การระบาดลดลง 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตรด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 418 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 20 ไร่	- หากพบเพลี้ยไฟ ไรแดงแอฟริกาจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยไก่แจ้ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้งหากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายทิ้งนอกแปลง - โรคราแป้งแนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคใบด่างหรือใบไหม้ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่นนำไป - เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรครังคราบดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. ไรแดง 5. โรครากเน่าโคนเน่า 6. โรคใบติดหรือใบไหม้ 7. โรคใบจุดสาหร่าย 8. เพลี้ยหอยเกล็ด 9. เพลี้ยจักจั่นฝอย 10. โรคคราดำ 11. โรคราสีชมพู	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,254 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 431 ไร่ พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,151 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 14 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 250 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 526 ไร่ การระบาดลดลง 32 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 334 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 408 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 35 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ยะลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 152 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 146 ไร่ การระบาดลดลง 19 ไร่	- หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสม ไวต์ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ - เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง - ติดตั้งทรงพุ่มให้โปร่ง กำจัดวัชพืชในแปลง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกลดความชื้นสะสม เมื่อพบคราบราสีดำนใช้น้ำเปล่า - กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อเป็นการลดความชื้นสะสม หากพบอาการของโรคที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง หรือเอนเปลือกริเวณที่เป็นโรคออก และใช้สารคอปเปอร์-ออกซีคลอไรด์ ผสมน้ำทาบริเวณแผลที่ตัด
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ 4. โรคใบจุด 5. โรคแอนแทรคโนส 6. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง และชุมพร) จำนวน 439 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 231 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 304 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 144 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 56 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 86 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง และนราธิวาส) จำนวน 255 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่	- หมั่นทำความสะอาดแปลงปลูก และทำลายส่วนที่เป็นโรค เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรคให้ตัดใบหรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดของโรคให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน - กำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งสะสมโรค พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. โรคคราดำ 3. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 91 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา อุบลราชธานี และจันทบุรี) จำนวน 269 ไร่ การระบาดลดลง 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 18 ไร่ การระบาดคงที่	- หมั่นสำรวจแปลงหากพบกิ่งที่เป็นโรคให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง ป้องกันแมลงพาหะจำพวกปากดูดพวกเพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาล โดยใช้สารเคมี ได้แก่ คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มิลลิลิตร หรือไอโซไพร์-คาร์บอน อัตรา 40 กรัม

9. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค. 67)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 19 มีนาคม 2567 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 14 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 126 จุด ในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ นครนายก อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์ อุดรดิตถ์ สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้