



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819959 E-mail : droughtcenter@gmail.com
[http:// www.moac.go.th](http://www.moac.go.th)



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

วันที่ 30 มกราคม 2567 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ


1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.

ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงและอุณหภูมิลดลง สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้เริ่มอ่อนกำลังลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วย

ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันเพิ่มขึ้น เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมเริ่มมีกำลังอ่อนลง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 29 ม.ค. 67 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 30 ม.ค. 67



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	หนองคาย	7.2	ฝนตกเล็กน้อย
2	อ.เมือง	ยะลา	5.6	ฝนตกเล็กน้อย
3	อ.หาดใหญ่	สงขลา	5.4	ฝนตกเล็กน้อย
4	อ.เมือง	ตาก	3.5	ฝนตกเล็กน้อย
5	อ.เมือง	อุดรธานี	2.0	ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 67)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 55,199 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 31,258 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (58,005 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 2,806 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 33.79 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 139.50 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 21,149 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 51,279 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 27,742 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (53,647 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 2,368 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 26.58 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 123.55 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 19,658 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	15,949	64	9,204	51	80	1,083	861	80	770	78	88	25,908	16,810	65	9,975	52	9,109
ตอน.	12	8,368	6,049	72	4,398	65	226	2,061	1,543	75	1,375	73	238	10,429	7,592	73	5,774	67	2,837
กลาง	3	1,419	765	54	705	52	27	419	258	62	234	60	30	1,838	1,023	56	940	54	814
ตะวันตก	2	26,605	21,536	81	8,259	62	8	164	99	61	88	58	10	26,769	21,635	81	8,346	62	5,134
ตะวันออก	6	1,515	895	59	801	56	52	1,006	649	65	592	62	58	2,520	1,544	61	1,393	59	976
ใต้	4	8,194	6,085	74	4,375	67	42	679	510	75	456	73	46	8,874	6,595	74	4,831	68	2,279
รวม	35	70,926	51,279	72	27,742	59	435	5,411	3,920	72	3,516	70	470	76,337	55,199	72	31,258	60	21,149

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 15,757 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 9,061 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 9.09 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 54.80 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 9,114 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับ ได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	9,075	67	5,275	55	3.74	0.72	30.00	28.82	4,387
สิริกิตี	5,351	56	2,501	38	4.91	9.04	14.00	14.23	4,159
ภูมิพล+สิริกิตี	14,426	63	7,776	48	8.65	9.76	44.00	43.05	8,546
แควน้อยฯ	727	77	684	76	0.44	0.00	5.18	5.18	212
ป่าสักชลสิทธิ์	604	63	601	63	0.00	0.00	5.62	5.62	356
รวมทั้งหมด	15,757	63	9,061	50	9.09	9.76	54.80	53.85	9,114

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปของความจุอ่างฯ จำนวน 6 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ แม่งัดสมบูรณ์ชล (104%) อ่างฯ กัวลม (83%) อ่างฯ กัวคองมา (94%) อ่างฯ อ่างฯ ศรีนครินทร์ (81%) อ่างฯ อ่างฯ หนองปลาไหล (88%) และ อ่างฯ บางยาง (85%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ กระเสียว (20%) อ่างฯ คลองสิียด (20%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำโขง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 286 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 276 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.48 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.22 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.54 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.59 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.41 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.28 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 111 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 110 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 86 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 15 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 10 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 5 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 67 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 67 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลย์) 13 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 27 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 128 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 127 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมทอง) 12 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว 4 ลบ.ม./วินาที) แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 50 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 50 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 12 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 182 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 90 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		24 ม.ค. 67	25 ม.ค. 67	26 ม.ค. 67	27 ม.ค. 67	28 ม.ค. 67	29 ม.ค. 67	30 ม.ค. 67		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาเกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.73	0.75	0.80	0.82	1.01	1.06	1.01	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	1.45	1.48	1.53	1.54	1.79	1.90	1.79	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 30 ม.ค. 67	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.92	-10.88
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.44	-11.56
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.22	-10.98
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.21	-10.79
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.70	-10.80
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.13	-12.37

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (วันที่ 1 พ.ย.66 ถึง 30 เม.ย.67) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 36,941 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ จำนวน 21,810 ล้าน ลบ.ม. สำหรับในเขตลุ่มเจ้าพระยา ได้วางแผนจัดสรรน้ำ จำนวน 6,100 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 10,973 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริภักดิ์ แคว้น้อยฯ ป่าสักฯ) วันนี้น้ำใช้ไป 3,759 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 3,759 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	3,060	7,195	10,955	600	21,810	10,973	44
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	2,500	2,315	135	6,100	3,759	44



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

ทั้งประเทศ จำนวน 10.66 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.13 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.53 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 4.90 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.20 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.70 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567)

ทั้งประเทศ จำนวน 10.35 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 9.28 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.07 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 97.09 ของแผน

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 6.76 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 6.48 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.28 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 137.96 ของแผน

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2566/67			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2566/67					
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวรอบที่ 2	%ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวมทั้งหมด	%รวมทั้งหมด
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	5.80	0.57	6.37	7.88	135.86	0.39	68.42	8.27	129.83
	นอกเขตชลประทาน	2.33	1.96	4.29	1.40	60.09	0.68	34.69	2.08	48.48
	รวม	8.13	2.53	10.66	9.28	114.15	1.07	42.29	10.35	97.09
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	3.03	0.13	3.16	5.44	179.54	0.09	69.23	5.53	175.00
	นอกเขตชลประทาน	1.17	0.57	1.74	1.04	88.89	0.19	33.33	1.23	70.69
	รวม	4.20	0.70	4.90	6.48	154.29	0.28	40.00	6.76	137.96

พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน รวม 44 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 3.28 ล้านไร่ ได้แก่

- ในเขตชลประทาน 42 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 3.12 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุดรธานี อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก สมุทรปราการ สมุทรสาคร ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดกระบี่

- นอกเขตชลประทาน 10 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.16 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดตาก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร ชัยนาท ตราด นครนายก และจังหวัดสุพรรณบุรี

5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2566 และตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป จำนวน 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ระยอง และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพื้นที่ที่ยังมีความต้องการน้ำ และปฏิบัติการด้านหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM₁₀ และ PM_{2.5}) และไฟฟ้า

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 24 ธันวาคม 2566 – 29 มกราคม 2567)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ไม่มีการขอรับบริการ
กลาง	ไม่มีการขอรับบริการ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีการขอรับบริการ
ภาคตะวันออก	ไม่มีการขอรับบริการ
ภาคใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	0 จังหวัด (0 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ประจำวันที่ 29 มกราคม 2567

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
เชียงใหม่	2	ปฏิบัติการตัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ₁₀ และ PM _{2.5}) ในพื้นที่ ภาคเหนือ ผลการปฏิบัติการฯ จากการติดตามกลุ่มเมฆด้วยภาพถ่ายดาวเทียม พบว่า กลุ่มเมฆบางกลุ่มสลายตัว บางกลุ่มรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ และพัฒนาตัวก่อยอดสูงขึ้นจากเดิมเล็กน้อย จากการติดตามกลุ่มเมฆหลังปฏิบัติการ 1 ชั่วโมง พบเมฆพัฒนาตัวรวมกลุ่มกันใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ยอดเมฆสูงประมาณ 8,000 - 8,500 ฟุต จากการติดตามปริมาณ

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวน เที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
		ค่าฝุ่นละออง (PM2.5) ใน จ.ลำปาง พบว่า ค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มคงที่ ยกเว้นสถานี ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยก่อนปฏิบัติการฯ พื้นที่ภาคเหนือมีสถานีที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 2 สถานี คิดเป็นร้อยละ 6.90 หลังปฏิบัติการฯ สถานีที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพลดลงเหลือจำนวน 1 สถานี คิดเป็นร้อยละ 3.45
พิษณุโลก	0	ไม่ปฏิบัติการตัดแปรสภาพอากาศ เนื่องจาก เมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมพื้นที่เป้าหมายตลอดทั้งวัน
นครสวรรค์	2	ปฏิบัติการตัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ₁₀ และ PM _{2.5}) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการปฏิบัติการฯ พบว่า บริเวณ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี กลุ่มเมฆก่อตัวและพัฒนาตัวหนาแน่นขึ้น ก่อยอดสูงประมาณ 7,000 - 8,000 ฟุต บริเวณ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี กลุ่มเมฆก่อตัวและยอดเมฆสูงประมาณ 6,000 - 6,500 ฟุต และจากการติดตามปริมาณค่าฝุ่นละออง (PM2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อนปฏิบัติการฯ มีสถานีที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 88 สถานี คิดเป็นร้อยละ 98.88 โดยหลังปฏิบัติการฯ สถานีที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพลดลงจำนวน 14 สถานี คิดเป็นร้อยละ 15.91
ระยอง	4	
หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์	3	
รวม	11	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว (เมื่อวันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2566, 14 - 18 ธันวาคม 2566 และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 - 29 มกราคม 2567)

ตั้งแต่เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2566, 14 - 18 ธันวาคม 2566 และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 - 29 มกราคม 2567 การขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 51 วัน ขึ้นปฏิบัติการ จำนวน 407 เที่ยวบิน (563:40 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 131.375 ตัน ปริมาณการใช้น้ำ 186,700 ลิตร จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท นครนายก ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม และจังหวัดสุพรรณบุรี

6. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบลราชธานี-บุรีรัมย์ พิษณุโลก และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 จำนวน 2,289 เครื่อง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ ประจำวันที่ 22 - 28 มกราคม 2567 งานขาดแคลนน้ำ จำนวน 4 เครื่อง ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

7. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 67)

7.1 วาตภัย ช่วงภัย 13 ม.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิจิตร เกษตรกร 319 ราย พืชไร่และพืชผัก 1,498 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.2 อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัย 22 - 28 ธ.ค. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 20,926 ราย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 28,980 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,000 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,246 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 18,734 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 1,178 ราย พื้นที่ 2,139 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 364 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 205 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 1,570 ไร่ คิดเป็นเงิน 7.25 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 53 ราย (คิดเป็นร้อยละ 4.50 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 109 ไร่ วงเงิน 257,386 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.55 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา เกษตรกร 602 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ (บ่อปลา) 228 ไร่ กระชัง 5,463 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 602 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 278 ไร่ กระชัง 5,463 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 3.32 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 23 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3.82 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 3 ไร่ กระชัง 698 ตร.ม. วงเงิน 272,212 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.20 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 34,641 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 574,006 ตัว แบ่งเป็น โค 53,972 ตัว กระบือ 2,217 ตัว สุกร 5,574 ตัว แพะ/แกะ 30,331 ตัว สัตว์ปีก 481,912 ตัว แปลงหญ้า 1,183 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

7.3 อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัย 1 พ.ย. 66 – 30 พ.ย. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง พัทลุง ปัตตานี นครศรีธรรมราช ยะลา ระนอง นราธิวาส สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 44,131 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 67,238 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 30,355 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 10,649 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 26,234 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 2,995 ราย พื้นที่ 14,974 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10,577 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 2,910 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 1,487 ไร่ คิดเป็นเงิน 25.95 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 231 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7.71 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 752 ไร่ วงเงิน 1.26 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.86 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 6,959 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 19,025 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 12,439 ไร่ บ่อกุ้ง 6,586 ไร่ กระชัง 20,060 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 6,959 ราย พื้นที่ (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 19,025 ไร่ กระชัง 20,060 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 143.10 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 194 ราย (คิดเป็นร้อยละ 2.79 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 200 ไร่ กระชัง 1,245 ตร.ม. วงเงิน 1.62 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 79,539 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 5,883,927 ตัว แบ่งเป็น โค 172,420 ตัว กระบือ 4,516 ตัว สุกร 107,536 ตัว แพะ/แกะ 57,321 ตัว และสัตว์ปีก 5,542,134 ตัว แปลงหญ้า 7,074 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 95 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 2,293 ตัว แบ่งเป็น โค 21 ตัว กระบือ 13 ตัว สุกร 5 ตัว แพะ/แกะ 30 ตัว และสัตว์ปีก 2,224 ตัว คิดเป็นเงิน 1.19 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 95 ราย (คิดเป็นร้อยละ 98.95 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) สัตว์ตาย 2,292 ตัว วงเงิน 1.16 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 97.07 ของวงเงินช่วยเหลือ)

7.4 อุทกภัย ช่วงภัย 10 ก.ย. – 6 พ.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 51 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตรัง สระแก้ว นครศรีธรรมราช และจังหวัดยะลา เกษตรกร 155,112 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 1,309,463 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 990,469 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 316,309 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 2,718 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,964.53 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 7,118 ราย (คิดเป็นร้อยละ 4.59 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 36,486 ไร่ วงเงิน 54.57 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 2.78 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 43 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พิจิตร พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ตรัง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ยะลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 8,424 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 10,365 ไร่ กระชัง 2,316 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 54.14 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,484 ราย (คิดเป็นร้อยละ 41.36 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 4,423 ไร่ กระชัง 347 ตร.ม. วงเงิน 22.94 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 42.38 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และจังหวัดชัยภูมิ เกษตรกร 72 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 2,357 ตัว แบ่งเป็น โค 22 ตัว กระบือ 3 ตัว สุกร 12 ตัว และสัตว์ปีก 2,320 ตัว แปลงหญ้า 35 ไร่ คิดเป็นเงิน 87.21 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

7.5 อุทกภัย ช่วงภัย 6 มิ.ย. – 29 ส.ค. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก น่าน พิชณุโลก แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ นครพนม หนองคาย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตรัง ระนอง และจังหวัดสตูล เกษตรกร 17,992 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 143,172 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 136,286 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 6,220 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 666 ไร่ คิดเป็นเงิน 197.65 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 7,998 ราย (คิดเป็นร้อยละ 44.45 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 61,965 ไร่ วงเงิน 85.20 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 43.11 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กระบี่ ระนอง และจังหวัดสตูล เกษตรกร 535 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 323 ไร่ กระชัง 881 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 1.85 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.6 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 22 พ.ค. 66 – 18 ก.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิชณุโลก อุดรดิตถ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยนาท สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 31,173 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 352,296 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 229,346 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 122,857 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 93 ไร่ คิดเป็นเงิน 550.96 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 8,622 ราย (คิดเป็นร้อยละ 27.66 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 129,752 ไร่ วงเงิน 224.10 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40.68 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.7 วาตภัย ช่วงภัย 8 พ.ค. 66 – 13 พ.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พะเยา เพชรบูรณ์ ลำปาง แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร เลย เพชรบุรี สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ชุมพร ตรัง ระนอง นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 954 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 3,764 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,113 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,854 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 797 ไร่ คิดเป็นเงิน 8.39 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 938 ราย (คิดเป็นร้อยละ 98.32 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 3,643 ไร่ วงเงิน 8.04 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 95.80 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

8. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 67)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา และพัทลุง) จำนวน 158 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 80 ไร่	- ให้ความคุมระดับน้ำในนาข้าว แบบเปียกสลับแห้ง เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยหรือตัวอ่อน เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง
	2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (น่าน พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 46 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้ใช้พันธุ์ต้านทานโดยปลูกสลับกันอย่างน้อย 2 พันธุ์ เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัวต่อต้น
	3. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (น่าน เพชรบูรณ์ อุดรดิตถ์ นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี ชัยนาท และจันทบุรี) จำนวน 3,397 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่	ให้ใช้น้ำออกจากแปลงและปฏิบัติเช่นเดียวกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล - เมื่อพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์พ่นเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก
	4. แมลงบั่ว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (อุทัยธานี) จำนวน 60 ไร่ การระบาดลดลง 1,285 ไร่	พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร - ให้กำจัดวัชพืชมก่อนหว่านข้าวเพื่อทำลายพืชอาศัย ไม่ควรปลูกข้าวโดยวิธีหว่านหรือปักดำ
	5. หนอนกอข้าว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา ร้อยเอ็ด และกรุงเทพมหานคร) จำนวน 18 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้เฝ้าต่อชั่งหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง
	6. โรคใบจุดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สงขลา และสตูล) จำนวน 61 ไร่ การระบาดลดลง 25 ไร่	- ให้ปรับปรุงดินโดยการไถกลบใช้ฟางคลุมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราใส่ปุ๋ยโปแตสเซียม-คลอไรด์ อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อพบอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาลรุนแรง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	7. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และพังงา) จำนวน 122 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- เมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัวต่อตารางเมตร และพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม
มะพร้าว	1. หนอนกินใบมะพร้าว 2. หนอนหัวดำ 3. แมลงดำหนาม 4. ดั้วงวง 5. ดั้วแรด 6. ไรสีขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 21 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สตูล สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 14,512 ไร่ <u>การระบาดลดลง 552 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,636 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 77 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ กระบี่ พังงา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,315 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,497 ไร่ <u>การระบาดลดลง 3 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สระแก้ว นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร และสงขลา) จำนวน 439 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 29 ไร่</u>	- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย และเก็บเศษซากพืชนำไปเผาออกแปลงทันที และหมั่นสำรวจสวนมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอ - หนอนหัวดำ ปล่อยแตนเบียนบราคอน อัตราไร่ละ 200 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ปล่อยแตนเบียนไข่หริโศกรแกรมมา อัตราไร่ละ 10 แผ่น ๆ ละ 2,000 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน และใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซเอท โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน - แนะนำตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและแมลงดำหนามกัดกินไปเผาทำลาย ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส 3-5 ครั้ง เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว ปล่อยแตนเบียนเตตระสติกัส (โดยปล่อยทุก 7 วัน ต่อเนื่อง 1 เดือน ควบคุมตั้งแต่แมลงดำหนามมะพร้าว - ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงและด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักด้ - ตัดทะลายและช่อดอกมะพร้าวที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย นำออกไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง การป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็ก ห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง โดยให้สลับกลุ่มสารตามกลไกการออกฤทธิ์ในการพ่นทุก 2 ครั้ง
ปาล์ม น้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. ดั้วกู่ลาบ	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,561 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 32 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 788 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 12 ไร่</u>	- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักด้ และระยะตัวหนอน - หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน อัตรา 40 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. หนอนปลอกเล็ก 4. โรคลำต้นเน่า 5. โรคทะลายเน่า 6. โรคใบจุด 7. โรคใบจุดสาหร่าย 8. ก้านทางใบเน่า	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,028 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 18 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 11,561 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 102 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ยะลา นราธิวาส และนครศรีธรรมราช) จำนวน 74 ไร่ การระบาดลดลง 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,075 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กระบี่ นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 467 ไร่ การระบาดคงที่	- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฟ่อ และทะลายที่พบเป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง ให้ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน - โรคใบจุดสาหร่าย เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายในช่วงฤดูฝน สำรวจสัปดาห์ละครั้ง - ก้านทางใบเน่า แนะนำเกษตรกรให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอัตราส่วนตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ยางพารา	1. โรคกลากขาว 2. โรคราแป้ง 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,593 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครศรีธรรมราช) จำนวน 100 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ตรัง ปัตตานี นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,130 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 34 ไร่ พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (น่าน ชุมพร ตรัง นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา หนองสงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,696,934 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคกลากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ
กาแฟ	1. โรคราสนิม 2. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง) จำนวน 580 ไร่ การระบาดลดลง 51 ไร่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและปั่นตอเก่าสับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลายนอกแปลง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา จันทบุรี สระแก้ว ยะลา และสตูล) จำนวน 248 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคราขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครราชสีมา) จำนวน 25 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา) จำนวน 11 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ปล่อยแมลงทางหิมับอัตรา 500 ตัวต่อไร่ - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 2. โรคเน่ามันสำปะหลัง 3. โรคพุ่มแจ้ 4. โรคโคนเน่าหัวเน่า 5. โรคราแป้ง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร อุบลราชธานี ชัยนาท จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 144 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สุรินทร์ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 785 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 94 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 168 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (แพร่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และชลบุรี) จำนวน 87 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 70 ไร่ <u>พื้นที่ระบาด 32 จังหวัด (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์หนองคาย อุบลราชธานี ชัยนาท สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 210,553 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1,441 ไร่</u>	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคราแป้งด้วย 3 วิธี ดังนี้ วิธีฝังกลบ วิธีใส่ถุง/กระสอบ และวิธีบดสับ - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคราแป้งทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการ ขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมี การระบาด และกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - ควรกรีดแปลงปลูกเพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ ท่อนพันธุ์ด้วยยาฆ่าเชื้อรา หรือฟอสฟิออร์-อะลูมิเนียม เมื่อพบ ต้นที่แสดงอาการของโรค ถอนนำไปทำลายนอกแปลงแล้วโรย ปูนขาว หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคราใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และชุมพร) จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 131 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 23 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และจันทบุรี) จำนวน 4 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบ โคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคราใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่ง ทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ให้สังเกตดูใบอ่อน และใบแก่ - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้ง ที่ร่วงหล่น นำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 759 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 74 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 639 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 98 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และยะลา) จำนวน 284 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่	- หากพบเพลี้ยไฟ ไรแดงแอฟริกาจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยไก่แจ้ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับ ต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้งหากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง - โรคราแป้งโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคราแป้งหรือใบไหม้ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วน ที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่นนำไป ทำลายนอกแปลง ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืช

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. ไรแดง 5. โรครากเน่าโคนเน่า 6. โรคใบติดหรือใบไหม้ 7. โรคใบจุดสำหรับ 8. เพลี้ยหอยเกล็ด 9. เพลี้ยจักจั่นฝอย 10. โรคราดำ 11. โรคราสีชมพู	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 599 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,565 ไร่ การระบาดลดลง 171 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ภูเก็ต สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 373 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 543 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 289 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 356 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ยะลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 149 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 142 ไร่ การระบาดลดลง 24 ไร่	- เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสำหรับให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคยังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช - หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวต์ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่ว - เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ - เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ คาร์โบซัลแฟน 20% อัตรา 50 มิลลิลิตร โซเปอร์เมทริน/ โฟซาโลน 6.25% / 22.5% อัตรา 40 มิลลิลิตร อิมิดาโคลพริด 10% อัตรา 10 มิลลิลิตร - ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง กำจัดวัชพืชในแปลง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกลดความชื้นสะสม เมื่อพบคราบราสีดำนด้วยน้ำเปล่า - กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อเป็นการลดความชื้นสะสม หากพบอาการของโรคที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง หรือเอนแปลงบริเวณที่เป็นโรคออก และใช้สารคอปเปอร์-ออกซีคลอไรด์ ผสมน้ำทาบริเวณแผลที่ตัด
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ 4. โรคใบจุด 5. โรคแอนแทรคโนส 6. โรคใบจุดสำหรับ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง และชุมพร) จำนวน 211 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 287 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 116 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 56 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 80 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง และนราธิวาส) จำนวน 241 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	- ให้หมั่นทำความสะอาดแปลงปลูกและทำลายส่วนที่เป็นโรค เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรค ให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดของโรคให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน - กำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งสะสมโรค พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน ได้แก่ คอปเปอร์ออกซี-คลอไรด์ 85%

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. โรคราดำ 3. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 82 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (พะเยา และจันทบุรี) จำนวน 332 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ อุบลราชธานี จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 18 ไร่ การระบาดคงที่	- หมั่นสำรวจแปลงหากพบกิ่งที่เป็นโรคให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง ป้องกันแมลงพาหะจำพวกปากดูดพวกเพลี้ยจักจั่นน้ำตาล โดยใช้สารเคมี ได้แก่ คาร์โบซัลเฟน อัตรา 50 มิลลิลิตร หรือไอโซโพร-คาร์บอน อัตรา 40 กรัม

9. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

9.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ม.ค. 67)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 14 มกราคม 2567 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 9 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 79 จุด ในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร นครราชสีมา เลย กาฬสินธุ์ อุดรดิตถ์ สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้

9.2 โรคล้มปัสกีน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 67)

พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 5 มกราคม 2567 รวม 70 จังหวัด 899 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 657,682 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ตายสะสม 75,565 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 207,465 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 38,467 ราย 3) พันยากำจัดแมลง 228,002 ราย 4) พันยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 175,180 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 138,631 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 444,383 ราย