



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 8 มกราคม 2567 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ


1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เริ่มอ่อนกำลังลง ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นในตอนเช้าในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง และมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 7 ธ.ค. 67 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 8 ม.ค. 67



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.สະเดา	สงขลา	30.5	ฝนตกปานกลาง
2	อ.หาดใหญ่	สงขลา	12.8	ฝนตกปานกลาง
3	อ.เมือง	พัทลุง	12.7	ฝนตกปานกลาง
4	อ.เมือง	นครศรีธรรมราช	12.0	ฝนตกปานกลาง
5	อ.เมือง	ตรัง	10.2	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค. 67)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 58,063 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 34,122 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (60,784 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 2,721 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 49.46 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 134.47 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 18,300 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 53,818 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 30,281 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (56,100 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 2,281 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 38.61 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 115.40 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,134 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	17,033	69	10,288	57	80	1,083	908	84	818	82	88	25,908	17,941	69	11,105	58	7,994
ตอน.	12	8,368	6,596	79	4,945	74	226	2,061	1,680	82	1,513	80	238	10,429	8,276	79	6,458	75	2,153
กลาง	3	1,419	923	65	863	64	27	419	285	68	261	66	30	1,838	1,208	66	1,124	64	629
ตะวันตก	2	26,605	22,051	83	8,774	66	8	164	105	64	94	61	10	26,769	22,156	83	8,868	66	4,612
ตะวันออก	6	1,515	1,019	67	924	65	52	1,006	741	74	684	72	58	2,520	1,760	70	1,607	68	761
ใต้	4	8,194	6,197	76	4,486	69	42	679	526	77	472	75	46	8,874	6,723	76	4,958	70	2,151
รวม	35	70,926	53,818	76	30,281	64	435	5,411	4,245	78	3,841	77	470	76,337	58,063	76	34,122	65	18,300

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 16,937 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 10,241 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 10.70 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 53.06 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 7,934 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	9,751	72	5,951	62	7.44	0.00	30.00	30.00	3,711
สิริกิตี	5,608	59	2,758	42	2.66	2.72	13.99	14.06	3,902
ภูมิพล+สิริกิตี	15,359	67	8,709	53	10.10	2.72	43.99	44.06	7,613
แควน้อยฯ	820	87	777	87	0.60	0.18	3.46	3.46	119
ป่าสักชลสิทธิ์	757	79	754	79	0.00	0.00	5.62	5.62	203
รวมทั้งหมด	16,937	68	10,241	56	10.70	2.90	53.06	53.13	7,934

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปของความจุอ่างฯ จำนวน 13 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ แม่น้ำยมบูน (107%) อ่างฯ กิ่วลม (87%) อ่างฯ กิ่วคองมา (104%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (87%) อ่างฯ แม่มอก (81%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (81%) อ่างฯ ลำปาว (87%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (82%) อ่างฯ วชิราลงกรณ์ (84%) อ่างฯ หนองปลาไหล (94%) อ่างฯ ประแสร์ (81%) อ่างฯ นฤปดินทรจินดา (83%) และ อ่างฯ บางหลวง (84%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ กระเสียว (21%) อ่างฯ คลองสิียด (26%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำมูล แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำโคกลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 288 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 298 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.49 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.21 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 65 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.56 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.58 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.35 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.28 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 92 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 92 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 72 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 13 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 7 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 5 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 45 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 44 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลย์) 15 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 20 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 126 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 123 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 12 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 4 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 50 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 50 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 10 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 227 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 299 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		2 ม.ค. 67	3 ม.ค. 67	4 ม.ค. 67	5 ม.ค. 67	6 ม.ค. 67	7 ม.ค. 67	8 ม.ค. 67		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแด้ จ.ปทุมธานี	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มน้ำ จ.นนทบุรี	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.31	0.91	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.22	0.24	0.24	0.26	0.28	0.53	2.47	สูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 8 ม.ค. 67	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.66	-11.14
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	3.93	-12.07
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.22	-10.98
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.48	-10.52
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.92	-10.58
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.39	-12.11

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (วันที่ 1 พ.ย.66 ถึง 30 เม.ย.67) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 36,941 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ จำนวน 21,810 ล้าน ลบ.ม. สำหรับในเขตลุ่มเจ้าพระยา ได้วางแผนจัดสรรน้ำ จำนวน 6,100 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 7,904 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 37 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แคว้นน้อยฯ ป่าสักฯ) วันนี้ใช้น้ำไป 53.06 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 2,386 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	3,060	7,195	10,955	600	21,810	7,904	37
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	2,500	2,315	135	6,100	2,386	40



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

ทั้งประเทศ จำนวน 10.66 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.13 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.53 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 4.90 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.20 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.70 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2567)

ทั้งประเทศ จำนวน 7.26 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 6.45 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.81 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.11 ของแผน

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 4.97 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.80 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.17 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.43 ของแผน

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2566/67			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2566/67					
		ข้าวนอกเขต 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวนอกเขต 2	%ข้าวนอกเขต 2	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวมทั้งหมด	%รวมทั้งหมด
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	5.80	0.57	6.37	5.58	87.60	0.36	63.16	5.94	93.25
	นอกเขตชลประทาน	2.33	1.96	4.29	0.87	20.28	0.45	22.96	1.32	30.77
	รวม	8.13	2.53	10.66	6.45	60.51	0.81	32.02	7.26	68.11
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	3.03	0.13	3.16	4.09	129.43	0.08	61.54	4.17	131.96
	นอกเขตชลประทาน	1.17	0.57	1.74	0.71	40.80	0.09	15.79	0.80	45.98
	รวม	4.20	0.70	4.90	4.80	97.96	0.17	24.29	4.97	101.43

5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2566 และตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดนครสวรรค์ ระยอง และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพื้นที่ที่ยังมีความต้องการน้ำ และปฏิบัติการด้านหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM₁₀ และ PM_{2.5}) และไฟฟ้า

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 24 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ไม่มีการขอรับบริการ
กลาง	ไม่มีการขอรับบริการ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีการขอรับบริการ
ภาคตะวันออก	ไม่มีการขอรับบริการ
ภาคใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	0 จังหวัด (0 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ประจำวันที่ 7 มกราคม 2567

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
ระยอง	2	ปฏิบัติการตัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ₁₀ และ PM _{2.5}) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการปฏิบัติการฯ พบว่า จากการติดตามปริมาณค่าฝุ่นละออง (PM _{2.5}) ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อนปฏิบัติการฯ มีสถานีที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 48 สถานี คิดเป็นร้อยละ 53.93 โดยหลังปฏิบัติการฯ สถานีที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีจำนวนเพิ่มขึ้น 9 สถานี คิดเป็นร้อยละ 18.75 ส่วนมากบริเวณตอนกลางของกรุงเทพฯ
หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์	4	ปฏิบัติการตัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ₁₀ และ PM _{2.5}) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการปฏิบัติการฯ พบว่า จากการติดตามปริมาณค่าฝุ่นละออง (PM _{2.5}) ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อนปฏิบัติการฯ มีสถานีที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 48 สถานี คิดเป็นร้อยละ 53.93 โดยหลังปฏิบัติการฯ สถานีที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีจำนวนเพิ่มขึ้น 9 สถานี คิดเป็นร้อยละ 18.75 ส่วนมากบริเวณตอนกลางของกรุงเทพฯ
รวม	6	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว (เมื่อวันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2566, 14 - 18 ธันวาคม 2566 และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567)

ตั้งแต่เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2566, 14 - 18 ธันวาคม 2566 และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 การขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 29 วัน ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 216 เที่ยวบิน (281:40 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใส่สารฝนหลวง 83.375 ตัน ปริมาณการใช้น้ำ 57,300 ลิตร จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี นครนายก ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง

6. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- **เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่** เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบล-บุรี-โคก พิษไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 จำนวน 2,289 เครื่อง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ ประจำวันที่ 26 - 31 ธันวาคม 2566 ไม่มีการช่วยเหลือ

- **เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ** รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

7. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค. 67)

7.1 อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัย 22 - 28 ธ.ค. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา 22,358 ราย พื้นที่ 29,200 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,231 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,294 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 18,675 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 1 ไร่ (ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ) คิดเป็นเงิน 4,180 บาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา เกษตรกร 1,599 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 635 ไร่ กระชัง 6,457 ตร.ม. **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 34,641 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 574,006 ตัว แบ่งเป็น โค 53,972 ตัว กระบือ 2,217 ตัว สุกร 5,574 ตัว แพะ/แกะ 30,331 ตัว สัตว์ปีก 481,912 ตัว แผลงหญ้า 1,183 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

7.2 อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัย 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง พัทลุง ปัตตานี นครศรีธรรมราช ยะลา ระนอง นราธิวาส สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 44,010 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 66,995 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 30,228 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 10,588 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 26,179 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 2,735 ราย พื้นที่ 13,848 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 9,257 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,056 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 1,535 ไร่ คิดเป็นเงิน 24.67 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 67 ราย (คิดเป็นร้อยละ 2.45 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 232 ไร่ วงเงิน 425,265 บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.72 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 6,985 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 18,931 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 12,499 ไร่ บ่อกุ้ง 6,432 ไร่ กระชัง 25,455 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 6,891 ราย พื้นที่ (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 18,604 ไร่ กระชัง 21,370 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 142.05 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 68 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.99 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 54 ไร่ กระชัง 257 ตร.ม. วงเงิน 0.44 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง ยะลา สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 69,443 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 5,625,567 ตัว แบ่งเป็น โค 159,094 ตัว กระบือ 3,930 ตัว สุกร 107,039 ตัว แพะ/แกะ 39,438 ตัว และสัตว์ปีก 5,316,066 ตัว แผลงหญ้า 6,777 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

7.3 อุทกภัย ช่วงภัย 10 ก.ย. – 6 พ.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 51 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตรวต สระแก้ว นครศรีธรรมราช และจังหวัดยะลา เกษตรกร 154,456 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 1,302,114 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 983,304 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 316,095 ไร่ ไม้ผลไม้อื่นๆ 2,715 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,954.49 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 6,285 ราย (คิดเป็นร้อยละ 4.07 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 31,343 ไร่ วงเงิน 47.29 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 2.42 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 41 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พิจิตร พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ตรวต ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ยะลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 8,419 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 10,352 ไร่ กระชัง 2,316 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 53.80 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,452 ราย (คิดเป็นร้อยละ 41.00 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 4,385 ไร่ กระชัง 347 ตร.ม. วงเงิน 23.10 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 42.93 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และจังหวัดชัยภูมิ เกษตรกร 54 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 1,303 ตัว แบ่งเป็น โค 22 ตัว กระบือ 3 ตัว สุกร 7 ตัว และสัตว์ปีก 1,271 ตัว แปลงหญ้า 35 ไร่ คิดเป็นเงิน 0.80 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

7.4 อุทกภัย ช่วงภัย 6 มิ.ย. – 29 ส.ค. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก น่าน พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ นครพนม หนองคาย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตรัง ระนอง และจังหวัดสตูล เกษตรกร 17,992 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 143,172 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 136,286 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 6,220 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 666 ไร่ คิดเป็นเงิน 197.65 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 7,998 ราย (คิดเป็นร้อยละ 44.45 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 61,965 ไร่ วงเงิน 85.20 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 43.11 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กระบี่ ระนอง และจังหวัดสตูล เกษตรกร 535 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 323 ไร่ กระชัง 881 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 1.85 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.5 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 22 พ.ค. 66 – 18 ก.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยนาท สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 27,112 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 308,101 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 190,286 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 117,724 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 91 ไร่ คิดเป็นเงิน 488.46 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 8,622 ราย (คิดเป็นร้อยละ 31.80 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 129,752 ไร่ วงเงิน 224.10 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 45.88 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.6 วาตภัย ช่วงภัย 8 พ.ค. 66 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พะเยา เพชรบูรณ์ ลำปาง แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร เลย เพชรบุรี สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ชุมพร ตรัง ระนอง นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 953 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 3,763 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,113 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,854 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 796 ไร่ คิดเป็นเงิน 8.38 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 835 ราย (คิดเป็นร้อยละ 87.42 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 3,423 ไร่ วงเงิน 7.15 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 85.23 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

8. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 66)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 3. โรคไหม้ข้าว 4. แมลงบัว 5. หนอนกอข้าว 6. ใบจุดสีน้ำตาล 7. หนอนห่อใบข้าว 8. โรคขอบใบแห้งข้าว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (พะเยา กรุงเทพมหานคร และสุรินทร์) จำนวน 114 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 30 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (น่าน สุราษฎร์ธานี และพังงา) จำนวน 46 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (น่าน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี ชัยนาท และจันทบุรี) จำนวน 3,479 ไร่ การระบาดลดลง 1,500 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กำแพงเพชร) จำนวน 1,285 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และกรุงเทพมหานคร) จำนวน 54 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และสตูล) จำนวน 44 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (แพร่ นครราชสีมา และพังงา) จำนวน 125 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครราชสีมา) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่	- เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ให้ควบคุมระดับน้ำในนาข้าว แบบเปียกสลับแห้ง เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยหรือตัวอ่อน เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง - เพลี้ยกระโดดหลังขาว ให้ใช้พันธุ์ต้านทานโดยปลูกสลับกันอย่างน้อย 2 พันธุ์ เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัวต่อต้น ให้ใช้น้ำออกจากแปลงนาและปฏิบัติเช่นเดียวกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล - โรคไหม้ข้าว เมื่อพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์พ่นเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก - หนอนกอข้าว เมื่อพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์พ่นเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก - แมลงบัว ให้กำจัดวัชพืชรากก่อนหว่านข้าวเพื่อทำลายพืชอาศัยไม่ควรปลูกข้าวโดยวิธีหว่านหรือปักดำถี่ - หนอนกอข้าว ให้เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง - โรคใบจุดสีน้ำตาล แนะนำให้ปรับปรุงดินโดยการไถกลบใช้ฟางคลุมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อพบอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาลรุนแรง - หนอนห่อใบข้าว หมั่นสำรวจแปลงนาและกำจัดพืชอาศัยเมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัวต่อตารางเมตรและพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ - โรคขอบใบแห้งข้าว ไม่ระบายน้ำจากแปลงที่เป็นโรคไปแปลงอื่น หากพบอาการของโรครุนแรงให้พ่นสารชีวภัณฑ์
มะพร้าว	1. หนอนกินใบมะพร้าว 2. หนอนหัวดำ 3. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 21 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราดสมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา สตูล ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 14,812 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 187 ไร่ พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,585 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 42 ไร่	- หนอนกินใบมะพร้าว ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย และเก็บเศษซากพืชนำไปเผาออกแปลงทันที และหมั่นสำรวจสวนมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอ - หนอนหัวดำ ปลอຍແຕนเป็นบราคอน อัตราไล่ละ 200 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ปลอຍແຕนเป็น-ไซทริโครแกรมมา อัตราไล่ละ 10 แผ่น ๆ ละ 2,000 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน และใช้สารเคมีอิมามิกตินเบนโซเอท โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน - แมลงดำหนาม แนะนำตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามกัดกิน ไปเผาทำลาย ปลอຍແຕนเป็นอะซีโคเดส 3-5 ครั้ง เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว ปลอຍແຕนเป็นเตตระสตีดัส (โดยปล่อยทุก 7 วัน ต่อเนื่อง 1 เดือน ควบคุมดักแด้แมลงดำหนามมะพร้าว - ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงและด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. ดั้วงวง	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,317 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	- โรสี้ขามะพร้าว ตัดทำลายและช่อดอกมะพร้าวที่โรสี้ขามะพร้าวเข้าทำลาย นำออกไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง การป้องกันกำจัดให้น้ำมันพ่นสารฆ่าไรในระยมะพร้าวติดจัน จนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสี้ขามะพร้าวเข้าทำลาย ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของ กรมวิชาการเกษตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง โดยให้สลับกลุ่มสาร ตามกลไกการออกฤทธิ์ในการพ่นทุก 2 ครั้ง
	5. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,478 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 17 ไร่	
	6. โรสี้ขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สระแก้ว นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร และสงขลา) จำนวน 403 ไร่ การระบาดคงที่	
ปาล์ม น้ำมัน	1. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,534 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่	- ดั้วแรด ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับดั้วแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตตาโรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ดั้วกู่หลาบ หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร - หนอนปลอกเล็ก พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน - โรคลำต้นเน่า ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - โรคทะลายเน่า ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบเป็นโรค นำออกไปเผาทำลายนอกแปลง และกำจัดวัชพืช - โรคใบจุด แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลง ตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที เมื่อพบ การระบาดของโรคใบจุด ให้ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน - โรคใบจุดสาหร่าย เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของ โรคใบจุดสาหร่ายในช่วงฤดูฝน สำรวจสัปดาห์ละครั้งตัด ทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง - ก้านทางใบเน่า แนะนำแก่เกษตรกร ให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตราส่วนตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
	2. ดั้วกู่หลาบ	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 792 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่	
	3. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,850 ไร่ การระบาดลดลง 27 ไร่	
	4. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 11,543 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่	
	5. โรคทะลายเน่า	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 104 ไร่ การระบาดคงที่	
	6. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา นราธิวาส และนครศรีธรรมราช) จำนวน 89 ไร่ การระบาดคงที่	
	7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,192 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่	
	8. ก้านทางใบเน่า	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กระบี่ นราธิวาส สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 469 ไร่ การระบาดคงที่	
ยางพารา	1. โรครากขาว	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,597 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่	- คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค
	2. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครศรีธรรมราช) จำนวน 100 ไร่ การระบาดคงที่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ตรัง ปัตตานี นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,117 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (น่าน ชุมพร ตรัง นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 451,945 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมงค์ให้เกษตรกรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ
กาแฟ	1. โรคราสนิม 2. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง - หนอนกาแฟสีแดง ควรหมั่นทำความสะอาดแปลงและ ตรวจดูตามกิ่งและลำต้นกาแฟอยู่เสมอ หากพบการเข้าทำลายของหนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟสีแดง ให้ตัดกิ่ง และลำต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลง
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (เชียงใหม่ นครราชสีมา จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี ยะลา และสตูล) จำนวน 327 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 146 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง) จำนวน 568 ไร่ การระบาดคงที่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและปักตอเก่าสับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้น สับปะรดทำลายนอกแปลง เพื่อกำจัดไวรัสและแมลงพาหะ ก่อนปลูกต้องมีการไถและพรวนดินหลายๆ ครั้ง ควรตากดิน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมแช่หน่อพันธุ์เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครราชสีมา) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา) จำนวน 11 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ใช้ช่วงที่พบกลุ่มไข่ของ หนอนกออ้อย ปล่อยแมลงหางหนี้อัตรา 500 ตัวต่อไร่ - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว แช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู 3. เพลี้ยหอย 4. ไรแดงมันสำปะหลัง 5. โรคพุ่มแจ้ 6. โรคโคนเน่าหัวเน่า	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร อุบลราชธานี จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 77 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา และอุบลราชธานี) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี และชลบุรี) จำนวน 31 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 95 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ลำปาง ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และชลบุรี) จำนวน 743 ไร่ การระบาดคงที่	- เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่างด้วย 3 วิธี ดังนี้ วิธีฝังกลบ วิธีใส่ถุง/กระสอบ และวิธีบดสับ - การควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ปล่อยให้กระจายตัวแปลง ให้เจริญเติบโต - เพลี้ยหอย ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากเพลี้ยหอย ให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลง - ไรแดง ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน หากเริ่มพบการเข้าทำลายของไรแดงควรเก็บทิ้งหรือทำลาย - โรคพุ่มแจ้ ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด และกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - โรคโคนเน่าหัวเน่า ควรกรองแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสฟิไทล-อะลูมิเนียม เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรค ถอนนำไปทำลายนอกแปลงแล้วโรยปูนขาว หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บเศษเหง้า และเศษซากมันสำปะหลัง ไปทำลายนอกแปลงปลูก

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	7. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 33 จังหวัด (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย ชลบุรี อุบลราชธานี ชัยนาท สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง สอนแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 206,738 ไร่ การระบาดลดลง 3,704 ไร่	- โรคใบด่างมันสำปะหลัง ไม่ใช่ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบ การระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชุมพร และภูเก็ต) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 176 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 48 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และจันทบุรี) จำนวน 4 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ให้สังเกตดูใบอ่อน และใบแก่ - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง 4. ไรแดงแอฟริกา 5. โรครากเน่าโคนเน่า 6. โรคใบติดหรือใบไหม้ 7. โรคใบจุดสาหร่าย 8. เพลี้ยหอยเกล็ด 9. เพลี้ยจักจั่นฝอย	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 255 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 41 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 531 ไร่ การระบาดลดลง 138 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 255 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 399 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นราธิวาส ยะลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,729 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ภูเก็ต สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 697 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 590 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 310 ไร่ การระบาดลดลง 67 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ยะลา กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 393 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยไก่แจ้ ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง หากบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่น - ไรแดงแอฟริกา กำจัดวัชพืชในสวน เมื่อพบระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง - โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคใบติดหรือใบไหม้ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่นนำไปทำลายนอกแปลง ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืช - โรคใบจุดสาหร่าย กำจัดวัชพืชในแปลง เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรค ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคยังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วต้น - หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียนเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกทำลายเผาทิ้ง พบในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวด์ออกไซด์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่ว ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียน - หมั่นสำรวจแปลงปลูกทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงได้แก่ คาร์โบซัลแฟน 20% อัตรา 50 มิลลิลิตร ไซเพอร์เมทริน/โพชาโลน 6.25% / 22.5% อัตรา 40 มิลลิลิตร อิมิดาโคลพริด 10% อัตรา 10 มิลลิลิตร - ป้องกันวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง ผสมน้ำ 20 ลิตรพ่นห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์ เริ่มเมื่อผลอายุ 6 สัปดาห์ - กำจัดวัชพืชในแปลง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกลดความชื้นสะสม เมื่อพบการระบาดของโรคพ่นด้วยน้ำเปล่า และสารเหนียวเพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	10. หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 11. โรคราดำ 12. โรคราสีชมพู 13. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 1 ไร่ (ตราด) จำนวน 5 ไร่ การระบาดลดลง 41 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ยะลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 149 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 178 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตราด) จำนวน 6 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อเป็นการลดความชื้นสะสม หากพบอาการของโรคที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลงหรือเผาเลือกบริเวณที่เป็นโรครอก และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกซี-คลอไรด์ ผสมน้ำทาบริเวณแผลที่ตัด - หมั่นตรวจดูตามผลทุเรียน เมื่อพบรอยทำลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงให้ทำลายโดยเผาไฟหรือฝัง และห่อผลด้วยถุง
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนซอนใบ 4. โรคนิ่ว 5. โรคแอนแทรกคโนส 6. โรคนิ่วสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง และชุมพร) จำนวน 200 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 21 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 252 ไร่ การระบาดลดลง 39 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 108 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 151 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 80 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง และนราธิวาส) จำนวน 240 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงและไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน - หมั่นสำรวจและสังเกตการณ์เข้าทำลายของหนอนซอนใบ - โรคนิ่ว ควรหมั่นสำรวจทำความสะอาดแปลงปลูก และกำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งสะสมโรค พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน ได้แก่ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% - โรคแอนแทรกคโนส ให้หมั่นทำความสะอาดแปลงปลูกและทำลายส่วนที่เป็นโรค พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช - โรคนิ่วสาหร่าย กำจัดวัชพืชในแปลง เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรค ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคยังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วต้น
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. โรคราดำ 3. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 70 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (พะเยา และจันทบุรี) จำนวน 523 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ อุบลราชธานี จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 21 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่	- โรคพุ่มไม้กวาด หมั่นสำรวจแปลงหากพบกิ่งที่เป็นโรคให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง ป้องกันแมลงพาหะจำพวกปากดูดพวกเพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาล โดยใช้สารเคมี ได้แก่ คาร์โบซัลเฟน อัตรา 50 มิลลิลิตร หรือไอโซโพรคาร์บอน อัตรา 40 กรัม - โรคราดำ ให้ป้องกันและกำจัดแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยเพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยอ่อน เป็นต้น - เพลี้ยแป้ง ให้หมั่นสำรวจแปลงลำไยทุกสัปดาห์หากพบการระบาดแนะนำให้ตัดส่วนของกิ่งก้านที่มีเพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ไปทำลาย

9. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

9.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 66)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 14 ธันวาคม 2566 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 9 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 57 จุด ในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ปราชินบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ เลย สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ อุดรดิตถ์ สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัด สงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้

9.2 โรคล้มปัสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 67)

พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 5 มกราคม 2567 รวม 70 จังหวัด 899 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 657,682 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ตายสะสม 75,565 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์ การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทาง การนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจรอยโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 207,465 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 38,467 ราย 3) พันยากำจัดแมลง 228,002 ราย 4) พันยาฆ่าเชื้อ ทำลายเชื้อโรค 175,180 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 138,631 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 444,383 ราย