




รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 28 สิงหาคม 2568 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.




แผนที่อากาศผิวพื้น 28 สิงหาคม 2568 เวลา 07:00 น.

ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และน่าน ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไป

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 27 ส.ค. 68 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 28 ส.ค. 68



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	เชียงราย	98.1	ฝนตกหนักมาก
2	อ.แม่สวด	ตาก	56.4	ฝนตกหนัก
3	อ.เมือง	นครศรีธรรมราช	48.2	ฝนตกหนัก
	อ.เมือง	ยะลา	47.9	ฝนตกหนัก
5	อ.เมือง	ยโสธร	47.6	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์อุทกภัย น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

จากพายุไต้ฝุ่น “คาจิกิ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน เคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาว และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ช่วงวันที่ 24 – 28 ส.ค. 68 ประสบอุทกภัย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ เลย ชัยภูมิ และจังหวัดมุกดาหาร ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดอุตรดิตถ์

3. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 68)

3.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 51,859 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 27,912 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (46,809 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61) มากกว่าปี 2567 จำนวน 5,050 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 510.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 143.44 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 24,647 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 48,744 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 25,205 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (43,869 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62) มากกว่า ปี 2567 จำนวน 4,874 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 435.74 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 98.44 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 22,183 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	18,213	73	11,468	63	87	1,145	781	68	688	65	95	25,970	18,994	73	12,156	64	6,976
ตอน.	12	8,368	3,667	44	2,015	30	230	2,122	1,205	57	1,038	53	242	10,490	4,873	46	3,053	35	5,618
กลาง	3	1,419	433	30	373	27	27	419	176	42	150	38	30	1,838	609	33	523	30	1,229
ตะวันตก	2	26,605	20,546	77	7,269	55	8	164	62	38	51	33	10	26,769	20,608	77	7,320	54	6,160
ตะวันออก	6	1,515	757	50	663	47	52	1,009	567	56	511	54	58	2,524	1,324	52	1,173	49	1,201
ใต้	4	8,194	5,128	63	3,417	53	44	721	325	45	269	40	48	8,916	5,452	61	3,687	52	3,463
รวม	35	70,926	48,744	69	25,205	53	448	5,579	3,115	56	2,707	52	483	76,506	51,859	68	27,912	53	24,647

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 17,934 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 11,238 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62) ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 192.08 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 28.57 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 6,937 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับ ได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	9,288	69	5,488	57	70.67	62.99	12.00	12.00	4,174
สิริกิตี	7,906	83	5,056	76	95.02	79.73	13.97	31.93	1,604
ภูมิพล+สิริกิตี	17,195	75	10,545	65	165.69	142.72	25.97	43.93	5,777
แควน้อยฯ	443	47	400	45	13.26	14.16	1.30	1.30	496
ป่าสักชลสิทธิ์	297	31	294	31	13.13	10.84	1.30	1.30	663
รวมทั้งหมด	17,934	72	11,238	62	192.08	167.72	28.57	46.53	6,937

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 5 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ อุบลรัตน์ (28%) อ่างฯ ลำตะคอง (23%) อ่างฯ สำนางรอง (24%) อ่างฯ ทับสลา (17%) และอ่างฯ คลองสีายัด (17%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ คือ อ่างฯ สิริกิตี (83%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำพระสทิธิ แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำวัง แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำยม ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วม

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,578 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,598 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +21.67 ม.รทก.

ต่ำกว่าตลิ่ง 4.03 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,300 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,300 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.47 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.55 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +12.38 ม.รทก. (เมื่อวาน +12.38 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 141 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 141 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 120 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 20 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 1 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 36 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 32 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 79 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 82 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 25 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 24 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 175 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 178 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 20 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 10 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 55 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 46 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 44 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำเจ้าพระยา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สถานี C.29B ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,104 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,185 ลบ.ม./วินาที)

3.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		22 ส.ค. 68	23 ส.ค. 68	24 ส.ค. 68	25 ส.ค. 68	26 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	28 ส.ค. 68		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร - เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

3.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 27 ส.ค. 68	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	5.03	-7.77
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	11.37	-4.63
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	8.84	-3.36
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	8.68	-3.32
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	8.68	-3.82
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	9.70	-4.80

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

4. การเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

กรมชลประทาน เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ในช่วงฤดูฝน ปี 2568 ประจำปีสัปดาห์ (วันที่ 18 - 24 ส.ค. 68) การช่วยเหลือทั้งหมด รวม 522 หน่วย ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ 358 เครื่อง (ปริมาณน้ำที่สูบ 114,831,631 ลิตร) รถบรรทุกน้ำ 1 คัน (ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร) เครื่องผลักดันน้ำ 140 เครื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ 23 หน่วย

5. ผลกระทบด้านการเกษตร

5.1 อุทกภัย ช่วงภัย 23 ก.พ. 68 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 34 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุทัยธานี อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย อ่างทอง อุดรราชธานี สุพรรณบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 88,758 ราย

พื้นที่ได้รับผลกระทบ 589,181 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 520,206 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 54,349 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 14,626 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 18,643 ราย พื้นที่ 140,127 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 121,368 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 17,999 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 760 ไร่ คิดเป็นเงิน 201,348,576 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 516 ราย พื้นที่ 3,528 ไร่ วงเงิน 5,348,899 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 68)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย อุบลราชธานี ภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 5,039 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 3,308 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 2,907 ไร่ บ่อกุ้ง 401 ไร่ กระชัง 745 ตม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,457 ราย พื้นที่รวม 781 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 744 ไร่ บ่อกุ้ง 37 ไร่ กระชัง 57 ตม. คิดเป็นเงิน 3,928,811 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 405 ราย พื้นที่ 263 ไร่ กระชัง 57 ตม. วงเงิน 1,502,654 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 68)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองคาย และจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 102,692 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 3,884,093 ตัว แบ่งเป็น โค 184,066 ตัว กระบือ 53,570 ตัว สุกร 137,083 ตัว แพะ/แกะ 4,633 ตัว และสัตว์ปีก 3,504,741 ตัว แปลงหญ้า 13,370 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย** (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 68)

5.2 วาตภัย ช่วงภัย 16 ก.พ. 68 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก แพร่ นครสวรรค์ พะเยา เพชรบูรณ์ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ปทุมธานี สระบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 6,766 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 10,944 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 818 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 4,118 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 6,009 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,002 ราย พื้นที่ 1,836 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 106 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 760 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 971 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,494,130 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 792 ราย พื้นที่ 1,629 ไร่ วงเงิน 4,671,404 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 68)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย เกษตรกร 1 ราย กระชัง 50 ตม. คิดเป็นเงิน 18,400 บาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 โดยมีแผนการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 22 หน่วย ได้แก่ หน่วยฯ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ระยอง ลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา และหน่วยฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2568

- **ภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง** มีเป้าหมายช่วยเหลือบริเวณพื้นที่การเกษตร จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ราชบุรี เพชรบุรี พัทลุง นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่เกษตร จังหวัดลพบุรี (ชัยบาดาล ลำสนธิ พัฒนานิคม ท่าหลวง) สระบุรี (มวกเหล็ก วังม่วง) นครราชสีมา (ด่านขุนทด) ยโสธร (กุดชุม ป่าดัว ไทยเจริญ เมือง ทรายมูล คำเขื่อนแก้ว เลิงนกทา) สุรินทร์ (รัตนบุรี) อำนาจเจริญ (เสนางคนิคม หัวตะพาน เมือง) ร้อยเอ็ด (จตุรพักตรพิมาน พนมไพร อาจสามารถ เมยวดี โพนทอง หนองพอก เสลภูมิ เมืองสรวง ธวัชบุรี) ราชบุรี (ปากท่อ วัดเพลง บ้านคา) เพชรบุรี (เมือง หนองหญ้าปล้อง แก่งกระจาน ชะอำ ท่ายาง เขาย้อย บ้านลาด บ้านแหลม) พัทลุง (ป่าพะยอม ควนขนุน ศรีบรรพต) นครศรีธรรมราช (ลานสกาทุ่งสง เขียวใหญ่ ร่อนพิบูลย์ พระพรหม เมือง ชะอวด ปากพนัง หัวไทร) และจังหวัดสงขลา (ระโนด) พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ มีฝนตกบริเวณ จังหวัดสุรินทร์ (ท่าตูม) ร้อยเอ็ด (เกษตรวิสัย ปทุมรัตน์ สุวรรณภูมิ โพนทราย หนองฮี) ศรีสะเกษ (ราษีไศล ศิลาลาด) และจังหวัดยโสธร (มหาชนะชัย ค้อวัง)

- การกักขังการปนเปื้อน เพื่อบรรเทาภัยพิบัติดับไฟป่า พื้นที่ปฏิบัติการช่วยเหลือ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีฝนตกบริเวณพื้นที่พรุควนเค็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เขียใหญ่ ร่อนพิบูลย์ ชะอวด หัวไทร)
- การกักขังการปนเปื้อน เพื่อเติมเต็มน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (ลพบุรี) และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง/เล็ก จำนวน 8 อ่าง

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2568

- การบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่การเกษตรและเขื่อนกักเก็บน้ำ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 27 สิงหาคม 2568 ปฏิบัติการ 162 วัน จำนวน 2,070 เที่ยวบิน (2,918:24 ชั่วโมงบิน) ปริมาณสารฝนหลวงที่ใช้ปฏิบัติการ 1,642.15 ตัน/ 965 นัด ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 63 จังหวัด พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 142.31 ล้านไร่ และมีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ 29 แห่ง และขนาดกลาง/เล็ก 188 แห่ง

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 68)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนห่อใบข้าว 2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 4. เพลี้ยไฟ 5. โรคไหม้ข้าว 6. หนอนกอข้าว 7. โรคขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ยะลา และกำแพงเพชร) จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตาก นครศรีธรรมราช และมหาสารคาม) จำนวน 9 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี ขอนแก่น นครพนม และอุบลราชธานี) จำนวน 61 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ และปราจีนบุรี) จำนวน 1,560 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 882 ไร่ พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (บุรีรัมย์ สุรินทร์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชัยภูมิ มุกดาหาร นครสวรรค์ ชัยนาท อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม และอำนาจเจริญ) จำนวน 5,638 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 193 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชัยนาท แม่ฮ่องสอน ชัยภูมิ ยะลา และกำแพงเพชร) จำนวน 225 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุโขทัย และสงขลา) จำนวน 6,218 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 6,145 ไร่	- หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ กำจัดพืชอาศัย และเมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัว/ตร.ม. และพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม - เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้น้ำออกจากแปลงนา - เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยต่อมวนเขียวดูดไข่ ระหว่าง 6 :1- 8 :1 หรือ/อ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัว/ต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง - ใช้น้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าว ใช้ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต - ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ฟันเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร - เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง - ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) หากพบอาการของโรครุนแรงให้พ่นทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว แนะนำให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้ ไอโซโพรโทเลน คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ เซตริฟโตมัยซินซัลเฟต+ออกซิเตตราไซคลิน
มะพร้าว	1. ตัวแรด 2. โรสี้ขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 28 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ชุมพร สมุทรสาคร เพชรบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง สตูล กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา กระบี่ จันทบุรี ราชบุรี ระยอง สมุทรปราการ ภูเก็ต สงขลา เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ขอนแก่น พังงา ตรัง นครปฐม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และปัตตานี) จำนวน 6,472 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 123 ไร่ พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา กาฬสินธุ์ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สระแก้ว ชุมพร ตรัง และชัยนาท) จำนวน 705 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 7 ไร่	- ปกป้องต้นมะพร้าวด้วยตาข่ายพลาสติก เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ หรือปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ ใช้สารเคมีมาเม็กดิน-เบนโซเอท โดยมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตรฉีดเข้าลำต้น และมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร เช่น มะพร้าวหน้าหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ทำน้ำตาลให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ - ตัดทะลายและช่อดอกมะพร้าวที่โรสี้ขามะพร้าวเข้าทำลาย นำออกไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง กำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสี้ขามะพร้าวเข้าทำลาย ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ชลบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา กระบี่ สตูล พังงา ตรัง สมุทรสงคราม จันทบุรี ภูเก็ต เพชรบูรณ์ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ นครพนม กรุงเทพมหานคร สระแก้ว อุบลราชธานี พัทลุง และนครราชสีมา)	- ดัดยอตะมะพร้าวที่ถูกหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงค้ำหนามกัดกินไปเผาทำลาย ปลอญแตนเบียนอะซีโคเตส ควบคุมหนอนแมลงค้ำหนามมะพร้าว หรือแตนเบียนเตตระสติคัส ควบคุมด้กแด้แมลงค้ำหนามมะพร้าว และอนุรักษศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ - ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงงวงในระยะหนอนและดักแด้ ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชันผสมกับน้ำมันยาง ทาบริเวณแผลโคนต้นหรือลำต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่ของด้วงงวงมะพร้าว - ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ใช้ตาข่ายหรือแหจับปลามาซึ่งวางทิศทางลมดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม อัตรา 800 กรัม/กองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะหนอนและดักแด้ หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ ไดอะซินอน 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณคอกมะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก โดยใช้ปริมาณ 1 - 1.5 ลิตร/ต้น ทุก 15 - 20 วัน ควรใช้ 1 - 2 ครั้ง ในช่วงระบาด
	4. แมลงค้ำหนาม	พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ชุมพร เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา กระบี่ พังงา ตรัง สตูล สมุทรสงคราม ภูเก็ต จันทบุรี เพชรบูรณ์ สมุทรสาคร บุรีรัมย์ ระยอง กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา นครพนม พัทลุง นครราชสีมา สมุทรปราการ สระแก้ว และอุบลราชธานี)	
	5. ด้วงงวง	พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ตรัง กรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์ ระยอง เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรสาคร พังงา ภูเก็ต ราชบุรี ขอนแก่น และลำพูน)	
ปาล์ม น้ำมัน	1. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช และสงขลา)	- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน - ปลอญแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ - การใช้วิธีกล ตัดใบ และใช้กับดักแสงไฟ การใช้ชีววิธี โดยพ่นแบคทีเรีย บาซิลลัส ทรูริงเยนซิส และการใช้สารเคมี โดยพ่นสารฆ่าแมลง - ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอนและดักแด้ - หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอกปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7 - 10 วัน ในตอนเย็นก่อนค่ำ - กำจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่น ๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อในธรรมชาติ และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาราดหรือฉีดพ่นบริเวณรอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ - ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบเป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง - ตัดทางใบที่ถูกทำลายแล้วนำไปเผาทันที เก็บเศษซากพืช นำออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ ปลอญแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม
	2. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี นครราชสีมา สกลนคร และจันทบุรี)	
	3. หนอนหน้าแมว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ระยอง สุราษฎร์ธานี สระบุรี และนครศรีธรรมราช)	
	4. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี สตูล นครศรีธรรมราช ชลบุรี ตรัง กระบี่ สงขลา ระยอง ฉะเชิงเทรา สระบุรี จันทบุรี สระแก้ว และร้อยเอ็ด)	
	5. ด้วงกุหลาบ	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล ตรัง กระบี่ ตรัง สงขลา นราธิวาส นครศรีธรรมราช สระบุรี และจันทบุรี)	
	6. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ชลบุรี สตูล ตรัง และจันทบุรี)	
	7. โรคทะลายเน่า	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง และนครศรีธรรมราช)	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	8. โรคใบจุด 9. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 87 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตรัง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 3,173 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,973 ไร่	ระยะหนอนของหนอนหัวดำ - ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
ยางพารา	1. โรคครากขาว 2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคคราแป้ง 5. โรคเส้นดำ 6. อาการเปลือกแห้ง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,165 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (น่าน สุโขทัย อุตรธานี นอนงคาย สงขลา บึงกาฬ นครศรีธรรมราช ระนอง ระยอง เลย กระบี่ ลำปาง นครพนม สุราษฎร์ธานี พังงา และกาญจนบุรี) จำนวน 39,967 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 25,857 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ตรัง ปัตตานี สุราษฎร์ธานี สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตราด นอนงคาย ชุมพร จันทบุรี กระบี่ พังงา และจังหวัดลำปาง) จำนวน 5,039 ไร่ การระบาดลดลง 146 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ปัตตานี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 760 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี สุราษฎร์ธานี กระบี่ นราธิวาส ตราด และจังหวัดสกลนคร) จำนวน 145 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตรัง สกลนคร สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราช สุโขทัย และชลบุรี) จำนวน 5,122 ไร่ การระบาดคงที่	- คำนแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ - เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยเคมีในช่วงปลายฤดูฝนตามคำแนะนำเพื่อให้ใบที่ผลิออกมาใหม่สมบูรณ์และแก่เร็ว พันธุ์ยะอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของเชื้อ - เมื่อพบอาการโรคเป็นรอยบุ๋มเพียงเล็กน้อย ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราทาบริเวณที่ถูกทำลาย เพื่อรักษาโรค - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง เช่น ต้นยางไหลนานผิดปกติและน้ำยางจางลง หรือน้ำยางหยุดไหลเร็ว หรือน้ำยางหยุดไหลเป็นช่วง ๆ บนหน้ากรีด ควรหยุดกรีด 3 - 6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง
กาแฟ	1. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการเข้าทำลายของหนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟ-สีแดง ให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลง
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 2. โรคใบไหม้ 3. โรแดงมันสำปะหลัง 4. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ชลบุรี ราชบุรี สกลนคร สุโขทัย สระแก้ว บุรีรัมย์ และจันทบุรี) จำนวน 979 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชัยนาทบุรีรัมย์ ยโสธร และสกลนคร) จำนวน 306 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ชลบุรี บุรีรัมย์ ระยอง กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ มหาสารคาม และขอนแก่น) จำนวน 10,714 ไร่ การระบาดลดลง 2,823 ไร่ พื้นที่ระบาด 38 จังหวัด (นครราชสีมา กาญจนบุรี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชลบุรี ปราจีนบุรี กำแพงเพชร บุรีรัมย์ อุทัยธานี สระแก้ว อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ชัยภูมิ ระยอง นครสวรรค์ มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ ชัยนาท ร้อยเอ็ด มุกดาหาร อุตรธานี ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย อุตรดิตถ์ สกลนคร จันทบุรี ตาก นครพนม อำนาจเจริญหนองบัวลำภู และพิจิตร) จำนวน 998,096 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 43,442 ไร่	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - โรคใบไหม้ แนะนำใช้พันธุ์ต้านทาน หรือพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคปานกลาง ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชหมุนเวียนอายุสั้น เพื่อลดประชากรเชื้อโรคในดิน การใช้สารเคมีเป็นทางเลือกสุดท้าย ควรใช้สารเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นพวกทองแดง-ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและดักแด้ในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหารสามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะหนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ มล./น้ำ 20 ลิตร เชื้อไวรัส วคลีโอโพลีอีโดรไวรัส หรือ เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอม อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคย

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	5. โรคโคนเน่าหัวเน่า 6. โรคพุ่มแจ้	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สระแก้ว ชลบุรี และสกลนคร) จำนวน 118 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว บุรีรัมย์ และจันทบุรี) จำนวน 1,091 ไร่ การระบาดลดลง 27 ไร่	มีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - ควรยกร่องแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสฟิไทล-อะลูมิเนียม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัดอุดรธานี อุทัยธานี นครสวรรค์ ตาก นครราชสีมา เชียงใหม่ ยะลา จันทบุรี กาฬสินธุ์ สระแก้ว ขอนแก่น สตูล และสงขลา) จำนวน 4,671 ไร่ การระบาดลดลง 2,578 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 310 ไร่ การระบาดคงที่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและป็นตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาว 3. โรคเส้ดำ 4. ด่างหนวดยาว	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น กาญจนบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และชลบุรี) จำนวน 1,501 ไร่ การระบาดลดลง 73 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มุกดาหาร นครราชสีมา และหนองบัวลำภู) จำนวน 26,776 ไร่ การระบาดลดลง 71 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อุทัยธานี บุรีรัมย์ อุดรดิตถ์ และขอนแก่น) จำนวน 275 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (บุรีรัมย์ และขอนแก่น) จำนวน 167 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชยปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาวหมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก - โรคเส้ดำ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบและฉีดพ่นในเวลายเย็น
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง 4. หนอนเจาะผล 5. ไรแดง 6. โรครากเน่าโคนเน่า 7. โรคใบดิดหรือใบไหม้	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และระยอง) จำนวน 1,043 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตราด กระบี่ สงขลา นราธิวาส และพังงา) จำนวน 984 ไร่ การระบาดลดลง 43 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ยะลา ชุมพร จันทบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่) จำนวน 373 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง ยะลา และจันทบุรี) จำนวน 131 ไร่ การระบาดลดลง 28 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตราด และนราธิวาส) จำนวน 945 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตราด ยะลา สงขลา ระยอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี กระบี่ ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ภูเก็ต สตูล และระนอง) จำนวน 4,620 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 84 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ยะลา จันทบุรี ตราด ชุมพร นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี และระนอง) จำนวน 501 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	- เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโพรนิล หรือคาร์โบซัลเฟน เลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอะมีทอกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอะมีทอกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน - เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย - เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไพโรพาร์ไคด์ อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ อัตรา 30 มล. หรือเฮกซีไทอะซอกซออัตรา 40 มล. - โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - เมื่อพบการระบาดของโรคใบดิดหรือใบไหม้มากควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบ - เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคยังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช - หากพบเพลี้ยหอยเกิดขึ้นในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวต์ออยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	8. โรคใบจุดสาหร่าย 9. เพลี้ยหอยเกล็ด 10. เพลี้ยจักจั่นฝอย 11. โรคราดำ 12. โรคราสีชมพู 13. มอดเจาะลำต้น ทุเรียน 14. หนอนกินใบ 15. โรคกิ่งแห้ง 16. โรคแอนแทรคโนส 17. หนอนเจาะเมล็ด 18. โรคผลเน่าทุเรียน	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ยะลา ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และกระบี่) จำนวน 1,196 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ชุมพร ยะลา สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ และ นราธิวาส) จำนวน 966 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 44 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ระยอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตราด ปราจีนบุรี กระบี่ สงขลา ยะลา และนราธิวาส) จำนวน 966 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 44 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตราด และ สุรินทร์) จำนวน 138 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 44 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ชุมพร ยะลา สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ และ นราธิวาส) จำนวน 178 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชุมพร จันทบุรี ยะลา ตราด และสงขลา) จำนวน 135 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตราด และ สุรินทร์) จำนวน 143 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด ยะลา จันทบุรี ปราจีนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสงขลา) จำนวน 507 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 14 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร ยะลา และจันทบุรี) จำนวน 431 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และ สงขลา) จำนวน 1,910 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 136 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ยะลา ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 153 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 4 ไร่	- เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลเฟน อัตรา 50 มล. หรือ ไซเพอร์เมทริน/ไพเพาโซน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้ สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน - เมื่อพบคราบราสีดำ พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดำ และ สารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อ สาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง - ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบ อาการของโรคราที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ ผสมน้ำขึ้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด - ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัด ด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน - มอดเจาะลำต้น ควรตัดและเผาทิ้ง สำหรับส่วนของต้น ทุเรียนที่ไม่สามารถตัดทิ้งได้ - หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อน ให้เขย่ากิ่ง ตัวหนอนคืบจะทิ้งตัวลงที่พื้นดิน สามารถจับ ทำลายได้ หรือใช้กับดักแสง ไฟล่อตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืน - หมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วง ที่มีฝนตกชุก ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ไม่ให้รกทึบ และกำจัด วัชพืชในสวนเพื่อลดความชื้น หากพบการระบาดเพียง เล็กน้อย ควรตัดส่วนที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกสวน - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สาร ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - หมั่นตรวจตราผลทุเรียนในแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงผลใกล้แก่ หากพบอาการผลเป็นจุดเน่า ควรทำการฉีดพ่นสารเคมี เช่น เมตาแลกซิล 25% WP หรือ เมตาแลกซิลผสมแมนโคเซบ หรือ ฟอสเอทธิล อะลูมิเนียม 80% WP ให้ทั่วทั้งต้น ประมาณ 1-2 ครั้ง
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 55 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนราธิวาส) จำนวน 300 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 188 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และจันทบุรี) จำนวน 126 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบ โคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่ง ทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกร พ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่น นำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด จันทบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 157 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่	- การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้ง โดยการ พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ 4. โรคน้ำจุด 5. โรคน้ำจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระยอง นราธิวาส พังงา และยะลา) จำนวน 436 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 31 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 338 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 11 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 264 ไร่ การระบาดลดลง 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส และตรัง) จำนวน 585 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 13 ไร่	- เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุด ในช่วงที่มั่งคุดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 30-80 กรัม - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ - เมื่อเริ่มพบอาการของโรค ให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่ฉลากระบุ - เมื่อพบโรแดงหรือโรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคราดำ 3. โรคพุ่มไม้กวาด 4. หนอนคืบกินใบ 5. โรคโรก้ามะหยี่ 6. หนอนม้วนใบ 7. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 80 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 269 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 163 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 24 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 50 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 42 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบนตาโซฟลูทรีน อัตรา 40-50 กรัม - หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาด ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง - เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักแต่ไปทำลาย - หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมปดาไซฮาโลทริน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบมีการระบาด ให้ตัดแต่งกิ่ง และยอดที่ถูกโรทำลายนำไปเผาทั้งนอกแปลงปลูก - หมั่นตรวจ ถ้าพบให้เก็บทำลาย หากระบาดรุนแรงมาก ควรฉีดพ่นด้วยยาโมโนโครโทพอส ในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือพ่นด้วยไพรีทรอยด์อัตรา 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร - ตัดส่วนที่ถูกทำลายที่มีตัวหนอนแล้วเผาไฟเสียและจับตัวแก่ที่มาเล่นไฟกลางคืนไปทำลาย - จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย หากพบระบาดมาก ใช้ยาฆ่าแมลงพวก โมโนโครโทพอส ฉีดพ่นในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือยาฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร - การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในช่วงฤดูแล้งขณะที่อยู่ในดอกออกติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 3 ครั้ง

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2568

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค ทั้งหมด 12 จังหวัด 18 จุด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ เลย หนองคาย และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้ และพบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 2 จุด ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดอำนาจเจริญ

พื้นที่เฝ้าระวังการเกิดโรค 122 จุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อุดรธานี น่าน กำแพงเพชร อุดรดิตถ์ นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง