



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819959 E-mail : droughtcenter@gmail.com



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 10 ตุลาคม 2568 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.




แผนที่อากาศผิวพื้น วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 07:00 น.

ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ไว้ด้วย ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงกว่าเมื่อก่อนนี้

สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 9 ต.ค. 68 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 10 ต.ค. 68



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.ตะกั่วป่า	พังงา	46.9	ฝนตกหนัก
2	อ.อรัญประเทศ	สระแก้ว	42.5	ฝนตกหนัก
3	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	41.6	ฝนตกหนัก
4	อ.เมือง	ตรัง	31.8	ฝนตกปานกลาง
5	อ.เมือง	ภูเก็ต	19.0	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 68)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 65,852 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 86 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 41,903 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (60,664 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79) มากกว่าปี 2567 จำนวน 5,188 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 392.55 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 224.30 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 10,659 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 61,365 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 87 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 37,827 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (56,602 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80) มากกว่า ปี 2567 จำนวน 4,763 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 302.94 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 138.92 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 9,566 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	23,210	93	16,465	91	87	1,145	1,037	91	944	90	95	25,970	24,247	93	17,410	91	1,726
ตอน.	12	8,368	7,312	87	5,659	84	230	2,122	1,873	88	1,703	87	242	10,490	9,184	88	7,363	85	1,307
กลาง	3	1,419	940	66	880	65	27	419	331	79	305	78	30	1,838	1,270	69	1,184	68	567
ตะวันตก	2	26,605	23,037	87	9,760	73	8	164	85	52	74	49	10	26,769	23,122	86	9,834	73	3,647
ตะวันออก	6	1,515	1,141	75	1,047	74	52	1,009	846	84	790	83	58	2,524	1,987	79	1,837	77	537
ใต้	4	8,194	5,726	70	4,016	62	44	721	315	44	259	39	48	8,916	6,041	68	4,275	60	2,875
รวม	35	70,926	61,365	86	37,827	80	448	5,579	4,486	80	4,076	79	483	76,506	65,852	86	41,903	80	10,659

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 23,113 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 93 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 16,417 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 90) ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 150.56 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 70.86 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 1,759 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับ ได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	12,237	91	8,437	87	59.84	47.76	5.00	5.00	1,225
สิริกิตี	9,195	97	6,345	95	38.85	41.04	30.37	35.11	315
ภูมิพล+สิริกิตี	21,432	93	14,782	91	98.69	88.80	35.37	40.11	1,540
แควน้อยฯ	940	100	897	100	19.33	22.22	18.14	19.87	-
ป่าสักชลสิทธิ์	741	77	738	77	32.54	35.33	17.35	21.62	219
รวมทั้งหมด	23,113	93	16,417	90	150.56	146.35	70.86	81.60	1,759

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ คือ อ่างฯ คลองสี่แยก (29%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จำนวน 20 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (91%) อ่างฯ สิริกิตี (97%) อ่างฯ แม่จัดสมบูรณ์ชล (101%) อ่างฯ แม่กงอุดมธรา (86%) อ่างฯ กิ่วคอหมา (90%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (100%) อ่างฯ แม่มอก (101%) อ่างฯ ห้วยหลวง (101%) อ่างฯ น้ำอูน (99%) อ่างฯ จุฬารัตน์ (89%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (95%) อ่างฯ ลำปาว (92%) อ่างฯ ลีรินธร (89%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (85%) อ่างฯ วชิราลงกรณ์ (90%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (92%) อ่างฯ บางพระ (97%) อ่างฯ หนองปลาไหล (84%) อ่างฯ ประแสร์ (93%) และอ่างฯ นฤปดินทรจินดา (98%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำพระสทิ้ง แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำน่าน แม่น้ำบางปะกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำยม แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วม

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,696 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,719 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +24.32 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.38 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,300 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,300 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน + 16.08 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.95 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +15.47 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.70 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝางตะวันออก รวม 229 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 229 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 180 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 48 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 1 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เชื่อนพระรามหก 281 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 330 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 133 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 135 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 45 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 75 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 281 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 276 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุโมง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุโมง) 36 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 10 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 100 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 81 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 54 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำเจ้าพระยา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สถานี C.29B ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,462 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,629 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		4 ต.ค. 68	5 ต.ค. 68	6 ต.ค. 68	7 ต.ค. 68	8 ต.ค. 68	9 ต.ค. 68	10 ต.ค. 68		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร - เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร - เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	ปกติ	
เจ้าพระยา	ท่าน้ำกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 9 ต.ค. 68	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	5.00	-7.80
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	10.46	-5.54
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	8.16	-4.04
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	9.89	-2.11
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	9.60	-2.90
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	11.93	-2.57

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

3.1 กรมชลประทาน ให้ความช่วยเหลือเครื่องจักร - เครื่องมือ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 68 – 5 ต.ค. 68 รวม 1,544 หน่วย แบ่งเป็น เครื่องสูบน้ำ 1,544 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 333 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 24 คัน และเครื่องจักรสนับสนุนอื่นๆ 111 หน่วย

3.2 กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหารและเมล็ดพันธุ์พืชผักแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหาร (พริก/มะเขือเปราะ) จำนวน 17,000 ต้น เมล็ดพันธุ์พืชผัก (คะน้า/กวางตุ้ง) จำนวน 9,500 ซอง และเตรียมหัวเชื้อ ราไตรโคเดอร์มา 10,240 ขวด และเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 17,830 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด

3.3 กรมปศุสัตว์ อพยพสัตว์ จำนวน 325,135 ตัว ให้อาหารสัตว์พระราชทาน 300,590 กิโลกรัม ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ (แร่ธาตุ/ยาปฏิชีวนะ วิตามิน) 43,476 ซอง รักษาสัตว์ 46 ตัว กล้วยชีพัสต์ 437 ถุง พร้อมทั้งจัดตั้งสถานที่พักพิงสัตว์ชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงของประชาชน โดยมีสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลสุขภาพสัตว์ให้ด้วย

3.4 กรมประมง โดยกองตรวจการประมง ได้จัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ 4 ชุด รถยนต์ 4 คัน เรือตรวจการประมง 4 ลำ ช่วยนำส่งเสบียงอาหาร และน้ำดื่ม พร้อมทั้งอพยพประชาชน ผู้ป่วย เด็กและคนชรา ในพื้นที่ประสบภัยสู่พื้นที่ปลอดภัย

4. ผลกระทบด้านการเกษตร

4.1 อุทกภัย ช่วงภัย 23 ส.ค. 68 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 47 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกร 152,328 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1,125,864 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 963,676 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 155,641 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 6,547 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 22,992 ราย พื้นที่ 185,655 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 170,942 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 13,705 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 1,008 ไร่ คิดเป็นเงิน 260,277,742 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 397 ราย พื้นที่ 522 ไร่ วงเงิน 933,866 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 68)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกร 5,096 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 8,142 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 7,429 ไร่ บ่อกุ้ง 713 ไร่ กระชัง 647 ตรม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 658 ราย พื้นที่ 748 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 818 ไร่ บ่อกุ้ง 5 ไร่ กระชัง 80 ตรม. วงเงิน 3,916,423 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 127 ราย พื้นที่ 94 ไร่ กระชัง 80 ตรม. วงเงิน 471,163 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 68)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ระยอง และจังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกร 28,939 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 8,138,554 ตัว แบ่งเป็น โค 79,604 ตัว กระบือ 24,563 ตัว สุกร 93,724 ตัว แพะ/แกะ 11,639 ตัว และสัตว์ปีก 7,929,024 ตัว แปลงหญ้า 7,918 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** 389,573 ตัว แบ่งเป็น โค 64 ตัว กระบือ 24 ตัว สุกร 219 ตัว แพะ 33 ตัว และ สัตว์ปีก 389,573 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 68)

4.2 วาตภัย ช่วงภัย 16 ก.พ. 68 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก แพร่ นครสวรรค์ พะเยา เพชรบูรณ์ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ปทุมธานี สระบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 6,799 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 11,006 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 826 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 4,144 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 6,036 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,070 ราย พื้นที่ 1,858 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 113 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 794 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 951 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,509,282 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,014 ราย พื้นที่ 1,827 ไร่ วงเงิน 5,380,849 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 68)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย เกษตรกร 1 ราย กระชัง 50 ตรม. คิดเป็นเงิน 18,400 บาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 68)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนห่อใบข้าว 2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช อุตรดิตถ์ ตราด ยะลา และจันทบุรี) จำนวน 24 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน นครศรีธรรมราช และนครราชสีมา) จำนวน 2,141 ไร่ การระบาดคงที่	- หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ กำจัดพืชอาศัย และเมื่อตรวจพบมีเชื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัว/ตร.ม. และพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม - เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้น้ำออกจากแปลงนา

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ตาก ลำพูน ขอนแก่น ชลบุรี มหาสารคาม สุรินทร์ นครพนม อุดรดิตถ์ อุดรธานี อุบลราชธานี และจันทบุรี) จำนวน 1,051 ไร่ การระบาดลดลง 2,965 ไร่	- เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัย ต่อมวนเขียวตูดไข่ ระหว่าง 6 :1- 8 :1 หรือ/อ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัว/ต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง
	4. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สุรินทร์ ปราจีนบุรี อุทัยธานี และนครราชสีมา) จำนวน 240 ไร่ การระบาดคงที่	- ใช้น้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟ ตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าว ไข่น้ำพุเรียว อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต
	5. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด (บุรีรัมย์ สุรินทร์ ลำพูน กาฬสินธุ์ นครพนม ปราจีนบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม อุบลราชธานี สกลนครหนองบัวลำภู จันทบุรี และบึงกาฬ) จำนวน 6,865 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,468 ไร่	- ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ฟันเชื้อราไตรโครเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร - เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลาย หนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง
	6. หนอนกอข้าว	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (พิษณุโลก มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น สกลนคร และยะลา) จำนวน 121 ไร่ การระบาดลดลง 26 ไร่	- ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) หากพบอาการของโรครุนแรงให้พ่น ทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว แนะนำให้ใช้ สารป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้ ไอโซพอร์ทโอเลน คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์ สเตรพีโตมัยซินซิลเพต+ออกซิเตทตราไซคลิน
	7. โรคขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สงขลา สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และสกลนคร) จำนวน 1,057 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 561 ไร่	- ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงใน ระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเรน บูโพรเฟซิน
	8. โรคใบสีส้ม	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา ปราจีนบุรี และ กาฬสินธุ์) จำนวน 223 ไร่ การระบาดคงที่	- ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงใน ระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเรน บูโพรเฟซิน
	9. โรคใบขีดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา อุบลราชธานี และบุรีรัมย์) จำนวน 166 ไร่ การระบาดลดลง 26 ไร่	- ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้ ไอโซพอร์ทโอเลน คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์ สเตรพีโตมัยซินซิลเพต+ออกซิเตทตราไซคลิน
	10. เพลี้ยจักจั่นสีเขียว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และกาฬสินธุ์) จำนวน 373 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 2 ไร่	- ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงใน ระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเรน บูโพรเฟซิน
มะพร้าว	1. ด่างแรด	พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สมุทรสาคร ชุมพร เพชรบุรี สมุทรสงคราม ขอนแก่น นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรวาท กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา สตูล กระบี่ ระยอง สงขลา สมุทรปราการ จันทบุรี นครราชสีมา พังงา เพชรบูรณ์ ตรัง ภูเก็ต นครปฐม ราชบุรี ร้อยเอ็ด และปัตตานี) จำนวน 6,304 ไร่ การระบาดลดลง 35 ไร่	- ตัดทำลายและขุดดอกมะพร้าวที่โรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย นำออกไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง กำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไร ในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกัน ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดย เลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน
	2. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 41 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุรินทร์ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา ราชบุรี สมุทรสาคร บึงกาฬ นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ สมุทรสงคราม ตรวาท ปัตตานี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ อุดรธานี กรุงเทพมหานคร กระบี่ นครราชสีมา พังงา จันทบุรี นครพนม อุบลราชธานี ภูเก็ต สระแก้ว หนองคาย สมุทรปราการ ระยอง พัทลุง อำนาจเจริญ สุโขทัย กาญจนบุรี สตูล สระบุรี ร้อยเอ็ด สกลนคร และยะลา) จำนวน 44,292 ไร่ การระบาดลดลง 1,467 ไร่	- ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมระยะหนอนของ หนอนหัวดำ หรือปลอ่ยแตนเบียนไซโครแกรมมา เพื่อ ควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ ใช้สารเคมีอิมามิกติน-เบนโซเอท โดยมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ฉีดเข้าลำต้น และมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ทำ น้ำตาลให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ - ตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงค้ำหนาม กัดกินไปเผาทำลาย ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส ควบคุม หนอนแมลงค้ำหนามมะพร้าว หรือแตนเบียนเตตระสติคัส ควบคุมดักแด้แมลงค้ำหนามมะพร้าว และอนุรักษศัตรู ธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชุมพร ชลบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรด สงขลา กระบี่ พังงา สตูล ตรัง สมุทรสงคราม เพชรบูรณ์ จันทบุรี ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ นครพนม กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี พัทลุง และนครราชสีมา)	- ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อ โดยใช้เชื้อราเมตาไธเลียซึม เพื่อกำจัดด้วงงวงในระยะหนอน และดักด้ว ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชั้นผสมกับน้ำมันยาง ทาบริเวณแผลโคนต้นหรือลำต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่ของด้วงงวงมะพร้าว
	4. โรสี้ขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา จันทบุรี กาฬสินธุ์ นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว ชุมพร ตรด และชัยนาท)	- ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ใช้ตาข่ายหรือแหจับปลามาซึ่งวางทิศทางลมดักจับด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตาไธเลียซึม อัตรา 800 กรัม/กองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและ มะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะ หนอนและดักด้ว หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารเคมี ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ ไดอะซินอน 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณคอ มะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก
	5. ด้วงงวง	พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตรด กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร กาฬสินธุ์ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี จันทบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช เพชรบุรี พังงา และ ขอนแก่น)	
		จำนวน 7,038 ไร่ การระบาดลดลง 195 ไร่	
		พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา จันทบุรี กาฬสินธุ์ นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว ชุมพร ตรด และชัยนาท)	
		จำนวน 671 ไร่ การระบาดลดลง 18 ไร่	
		พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตรด กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร กาฬสินธุ์ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี จันทบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช เพชรบุรี พังงา และ ขอนแก่น)	
		จำนวน 898 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่	
ปาล์ม น้ำมัน	1. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชลบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา และนครศรีธรรมราช)	- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณ ใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน
	2. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชลบุรี สกลนคร และจันทบุรี)	- ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม ระยะหนอนของหนอนหัวดำ
	3. หนอนหน้าแมว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชลบุรี)	- การใช้วิธีกล ตัดใบ และใช้กับดักแสงไฟ การใช้ชีววิธี โดยพ่น แบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส และการใช้สารเคมี โดยพ่น สารฆ่าแมลง
	4. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (ร้อยเอ็ด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี กระบี่ สตูล ตรัง สงขลา ฉะเชิงเทรา สระบุรี จันทบุรี ระยอง และสระแก้ว)	- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไธเลียซึม เพื่อกำจัดในระยะดักด้ว และระยะตัวหนอนและดักด้ว
	5. ด้วงกุหลาบ	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล สระบุรี ตรัง กระบี่ ตรด สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส และจันทบุรี)	- หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณ โคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7 - 10 วัน ในตอนเย็นก่อนค่ำ
	6. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา สตูล พังงา จันทบุรี และชลบุรี)	- กำจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่น ๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อ ในธรรมชาติ และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาราดหรือฉีดพ่นบริเวณ รอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ
	7. โรคทะลายเน่า	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ตรด ชุมพร สระแก้ว และนครศรีธรรมราช)	- ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบ เป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบ ที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง
	8. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช และนราธิวาส)	- ตัดทางใบที่ถูกทำลายแล้วนำไปเผาพ่นที่ เก็บเศษซากพืช นำออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม ระยะหนอนของหนอนหัวดำ
	9. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตรัง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช)	- ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผา ทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้ สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
		จำนวน 4,710 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 65 ไร่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคราแป้ง 5. โรคเส้นดำ 6. อาการเปลือกแห้ง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,259 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (นราธิวาส นครศรีธรรมราช ยะลา ตรัง สงขลา ปัตตานี พังงา พัทลุง น่าน สุโขทัย อุตรธานี สุราษฎร์ธานี หนองคาย บึงกาฬ ระนอง ระยอง เลย กระบี่ ลำปาง ตราด ภูเก็ต นครพนม และ กาญจนบุรี) จำนวน 383,379 ไร่ <u>การระบาด8'muj</u> พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ตรัง ปัตตานี สุราษฎร์ธานี สุโขทัย ตราด หนองคาย ชุมพร ระนอง กระบี่ และพังงา) จำนวน 2,829 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1,993 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครศรีธรรมราช) จำนวน 10 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ นราธิวาส ตราด และสกลนคร) จำนวน 161 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตรัง สกลนคร สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตราด และนครศรีธรรมราช) จำนวน 8,468 ไร่ <u>การระบาดลดลง 9 ไร่</u>	- คำนแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนาขนาดกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรงศ์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่ง น้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ - เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยเคมีในช่วงปลายฤดูฝนตามคำแนะนำ เพื่อให้ใบที่ผลิออกมาใหม่สมบูรณ์และแก่เร็ว พันระยะ อ่อนแอต่อการเข้าทำลายของเชื้อ - เมื่อพบอาการโรคเป็นรอยบวมเพียงเล็กน้อย ใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดเชื้อราทาบริเวณที่ถูกทำลาย เพื่อรักษาโรค - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง เช่น ต้นยางไหลนานผิดปกติและน้ำยางจางลง หรือน้ำยาง หยุดไหลเร็ว หรือน้ำยางหยุดไหลเป็นช่วง ๆ บนหน้ากรีด ควรหยุดกรีด 3 - 6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง
กาแฟ	1. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 8 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หากพบการเข้าทำลายของหนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟ- สีแดง ให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลง
มันสำปะหลัง	1. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 3. โรคโคนเน่าหัวเน่า 4. โรคพุ่มแจ้ 5. โรแดงมันสำปะหลัง 6. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 39 จังหวัด (นครราชสีมา กำแพงเพชร กาญจนบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี ชลบุรี ปราจีนบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ สระแก้ว ชัยภูมิ ระยอง นครสวรรค์ มหาสารคาม ยโสธร สระบุรี อำนาจเจริญ สุรินทร์ ชัยนาท อุตรธานี มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ศรีสะเกษ สุโขทัย เลย อุตรดิตถ์ พิจิตร จันทบุรี สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู และตาก) จำนวน 1,212,070 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 51,591 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ชลบุรี ชัยนาท สกลนคร สระแก้ว บุรีรัมย์ นครราชสีมา จันทบุรี และ อุบลราชธานี) จำนวน 1,266 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 565 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สระแก้ว ชลบุรี และสกลนคร) จำนวน 114 ไร่ <u>การระบาดลดลง 4 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี) จำนวน 915 ไร่ <u>การระบาดลดลง 19 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ชลบุรี บุรีรัมย์ ระยอง กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ มหาสารคาม และขอนแก่น) จำนวน 6,218 ไร่ <u>การระบาดลดลง 3,862 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชัยนาทยโสธร อุบลราชธานี และสกลนคร) จำนวน 301 ไร่ <u>พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่</u>	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยง การขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคย มีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - ควรกรองแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม - โรคใบไหม้ แนะนำใช้พันธุ์ต้านทาน หรือพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค ปานกลาง ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชหมุนเวียน อายุสั้น เพื่อลดประชากรเชื้อโรคในดิน การใช้สารเคมีเป็นทางเลือก สุดท้าย ควรใช้สารเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นพวกทองแดง- ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและ ดักแด้ในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหาร สามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะ หนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ มล./น้ำ 20 ลิตร เชื้อไวรัส วคส์โอโพสิโตไวรัส หรือ เอ็นพีวี หนอนกระทูหอม อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 12 (อุทัยธานี นครราชสีมา ตาก เชียงใหม่ ยะลา จันทบุรี กาฬสินธุ์ สระแก้ว พัทลุง ขอนแก่น สตูล และสงขลา) จำนวน 3,379 ไร่ การระบาดลดลง 419 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 305 ไร่ การระบาดคงที่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน การตัดต้นและปักตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาว 3. โรคเส้ดำ 4. ด่างหนวดยาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 1,406 ไร่ การระบาดลดลง 80 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ อุดรธานี มุกดาหาร นครราชสีมา และหนองบัวลำภู) จำนวน 21,479 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (อุทัยธานี และบุรีรัมย์) จำนวน 264 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (บุรีรัมย์ และขอนแก่น) จำนวน 167 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก - โรคเส้ดำ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบและฉีดพ่นในเวลายืน
ทุเรียน	1. เพลี้ยแป้ง 2. เพลี้ยไฟ 3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. เพลี้ยหอยเกล็ด 5. หนอนเจาะผล 6. ไรแดง 7. โรคคราก่นาโคเนน่า 8. โรคใบติดหรือใบไหม้ 9. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ยะลา ชุมพร จันทบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่) จำนวน 409 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และกระบี่) จำนวน 996 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา สุราษฎร์ธานี ตราด ชุมพร สงขลา ตรัง กระบี่ นราธิวาส สตูล และพังงา) จำนวน 1,016 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ยะลา ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระยอง และนราธิวาส) จำนวน 232 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร นครศรีธรรมราช และ จันทบุรี) จำนวน 83 ไร่ การระบาดลดลง 14 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตราด และนราธิวาส) จำนวน 849 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตราด ยะลา ระยอง สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา นราธิวาส ตรัง กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ตาก ภูเก็ต และสตูล) จำนวน 4,629 ไร่ การระบาดลดลง 64 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ยะลา จันทบุรี ชุมพร ตราด นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 601 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 18 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ยะลา กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และตราด) จำนวน 1,186 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 61 ไร่	- เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการ ควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย - เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโปรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สาร ผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอะมีโทกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอะมีโทกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน - เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไพโรพาร์โกด์ อัตรา 30 กรัม อะมิทาส อัตรา 30 มล. หรือเซกซ์ไทอะซอกซ็อกซ์อัตรา 40 มล. - โรคคราก่นาโคเนน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - เมื่อพบการระบาดของโรคใบติดหรือใบไหม้มากควรพ่นสาร ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบ - เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือ ส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรครุนแรงระบาดพ่นด้วยสาร ป้องกันกำจัดโรคพืช - หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสม ไวต์ออยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาด รุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ - เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล. หรือ ไซเพอร์เมทริน/ไพฟาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้ สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน - เมื่อพบคราบราสีดํา พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดํา และ สารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	10. เพลี้ยจักจั่นฝอย 11. โรคราดำ 12. โรคราสีชมพู 13. มอดเจาะลำต้น ทุเรียน 14. หนอนกินใบ 15. โรคกิ่งแห้ง 16. โรคแอนแทรคโนส 17. หนอนเจาะเมล็ด 18. โรคผลเน่าทุเรียน	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ปราจีนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตราด ระยอง นครศรีธรรมราช สงขลา กระบี่ ยะลา พัทลุง และนราธิวาส) จำนวน 993 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา ชุมพร และพังงา) จำนวน 131 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตราด สุราษฎร์ธานี สงขลา ภูเก็ต และกระบี่) จำนวน 181 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร จันทบุรี ยะลา ตราด สงขลา และตรัง) จำนวน 140 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ชุมพร ระยอง และสุรินทร์) จำนวน 453 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา ปราจีนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตราด และสงขลา) จำนวน 494 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 18 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร ยะลา และจันทบุรี) จำนวน 427 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (พัทลุง ยะลา นราธิวาส และ นครศรีธรรมราช) จำนวน 540 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 96 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร และยะลา) จำนวน 21 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3 ไร่	สาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง - ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคราที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ ผสมน้ำขึ้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด - ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซยาโลทริน - มอดเจาะลำต้น ควรตัดและเผาทิ้ง สำหรับส่วนของต้น ทุเรียนที่ไม่สามารถตัดทิ้งได้ - หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อน ให้เขย่ากิ่ง ตั๊กแตนคืบจะทิ้งตัวลงที่พื้นดิน สามารถจับทำลายได้ หรือใช้กับดักแสง ไฟล่อตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืน - หมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุก ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ไม่ให้รกทึบ และกำจัดวัชพืชในสวนเพื่อลดความชื้น หากพบการระบาดของเพี้ย เล็กน้อย ควรตัดส่วนที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกสวน - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สาร ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - หมั่นตรวจตราผลทุเรียนในแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ ในช่วงผลใกล้แก่ หากพบอาการผลเป็นจุดเน่า ควรทำการ ฉีดพ่นสารเคมี เช่น เมตาแลกซิล 25% WP หรือ เมตาแลก ซิลผสมแมนโคเซป หรือ ฟอสเอทิล อะลูมิเนียม 80% WP ให้ทั่วทั้งต้น ประมาณ 1-2 ครั้ง
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 55 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนราธิวาส) จำนวน 295 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 188 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 143 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ 4. โรคใบจุด 5. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด จันทบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 152 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระยอง พังงา และยะลา) จำนวน 451 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 27 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ระยอง และพังงา) จำนวน 349 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และ ชุมพร) จำนวน 280 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร นราธิวาส และตรัง) จำนวน 576 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 8 ไร่	- การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้ง โดยการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรรพ่น 3 ครั้ง - เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุด ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ 30-80 กรัม - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สาร ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ - เมื่อเริ่มพบอาการของโรค ให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่ฉลากระบุ - เมื่อพบไรแดงหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคราดำ 3. โรคพุ่มไม้กวาด 4. หนอนคืบกินใบ 5. โรคโรก้ามะหยี่ 6. หนอนม้วนใบ 7. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 79 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 269 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 196 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 39 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 41 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบตาไซฟลูทรีน อัตรา 40-50 กรัม - หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาด ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง - เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักไปทำลาย หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมปดาไซฮาโลทรีน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบมีการระบาด ให้ตัดแต่งกิ่ง และยอดที่ถูกโรทำลายนำไปเผาทั้งนอกแปลงปลูก - หมั่นตรวจ ถ้าพบให้เก็บทำลาย หากระบาดรุนแรงมาก ควรฉีดพ่นด้วยยาโมโนโครโตฟอส ในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือพ่นด้วยไพรีทรอยด์อัตรา 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร - ตัดส่วนที่ถูกทำลายที่มีตัวหนอนแล้วเผาไฟเสียและจับตัวแก่ที่มาเล่นไฟกลางคืนไปทำลาย - จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย หากพบระบาดมาก ใช้ยาฆ่าแมลงพวก โมโนโครโตฟอส ฉีดพ่นในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือยาฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร - การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในช่วงฤดูแล้งขณะที่อยู่ในดอก ติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 3 ครั้ง

6. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2568

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค ทั้งหมด 15 จังหวัด 30 จุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัด ควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้ ทั้งนี้ พบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 1 จุด ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

พื้นที่เฝ้าระวังการเกิดโรค 98 จุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด หนองคาย อุดรธานี น่าน กำแพงเพชร อุดรดิตถ์ นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา