



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819959 E-mail : droughtcenter@gmail.com



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ


1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “คัลแมกี” และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 05.00 น.

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันนี้ (7 พ.ย. 2568) พายุดีเปรสชัน “คัลแมกี” (KALMAEGI) ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณ อำเภอกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษแล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 15.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 104.5 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุด ใกล้ศูนย์กลางประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ 12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไป และจะเคลื่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 7-8 พ.ย. 2568 จากอิทธิพลของพายุ “คัลแมกี” ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย. 2568 ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตามลำดับ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมซ้ำ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน ควรออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน (7 พ.ย. 2568)...

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 6 พ.ย. 68 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 7 พ.ย. 68



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.ควนกาหลง	สตูล	69.2	ฝนตกหนัก
2	อ.เมือง	ภูเก็ต	33.4	ฝนตกปานกลาง
3	อ.เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	29.8	ฝนตกปานกลาง
4	อ.บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	28.7	ฝนตกปานกลาง
5	อ.สะเดา	สงขลา	27.3	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 68)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 68,685 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 90 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 44,736 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 85) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (63,496 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 83) มากกว่าปี 2567 จำนวน 5,189 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 319.44 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 252.41 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 7,885 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 63,877 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 90 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 40,338 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 85) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (59,217 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 83) มากกว่า ปี 2567 จำนวน 4,660 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 226.15 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 153.63 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 7,114 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รบก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รบก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รบก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รบก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รบก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รบก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	24,327	98	17,582	97	87	1,145	1,121	98	1,028	98	95	25,970	25,448	98	18,610	97	557
ตอน.	12	8,368	7,449	89	5,797	86	230	2,122	1,895	89	1,726	88	242	10,490	9,344	89	7,522	87	1,146
กลาง	3	1,419	1,321	93	1,261	93	27	419	377	90	351	89	30	1,838	1,698	92	1,612	92	161
ตะวันตก	2	26,605	23,674	89	10,397	78	8	164	128	78	117	76	10	26,769	23,802	89	10,513	78	2,967
ตะวันออก	6	1,515	1,250	83	1,156	81	52	1,009	934	93	878	92	58	2,524	2,184	87	2,034	86	348
ใต้	4	8,194	5,856	71	4,146	64	44	721	353	49	298	45	48	8,916	6,209	70	4,444	62	2,706
รวม	35	70,926	63,877	90	40,338	85	448	5,579	4,808	86	4,398	85	483	76,506	68,685	90	44,734	85	7,885

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 24,398 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 98 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 17,702 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 97) ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 109.27 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 84.31 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 500 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับ ได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	13,214	98	9,414	97	68.30	85.88	30.29	20.12	248
สิริกิตี	9,258	97	6,408	96	13.36	10.92	9.91	10.02	252
ภูมิพล+สิริกิตี	22,472	98	15,822	97	81.66	96.80	40.20	30.14	500
แควน้อยฯ	945	101	902	101	3.79	4.33	5.18	5.18	-
ป่าสักชลสิทธิ์	981	102	978	102	23.82	26.38	38.93	30.28	-
รวมทั้งหมด	24,398	98	17,702	97	109.27	127.51	84.31	65.60	500

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จำนวน 22 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (98%) อ่างฯ สิริกิตี (97%) อ่างฯ แม่จัดสมบูรณ์ชล (103%) อ่างฯ แม่กวอดมธราธา (93%) อ่างฯ กี้วลม (85%) อ่างฯ กี้วคอกหมา (109%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (101%) อ่างฯ แม่มอก (105%) อ่างฯ ห้วยหลวง (96%) อ่างฯ น้ำอุ้น (92%) อ่างฯ จุฬารักษ์ (99%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (93%) อ่างฯ ลำปาว (95%) อ่างฯ สิรินคร (93%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (102%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (88%) อ่างฯ วชิราลงกรณ์ (91%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (99%) อ่างฯ บางพระ (100%) อ่างฯ หนองปลาไหล (104%) อ่างฯ ประแสร์ (100%) และอ่างฯ นฤปดินทรจินดา (101%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำพระสทิง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำยม ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วม

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,971 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,988 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +24.80 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.90 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,700 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,700 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +17.29 ม.รทก. (เมื่อวาน +17.07 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +16.31 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.31 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 260 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 251 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 210 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 50 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 423 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 311 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 135 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 110 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 16 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 58 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 295 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 279 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุโมง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุโมง) 35 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 11 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 90 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 120 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 39 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำเจ้าพระยา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สถานี C.29B ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,307 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,230 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		1 พ.ย. 68	2 พ.ย. 68	3 พ.ย. 68	4 พ.ย. 68	5 พ.ย. 68	6 พ.ย. 68	7 พ.ย. 68		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	ปกติ	- เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 7 พ.ย. 68	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	4.12	-8.68
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	8.32	-7.68
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	5.22	-6.98
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	4.49	-7.51
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	4.78	-7.72
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	7.08	-7.42

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

3.1 กรมชลประทาน ให้ความช่วยเหลือเครื่องจักร - เครื่องมือ รวม 1,777 หน่วย แบ่งเป็น เครื่องสูบน้ำ 1,261 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 371 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 28 คัน และเครื่องจักรสนับสนุนอื่นๆ 117 หน่วย

3.2 กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหารและเมล็ดพันธุ์พืชผักแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหาร (พริก/มะเขือเปราะ) จำนวน 17,000 ต้น เมล็ดพันธุ์พืชผัก (คะน้า/กวางตุ้ง) จำนวน 9,500 ซอง และเตรียมหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา 10,240 ขวด (การสนับสนุน 4,131 ขวด) และเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 17,830 กิโลกรัม (การสนับสนุน 5,530 กิโลกรัม) นำไปใช้ในพื้นที่ 15,540 ไร่

3.3 กรมปศุสัตว์ อพยพสัตว์ จำนวน 331,903 ตัว หย้าอาหารสัตว์พระราชทาน 524,580 กิโลกรัม ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ (แร่ธาตุ/ยาปฏิชีวนะ วิตามิน) 45,031 ซอง รักษาสัตว์ 79 ตัว กล้วยซีฟัสต์ 786 ฝูง พร้อมทั้งจัดตั้งสถานที่พักพิงสัตว์ชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงของประชาชน โดยมีสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลสุขภาพสัตว์ให้ด้วย

2.4 กรมประมง โดยกองตรวจการประมง ได้จัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ 17 ชุด รถยนต์ 17 คัน เรือตรวจการประมง 17 ลำ ช่วยนำส่งเสบียงอาหาร และน้ำดื่ม พร้อมทั้งอพยพประชาชน ผู้ป่วย เด็กและคนชรา ในพื้นที่ประสบภัยสู่พื้นที่ปลอดภัย

4. ผลกระทบด้านการเกษตร

4.1 อุทกภัย ช่วงภัย 23 ส.ค. 68 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 53 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สมุทรสาคร ราชบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 191,005 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1,338,786 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,135,379 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 193,687 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 9,720 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 111,605 ราย พื้นที่ 865,523 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 786,845 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 75,210 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 3,468 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,217.33 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,097 ราย พื้นที่ 4,089 ไร่ วงเงิน 6.33 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 68)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 37 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี ชัยนาท นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 6,922 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 10,467 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 9,388 ไร่ บ่อกุ้ง 1,079 ไร่ กระชัง 10,529 ต่อม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,512 ราย พื้นที่ 2,375 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 2,061 ไร่ บ่อกุ้ง 314 ไร่ กระชัง 979 ต่อม. วงเงิน 13.54 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 229 ราย พื้นที่ 175 ไร่ กระชัง 328 ต่อม. วงเงิน 940,672 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 68)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี ชัยนาท ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สิงห์บุรี และจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกร 32,616 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 8,462,233 ตัว แบ่งเป็น โค 86,589 ตัว กระบือ 26,593 ตัว สุกร 103,080 ตัว แพะ/แกะ 13,727 ตัว และสัตว์ปีก 8,462,233 ตัว แปลงหญ้า 7,970 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 76 ราย สัตว์ตายและสูญหาย 391,091 ตัว แบ่งเป็น โค 59 ตัว กระบือ 14 ตัว สุกร 216 ตัว แพะ/แกะ 35 ตัว และสัตว์ปีก 390,767 ตัว วงเงิน 542,800 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 10 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 298 ตัว วงเงิน 524,800 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 68)

4.2 วาตภัย ช่วงภัย 16 ก.พ. 68 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก แพร่ นครสวรรค์ พะเยา เพชรบูรณ์ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู หนองคาย อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ปทุมธานี สระบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 6,808 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 11,012 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 826 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 4,144 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 6,042 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,089 ราย พื้นที่ 1,870 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 114 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 794 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 1,870 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,555,784 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,041 ราย พื้นที่ 1,847 ไร่ วงเงิน 5,464,238 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 68)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย เกษตรกร 1 ราย กระชัง 50 ต่อม. คิดเป็นเงิน 18,400 บาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 68)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (กำแพงเพชร อุทัยธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช อุตรดิตถ์ ตราด หนองคาย และยะลา) จำนวน 230 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 180 ไร่	- หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ กำจัดพืชอาศัย และเมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัว/ตร.ม. และพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กาญจนบุรี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช จันทบุรี ลำพูน ตาก และ นครราชสีมา)	- เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ไถน้าออกจากแปลงนา
	3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	จำนวน 366 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 42 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ลำพูน กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี มหาสารคาม ตาก สุรินทร์ จันทบุรี นครพนม และอุทัยธานี)	- เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัย ต่อมวนเขียวดูดไข่ ระหว่าง 6 :1- 8 :1 หรือ/อ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัว/ต้น ให้ใช้ สารกำจัดแมลง
	4. เพลี้ยไฟ	จำนวน 1,162 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สุรินทร์ ปราจีนบุรี อุทัยธานี และนครราชสีมา)	- ใช้น้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟ ตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าว ใช้ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต
	5. โรคไหม้ข้าว	จำนวน 240 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (บุรีรัมย์ สุรินทร์ ภาพสินธุ์ นครพนม ชัยภูมิ ลำพูนนครราชสีมา กำแพงเพชร อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ มหาสารคาม สกลนคร จันทบุรี อุบลราชธานี และหนองบัวลำภู)	- ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ พ่นเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก พ่นเชื้อราไตรโครเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร
	6. หนอนกอข้าว	จำนวน 6,192 ไร่ การระบาดลดลง 826 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (มหาสารคาม พิษณุโลก สุรินทร์ จันทบุรี สงขลา ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา สกลนคร และยะลา)	- เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ไถน้าท่วมและไถดินเพื่อทำลาย หนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง
	7. โรคขอบใบแห้ง	จำนวน 192 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กาญจนบุรี บุรีรัมย์ อุดรธานี มหาสารคาม จันทบุรี ชัยภูมิ และศรีสะเกษ)	- ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) หากพบอาการของโรครุนแรงให้พ่น ทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว แนะนำให้ใช้ สารป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้ ไโอโพรไพโอเลน คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์ เซตริฟโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตตราไซคลิน
	8. โรคใบสีส้ม	จำนวน 349 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ปราจีนบุรี และภาพสินธุ์)	- ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงใน ระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเรน บูโพรเฟซิน อีโทเฟนพรอกซ์ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก
	9. โรคใบขีดสีน้ำตาล	จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (อุบลราชธานี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ)	- ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรค เช่น เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) หากพบอาการของโรครุนแรงให้พ่น ทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว แนะนำให้ใช้ สารป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้ ไโอโพรไพโอเลน คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์ เซตริฟโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตตราไซคลิน
	10. เพลี้ยจักจั่นสีเขียว	จำนวน 43 ไร่ การระบาดลดลง 21 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ขอนแก่น ภาพสินธุ์ จันทบุรี และอุดรธานี)	- ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงใน ระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเรน บูโพรเฟซิน อีโทเฟนพรอกซ์ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก
	11. แมลงบัว	จำนวน 376 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครพนม ตาก อุดรธานี และ นครราชสีมา)	- สสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ ใช้แสงไฟล่อแมลงและ ทำลายเมื่อมีการระบาดรุนแรง ปลุกข้าวพร้อม ๆ กัน และ ปลอ่ยพื้่นนาวางไว้ระยะหนึ่ง เพื่อดึงดูดจระเข็ดของแมลง
		จำนวน 85 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 1 ไร่	- ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงใน ระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเรน บูโพรเฟซิน อีโทเฟนพรอกซ์ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก
มะพร้าว	1. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สมุทรสาคร ชุมพร เพชรบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี สระแก้ว กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา สตูล กระบี่ ระยอง สงขลา สมุทรปราการ จันทบุรี ขอนแก่น พังงา นครราชสีมา ตรัง นครปฐม ภูเก็ต หนองบัวลำภู ราชบุรี และร้อยเอ็ด)	- ตัดทะลายและขุดตอมะพร้าวที่โรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย นำออกไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง กำจัดให้แน่นพ่นสารฆ่าไร ในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกัน ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดย เลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน
		จำนวน 6,028 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่	- ปลอ่ยแต่นเปียนบราคอน เพื่อควบคุมระยะหนอนของ หนอนหัวดำ หรือปลอ่ยแต่นเปียนไข่ทริโครแกรมมา เพื่อ ควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ ใช้สารเคมีมาเม็กดิน-

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 40 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา ราชบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ ตราด สมุทรสงคราม ปัตตานี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ กรุงเทพมหานคร กระบี่ สุรินทร์ นครราชสีมา นครพนม อุตรธานี จันทบุรี พังงา อุบลราชธานี สระแก้ว ภูเก็ต สตูล หนองคาย สมุทรปราการ ระยอง พัทลุง อำนาจเจริญ กาญจนบุรี หนองบัวลำภู สระบุรี ร้อยเอ็ด สุโขทัย และสกลนคร)	เบนโซเอท โดยมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ฉีดเข้าลำต้น และมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ทำน้ำตาลให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ
	3. แมลงดำหนาม	จำนวน 37,246 ไร่ การระบาดลดลง 4,059 ไร่ พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ตราด สงขลา กระบี่ พังงา สตูล ตรัง สมุทรสงคราม เพชรบูรณ์ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง นครพนม อุบลราชธานี นครราชสีมา ภูเก็ต สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร)	- ตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามกัดกินไปเผาทำลาย ปลอยแตนเบียนอะซีโคเตส ควบคุม หนอนแมลงดำหนามมะพร้าว หรือแตนเบียนเตตระสติคัส ควบคุมด้งด้แมลงดำหนามมะพร้าว และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ
	4. โรสี้ขามะพร้าว	จำนวน 6,510 ไร่ การระบาดลดลง 199 ไร่ พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (กาฬสินธุ์ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี สงขลา นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว ชุมพร ตราด และชัยนาท)	- ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อ โดยใช้เชื้อราเมตาโรเซียม เพื่อกำจัดด้วงงวงในระยะหนอน และดักด้ ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชันผสม กับน้ำมันยาง ทาบริเวณแผลโคนต้นหรือลำต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่ของด้วงงวงมะพร้าว
	5. ด้วงงวง	จำนวน 645 ไร่ การระบาดลดลง 11 ไร่ พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตราด กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร นครราชสีมา จันทบุรี นครศรีธรรมราช พังงา เพชรบุรี ราชบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และสงขลา)	- ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ใช้ตาข่ายหรือแหจับปลามาซึ่งวางทิศทางลมดักจับด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตาโรเซียม อัตรา 800 กรัม/กองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและ มะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะ หนอนและดักด้ หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารเคมี ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ โคอะซินอน 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณคอ มะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก
ปาล์ม น้ำมัน	1. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชลบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา และนครศรีธรรมราช)	- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณ ใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำให้ลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน
	2. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี สกลนคร จันทบุรี และนครศรีธรรมราช)	- ปลอยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม ระยะหนอนของหนอนหัวดำ
	3. ด้วงแรด	จำนวน 788 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี ชลบุรี นครศรีธรรมราช สตูล กระบี่ ตรัง สงขลา ฉะเชิงเทรา สระบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว และร้อยเอ็ด)	- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาโรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักด้ และระยะตัวหนอนและดักด้
	4. ด้วงกุหลาบ	จำนวน 1,089 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล สระบุรี ตรัง กระบี่ ตราด สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส และจันทบุรี)	- หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณ โคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7 - 10 วัน ในตอนเย็นก่อนค่ำ
	5. โรคลำต้นเน่า	จำนวน 484 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ระยอง สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ สตูล พังงา จันทบุรี และชลบุรี)	- กำจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่น ๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อ ในธรรมชาติ และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาราดหรือฉีดพ่นบริเวณ รอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ
		จำนวน 11,667 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	- ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบ เป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบ ที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	6. โรคทะลายเน่า 7. โรคใบจุด 8. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตราด สระแก้ว สงขลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 974 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 102 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตรัง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร และนราธิวาส) จำนวน 4,929 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 21 ไร่	- ตัดทางใบที่ถูกทำลายแล้วนำไปเผาทันที เก็บเศษซากพืช นำออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม ระยะเวลาของหนอนหัวดำ - ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผา ทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้ สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
ยางพารา	1. โรคครากขาว 2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคเส้นดำ 5. อาการเปลือกแห้ง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,133 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (น่าน นราธิวาส ยะลา นครศรีธรรมราช สงขลา พังงา ปัตตานี พัทลุง ตรัง อุดรธานี หนองคาย สุโขทัย บึงกาฬ กระบี่ นครพนม หนองคาย ลำปาง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต) จำนวน 355,064 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 33,263 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ตรัง ปัตตานี สุราษฎร์ธานี สุโขทัย ตราด หนองคาย ชุมพร ระนอง นครพนม และพังงา) จำนวน 2,751 ไร่ การระบาดลดลง 96 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด จันทบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา นราธิวาส และสกลนคร) จำนวน 140 ไร่ การระบาดลดลง 14 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตรัง สกลนคร สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตราด และนครศรีธรรมราช) จำนวน 6,669 ไร่ การระบาดคงที่	- คำนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคครากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่ง น้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ - เมื่อพบอาการโรคเป็นรอยบุ๋มเพียงเล็กน้อย ใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดเชื้อราทาบริเวณที่ถูกทำลาย เพื่อรักษาโรค - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง เช่น ต้นยางไหลนานผิดปกติและน้ำยางจางลง หรือน้ำยาง หยุดไหลเร็ว หรือน้ำยางหยุดไหลเป็นช่วง ๆ บนหน้ากรีด ควรหยุดกรีด 3 - 6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง
กาแฟ	1. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 9 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการเข้าทำลายของหนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟ- สีแดง ให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลง
มันสำปะหลัง	1. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 3. โรคโคนเน่าหัวเน่า	พื้นที่ระบาด 37 จังหวัด (นครราชสีมา กาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น อุบลราชธานี อุทัยธานี ชลบุรี ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ ลพบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ สระแก้ว อำนาจเจริญ นครสวรรค์ ระยอง ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร สระบุรี สุรินทร์ ชัยนาท อุดรธานี ร้อยเอ็ดมุกดาหาร ราชบุรี เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ เพชรบุรี สุโขทัย อุดรดิตถ์ พิจิตร จันทบุรี สกลนคร หนองบัวลำภู และนครพนม) จำนวน 1,190,298 ไร่ การระบาดลดลง 39,848 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ชลบุรี ชัยนาท สกลนคร สระแก้ว บุรีรัมย์ จันทบุรี และอุบลราชธานี) จำนวน 1,233 ไร่ การระบาดลดลง 51 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (อุดรดิตถ์ ชลบุรี เพชรบูรณ์ สระแก้ว บุรีรัมย์ และสกลนคร) จำนวน 2,718 ไร่ การระบาดลดลง 455 ไร่	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยง การขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคย มีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - ควรกรร่งแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม - โรคใบไหม้ แนะนำใช้พันธุ์ต้านทาน หรือพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค ปานกลาง ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชหมุนเวียน อายุสั้น เพื่อลดประชากรเชื้อโรคในดิน การใช้สารเคมีเป็นทางเลือก สุดท้าย ควรใช้สารเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นพวกทองแดง- ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและ ดักแด้ในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหาร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. โรคพุ่มแจ้ 5. โรคเน่าเน่าสำหรับปลูก 6. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี) จำนวน 1,046 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 41 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ขอนแก่น ชลบุรี บุรีรัมย์ ระยอง กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร มหาสารคาม และ สุรินทร์) จำนวน 3,241 ไร่ การระบาดลดลง 819 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชัยนาท ยโสธร อุบลราชธานี และสกลนคร) จำนวน 301 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่	สามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะ หนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ มล./น้ำ 20 ลิตร เชื้อไวรัส วคทีโอโพลีโดโรไวรัส หรือ เอ็นพีวี หนอนกระท่อม อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) 2. โรคใบไหม้แผลใหญ่	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา ยะลา เชียงใหม่ จันทบุรี กาฬสินธุ์ สระแก้ว พัทลุง สตูล ขอนแก่น และชลบุรี) จำนวน 3,332 ไร่ การระบาดลดลง 45 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตาก) จำนวน 100 ไร่ การระบาดคงที่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 295 ไร่ การระบาดคงที่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและป่นตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาว 3. โรคเส้ดำ 4. ด่างหนวดยาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 1,401 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุตรดิตถ์ มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ มุกดาหาร และ หนองบัวลำภู) จำนวน 22,404 ไร่ การระบาดลดลง 186 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (อุทัยธานี และบุรีรัมย์) จำนวน 264 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (บุรีรัมย์ และขอนแก่น) จำนวน 167 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย ปลอ่ยแทนเปียนไซไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก - โรคเส้ดำ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบและฉีดพ่นในเวลาเย็น
ทุเรียน	1. เพลี้ยแป้ง 2. เพลี้ยไฟ 3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. เพลี้ยหอยเกล็ด 5. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ยะลา ชุมพร จันทบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่) จำนวน 353 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา ระยอง และกระบี่) จำนวน 865 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช ตราด ยะลา ชุมพร ระยอง สงขลา ตรัง กระบี่ นราธิวาส สตูล พังงา และเพชรบูรณ์) จำนวน 1,287 ไร่ การระบาดลดลง 148 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ยะลา ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระยอง และนราธิวาส) จำนวน 337 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร นครศรีธรรมราช และ จันทบุรี) จำนวน 75 ไร่ การระบาดคงที่	- เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการ ควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย - เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโปรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สาร ผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอามีโทกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอามีโทกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน - เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ โพรพาร์โกด์ อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ อัตรา 30 มล. หรือเฮกซีไทอะซอกซออัตรา 40 มล. - โรครากร่อนโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - เมื่อพบการระบาดของโรคใบดกหรือใบไหม้มากควรพ่นสาร ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	6. ไรแดง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตราด และนราธิวาส) จำนวน 784 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่	เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบ - เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรครยังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช
	7. โรคครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตราด ยะลา ระยอง สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ตรัง นราธิวาส กระบี่ ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ตาก ภูเก็ต และสตูล) จำนวน 4,697 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 132 ไร่	- หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสม ไวโตอยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ
	8. โรคใบติดหรือใบไหม้	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา ชุมพร ตราด นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช และเพชรบูรณ์) จำนวน 511 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 121 ไร่	- เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลเฟน อัตรา 50 มล. หรือ ไซเปอร์เมทริน/ไพอาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน
	9. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ยะลา ตราด นครศรีธรรมราช สงขลา นครราชสีมา กระบี่ นราธิวาส และเพชรบูรณ์) จำนวน 1,464 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 8 ไร่	- เมื่อพบคราบราสีดำ พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดำ และสารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง
	10. เพลี้ยจักจั่นฝอย	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตราด ระยอง นครศรีธรรมราช สงขลา กระบี่ ยะลา นครราชสีมา พัทลุง และนราธิวาส) จำนวน 1,023 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่	- ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคครากที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ ผสมน้ำขุ่นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด
	11. โรคคราดำ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา ชุมพร และพังงา) จำนวน 127 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
	12. โรคราสีชมพู	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตราด สุราษฎร์ธานี สงขลา ภูเก็ต และกระบี่) จำนวน 206 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 15 ไร่	- มอดเจาะลำต้น ควรตัดและเผาทิ้ง สำหรับส่วนของต้น ที่เรียนที่ไม่สามารถตัดทิ้งได้
	13. มอดเจาะลำต้นทุเรียน	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชุมพร จันทบุรี ยะลา ตราด และสงขลา) จำนวน 139 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อน ให้เขย่ากิ่ง ตัวหนอนคืบจะทิ้งตัวลงที่พื้นดิน สามารถจับทำลายได้ หรือใช้กับดักแสง ไฟล่อตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืน
	14. หนอนกินใบ	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ชุมพร ระยอง และสุรินทร์) จำนวน 374 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 20 ไร่	- หมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุก ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ไม่ให้รกทึบ และกำจัดวัชพืชในสวนเพื่อลดความชื้น หากพบการระบาดเพียงเล็กน้อย ควรตัดส่วนที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกสวน
	15. โรคกิ่งแห้ง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด จันทบุรี ยะลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี และพังงา) จำนวน 453 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 5 ไร่	- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร
	16. โรคแอนแทรกโนส	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร ยะลา และจันทบุรี) จำนวน 428 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 10 ไร่	- หมั่นตรวจตราผลทุเรียนในแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงผลใกล้แก่ หากพบอาการผลเป็นจุดเน่า ควรทำการฉีดพ่นสารเคมี เช่น เมตาแลกซิล 25% WP หรือ เมตาแลกซิลผสมแมนโคแซบ หรือ ฟอสเอทธิล อะลูมิเนียม 80% WP ให้ทั่วทั้งต้น ประมาณ 1-2 ครั้ง
	17. หนอนเจาะเมล็ด	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช นราธิวาส และยะลา) จำนวน 516 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 23 ไร่	
	18. โรคผลเน่าทุเรียน	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และยะลา) จำนวน 19 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 291 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 236 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง
	2. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนราธิวาส) จำนวน 295 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่	- ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์
	3. หนอนคืบกินใบ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 187 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่	- หมั่นสำรวจและสังเกตถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 141 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่	- โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ 4. โรคใบจุด 5. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ระยอง ตรัง สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 203 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 36 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระยอง พังงา และยะลา) จำนวน 506 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 28 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ระยอง และพังงา) จำนวน 355 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และชุมพร) จำนวน 266 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ระยอง นราธิวาส ตรัง และพังงา) จำนวน 583 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่	- การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้ง โดยการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชครบ 3 ครั้ง - เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุด ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 30-80 กรัม - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ - เมื่อเริ่มพบอาการของโรค ให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่ฉลากระบุ - เมื่อพบโรแดงหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคราดำ 3. โรคพุ่มไม้กวาด 4. หนอนคืบกินใบ 5. โรคโรก้ามะหยี่ 6. หนอนม้วนใบ 7. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 81 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 282 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 191 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 38 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 41 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบนตาโซฟูทรีน อัตรา 40-50 กรัม - หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง - เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักแด้ไปทำลาย หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมบ์ดาไซฮาโลทริน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบมีการระบาดให้ตัดแต่งกิ่ง และยอดที่ถูกโรทำลายนำไปเผาทิ้งนอกแปลงปลูก - หมั่นตรวจ ถ้าพบให้เก็บทำลาย หากระบาดรุนแรงมาก ควรฉีดพ่นด้วยยาโมโนโครโตฟอส ในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือพ่นด้วยไพรีทรอยด์อัตรา 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร - ดัดส่วนที่ถูกทำลายที่มีตัวหนอนแล้วเผาไฟเสียและจับตัวแก่ที่มาเล่นไฟกลางคืนไปทำลาย - จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย หากพบระบาดมาก ใช้ยาฆ่าแมลงพวก โมโนโครโตฟอส ฉีดพ่นในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือยาฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร - การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในช่วงฤดูแล้งขณะที่อยู่ในดอกติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 3 ครั้ง

6. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 23 - 28 ตุลาคม 2568

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค ทั้งหมด 12 จังหวัด 21 จุด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุตรธานี และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัด ควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้ ทั้งนี้ พบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 3 จุด ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ และจังหวัดอุตรธานี

พื้นที่เฝ้าระวังการเกิดโรค 98 จุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด หนองคาย อุตรธานี น่าน กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา