




รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.




แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07:00 น.

ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และทะเลจีนใต้ในวันนี้ (13 พ.ย. 68) ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคใต้ตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบน และห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

อนึ่ง พายุโซนร้อน “ฟงวอง”(FUNG-WONG) บริเวณด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน มีแนวโน้มจะเคลื่อนไปทางจังหวัดโอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ (13 พ.ย. 68) โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 12 พ.ย. 68 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 13 พ.ย. 68



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.คลองหลวง	ปทุมธานี	63.6	ฝนตกหนัก
2	อ.เมือง	ลพบุรี	63.0	ฝนตกหนัก
3	อ.โชคชัย	นครราชสีมา	54.1	ฝนตกหนัก
4	อ.เมือง	ระยอง	52.6	ฝนตกหนัก
5	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	40.7	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 68)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 69,345 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 91 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 45,396 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 86) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (63,650 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 83) มากกว่าปี 2567 จำนวน 5,695 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 288.37 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 203.15 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 7,223 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 64,428 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 91 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 40,890 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 86) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (59,358 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84) มากกว่า ปี 2567 จำนวน 5,071 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 200.28 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 122.77 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 6,560 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณครน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณครน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณครน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	24,602	99	17,857	98	87	1,145	1,130	99	1,037	98	95	25,970	25,732	99	18,895	99	291
ตอน.	12	7,510	7,510	100	5,858	87	230	2,122	1,977	93	1,808	90	242	10,490	9,487	90	7,666	88	1,004
กลาง	3	1,318	1,318	100	1,258	91	27	419	378	90	352	89	30	1,838	1,696	92	1,610	92	142
ตะวันตก	2	23,857	23,857	100	10,580	79	8	164	132	80	121	78	10	26,769	23,989	90	10,701	79	2,780
ตะวันออก	6	1,247	1,247	100	1,152	81	52	1,009	937	93	881	92	58	2,524	2,184	87	2,033	86	348
ใต้	4	5,859	5,895	101	4,184	64	44	721	362	50	307	45	48	8,916	6,257	70	4,491	63	2,659
รวม	35	64,616	64,428	91	40,890	86	448	5,579	4,917	88	4,506	87	483	70,195	69,345	90	45,396	86	7,223

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 24,588 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 99 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 17,892 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 98) ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 99.33 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 76.96 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 297 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับ ได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	13,406	100	9,606	99	65.28	88.08	55.01	53.00	56
สิริกิตี	9,309	98	6,459	97	13.59	18.65	5.01	4.96	201
ภูมิพล+สิริกิตี	22,715	99	16,065	98	78.87	106.73	60.02	57.96	257
แควน้อยฯ	953	101	910	102	5.35	5.86	5.18	5.18	-
ป่าสักชลสิทธิ์	920	96	917	96	15.11	13.77	11.76	13.00	40
รวมทั้งหมด	24,588	99	17,892	98	99.33	126.36	76.96	76.14	297

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จำนวน 24 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (100%) อ่างฯ สิริกิตี (98%) อ่างฯ แม่จัดสมบูรณ์ชล (104%) อ่างฯ แม่กว้งอุดมธารา (95%) อ่างฯ กี่วลม (94%) อ่างฯ กี่วคอกหมา (115%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (101%) อ่างฯ แม่มอก (105%) อ่างฯ ห้วยหลวง (97%) อ่างฯ น้ำอุ้น (92%) อ่างฯ น้ำพุง (81%) อ่างฯ จุฬารักษ์ (101%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (94%) อ่างฯ ลำปาว (95%) อ่างฯ สิรินคร (94%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (96%) อ่างฯ ทับเสลา (100%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (89%) อ่างฯ วชิราลงกรณ (91%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (99%) อ่างฯ บางพระ (98%) อ่างฯ หนองปลาไหล (105%) อ่างฯ ประแสร์ (99%) และอ่างฯ นฤปดินทรจินดา (100%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำวัง แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำยม ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วม

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,976 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,999 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +24.81 ม.รทก.

ต่ำกว่าตลิ่ง 0.89 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,900 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,900 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +17.54 ม.รทก. (เมื่อวาน +17.56 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +16.67 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.67 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 296 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 285 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 241 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 55 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 159 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 198 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 149 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 149 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 34 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 77 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 361 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 362 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 35 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 12 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 120 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 120 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 44 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำเจ้าพระยา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สถานี C.29B ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,427 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,392 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		7 พ.ย. 68	8 พ.ย. 68	9 พ.ย. 68	10 พ.ย. 68	11 พ.ย. 68	12 พ.ย. 68	13 พ.ย. 68		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร - เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร - เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกบปรี จ.นนทบุรี	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกมชลประทานสามเสน กทม.	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 13 พ.ย. 68	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	4.51	-8.29
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	8.22	-7.78
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	5.24	-6.96
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	4.10	-7.90
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	4.33	-8.17
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	6.06	-8.44

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2568/69

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2568/69 (วันที่ 1 พ.ย.68 ถึง 30 เม.ย.69) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 47,516 ล้าน ลบ.ม. โดยวางแผนจัดสรรน้ำชลประทานตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ เพื่อการอุปโภค - บริโภค 2,748 ล้าน ลบ.ม. การรักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ 8,090 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 478 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 18,247 ล้าน ลบ.ม. สำหรับกลุ่มน้ำพระยา ปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 17,745 ล้าน ลบ.ม. วางแผนจัดสรรน้ำชลประทานแยกเป็น เพื่ออุปโภค - บริโภค 1,150 ล้าน ลบ.ม. การรักษาระบบนิเวศ และอื่น ๆ 1,305 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 135 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 6,910 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั้งประเทศ (อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแหล่งน้ำอื่น ๆ) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 68 - ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 2,770 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 10 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ ป่าสักฯ) วันนี้ใช้น้ำไป 76.96 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 815 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 10 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2568/69 (1 พ.ย.68 - 30 เม.ย.69)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั้งประเทศ	2,748	8,090	18,247	478	29,563	2,350	8
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	1,305	6,910	135	9,500	662	8



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2568/69

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2568/69

ทั้งประเทศ จำนวน 15.60 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 12.86 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.74 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 8.59 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.80 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.79 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2568/69 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568)

ทั้งประเทศ จำนวน 0.87 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 0.80 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.07 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 0.53 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 0.49 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.04 ล้านไร่

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2568/69			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2568/69			% ผลปลูก ข้าวรอบ 2 เทียบกับแผน
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม ทั้งหมด	
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	10.05	0.67	10.72	0.79	0.05	0.84	8
	นอกเขตชลประทาน	2.81	2.07	4.88	0.01	0.02	0.03	0
	รวม	12.86	2.74	15.60	0.80	0.07	0.87	6
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	6.27	0.08	6.35	0.48	0.03	0.51	8
	นอกเขตชลประทาน	1.53	0.71	2.24	0.01	0.01	0.02	1
	รวม	7.80	0.79	8.59	0.49	0.04	0.53	6

5. การเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

5.1 กรมชลประทาน ให้ความช่วยเหลือเครื่องจักร - เครื่องมือ รวม 1,868 หน่วย แบ่งเป็น เครื่องสูบน้ำ 1,339 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 379 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 29 คัน และเครื่องจักรสนับสนุนอื่นๆ 121 หน่วย

5.2 กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหารและเมล็ดพันธุ์พืชผักแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหาร (พริก/มะเขือเปราะ) จำนวน 17,000 ต้น เมล็ดพันธุ์พืชผัก (คะน้า/กวางตุ้ง) จำนวน 9,500 ของ และเตรียมหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา 10,240 ขวด (การสนับสนุน 4,401 ขวด) และเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 17,830 กิโลกรัม (การสนับสนุน 6,060 กิโลกรัม) นำไปใช้ในพื้นที่ 15,540 ไร่

5.3 กรมปศุสัตว์ อพยพสัตว์ จำนวน 331,903 ตัว ให้อาหารสัตว์พระราชทาน 524,580 กิโลกรัม ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ (แร่ธาตุ/ยาปฏิชีวนะ วิตามิน) 45,031 ของ รักษาสัตว์ 79 ตัว ฝังซากสัตว์ 786 ตัว พร้อมทั้งจัดตั้งสถานที่พักพิงสัตว์ชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงของประชาชน โดยมีสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลสุขภาพสัตว์ให้ด้วย

5.4 กรมประมง โดยกองตรวจการประมง ได้จัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ 17 ชุด รถยนต์ 17 คัน เรือตรวจการประมง 17 ลำ ช่วยนำส่งเสบียงอาหาร และน้ำดื่ม พร้อมทั้งอพยพประชาชน ผู้ป่วย เด็กและคนชรา ในพื้นที่ประสบภัยสู่พื้นที่ปลอดภัย

6. ผลกระทบด้านการเกษตร

6.1 อุทกภัย ช่วงภัย 23 ส.ค. 68 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 53 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สมุทรสาคร ราชบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 191,529 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1,341,134 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,136,064 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 195,341 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 9,729 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 127,298 ราย พื้นที่ 982,049 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 893,810 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 84,368 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 3,872 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,380.43 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,341 ราย พื้นที่ 4,127 ไร่ วงเงิน 6.56 ล้านบาท (**ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 68**)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 37 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู อุรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 6,025 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 13,612 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 10,287 ไร่ บ่อกุ้ง 3,325 ไร่ กระชัง 9,457 ตรม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 2,511 ราย พื้นที่ 3,697 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 3,149 ไร่ บ่อกุ้ง 548 ไร่ กระชัง 1,318 ตรม. วงเงิน 21.50 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 470 ราย พื้นที่ 408 ไร่ กระชัง 347 ตรม. วงเงิน 2,036,373 บาท (**ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 68**)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สิงห์บุรี และจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกร 32,616 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 8,462,233 ตัว แบ่งเป็น โค 86,589 ตัว กระบือ 26,593 ตัว สุกร 103,080 ตัว แพะ/แกะ 13,727 ตัว และสัตว์ปีก 8,462,233 ตัว แปลงหญ้า 7,970 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 76 ราย สัตว์ตายและสูญหาย 391,091 ตัว แบ่งเป็น โค 59 ตัว กระบือ 14 ตัว สุกร 216 ตัว แพะ/แกะ 35 ตัว และสัตว์ปีก 390,767 ตัว วงเงิน 542,800 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 10 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 298 ตัว วงเงิน 524,800 บาท (**ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 68**)

6.2 วาตภัย ช่วงภัย 16 ก.พ. 68 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก แพร่ นครสวรรค์ พะเยา เพชรบูรณ์ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย ศรีสะเกษหนองบัวลำภู หนองคาย อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ปทุมธานี สระบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 6,808 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 11,012 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 826 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 4,144 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 6,042 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,097 ราย พื้นที่ 1,884 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 113 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 794 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 977 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,611,109 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,043 ราย พื้นที่ 1,850 ไร่ วงเงิน 5,473,346 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 68)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย เกษตรกร 1 ราย กระชัง 50 ตอม. คิดเป็นเงิน 18,400 บาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 68)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (กำแพงเพชร อุทัยธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช อุดรดิตถ์ ตราด หนองคาย และยะลา) จำนวน 230 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 180 ไร่	- หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ กำจัดพืชอาศัย และเมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัว/ตร.ม. และพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม
	2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตาก กาญจนบุรี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช จันทบุรี ลำพูน และนครราชสีมา) จำนวน 366 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 42 ไร่	- เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้น้ำออกจากแปลงนา
	3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ลำพูน กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี มหาสารคาม ตาก สุรินทร์ จันทบุรี นครพนม และอุทัยธานี) จำนวน 1,162 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยต่อมวนเขียวตูดไข ระหว่าง 6 : 1- 8 : 1 หรือ/อ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัว/ต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง
	4. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สุรินทร์ ปราจีนบุรี อุทัยธานี และนครราชสีมา) จำนวน 240 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ใช้น้ำท่วมยอข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าว ใช้ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต
	5. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (บุรีรัมย์ สุรินทร์ กาฬสินธุ์ นครพนม ชัยภูมิ ลำพูนนครราชสีมา กำแพงเพชร อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ มหาสารคาม สกลนคร จันทบุรี อุบลราชธานี และหนองบัวลำภู) จำนวน 6,192 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 826 ไร่	- ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ฟันเชื้อราไตรโครเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร
	6. หนอนกอข้าว	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (มหาสารคาม พิษณุโลก สุรินทร์ จันทบุรี สงขลา ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา สกลนคร และยะลา) จำนวน 192 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 17 ไร่	- เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง
	7. โรคขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กาญจนบุรี บุรีรัมย์ อุดรธานี มหาสารคาม จันทบุรี ชัยภูมิ และศรีสะเกษ) จำนวน 349 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) หากพบอาการของโรครุนแรงให้พ่นทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว แนะนำให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้ ไอโซโพรโทโอเลน คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ สเตรพโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตตราไซคลิน
	8. โรคใบสีส้ม	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ปราจีนบุรี และกาฬสินธุ์) จำนวน 22 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงในระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเรน บูโพรเฟซิน อีโทเฟนพรอกซ์ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก
	9. โรคใบขีดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (อุบลราชธานี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ) จำนวน 43 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 21 ไร่	- ใช้ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัม/ไร่ สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ หากพบโรคระบาดของโรครุนแรงในระยะแตกกอ ให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิม เนื่องจากเชื้อสาเหตุทำให้เกิดโรคเมล็ดด่าง
	10. เพลี้ยจักจั่นสีเขียว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ จันทบุรี และอุดรธานี) จำนวน 376 ไร่ <u>พื้นที่ระบาดคงที่</u>	- ใช้แสงไฟล่อแมลงและทำลายเมื่อมีการระบาดรุนแรง ปลุกข้าวพร้อม ๆ กัน และ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	11. แมลงบัว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครพนม ตาก อุตรธานี และ นครราชสีมา) จำนวน 85 ไร่ <u>พื้นที่ระบาดลดลง 1 ไร่</u>	ปล่อยพืชนาวางไว้ระยะหนึ่ง เพื่อตัดวงจรชีวิตของแมลง - ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงใน ระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเรน บูโพรเฟซิน อีโทเฟนพรอกซ์ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก
มะพร้าว	1. ดั้วแรด 2. หนอนหัวดำ 3. แมลงดำหนาม 4. ไรสีขามะพร้าว 5. ดั้วงวง	พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สมุทรสาคร ชุมพร เพชรบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช ตราด สุราษฎร์ธานี สระแก้ว กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา สตูล กระบี่ ระยอง สงขลา สมุทรปราการ จันทบุรี ขอนแก่น พังงา นครราชสีมา ตรัง นครปฐม ภูเก็ต นนทบุรีลำภู ราชบุรี และร้อยเอ็ด) จำนวน 6,028 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 40 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา ราชบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ ตราด สมุทรสงคราม ปัตตานี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ กรุงเทพมหานคร กระบี่ สุรินทร์ นครราชสีมา นครพนม อุตรธานี จันทบุรี พังงา อุบลราชธานี สระแก้ว ภูเก็ต สตูล หนองคาย สมุทรปราการ ระยอง พัทลุง อำนาจเจริญ กาญจนบุรี หนองบัวลำภู สระบุรี ร้อยเอ็ด สุโขทัย และสกลนคร) จำนวน 37,246 ไร่ <u>การระบาดลดลง 4,059 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ตราด สงขลา กระบี่ พังงา สตูล ตรัง สมุทรสงคราม เพชรบูรณ์ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง นครพนม อุบลราชธานี นครราชสีมา ภูเก็ต สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร) จำนวน 6,510 ไร่ <u>การระบาดลดลง 199 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (กาฬสินธุ์ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี สงขลา นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว ชุมพร ตราด และชัยนาท) จำนวน 645 ไร่ <u>การระบาดลดลง 11 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตราด กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร นครราชสีมา จันทบุรี นครศรีธรรมราช พังงา เพชรบุรี ราชบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และสงขลา) จำนวน 676 ไร่ <u>การระบาดลดลง 35 ไร่</u>	- ตัดทะลายและช่อดอกมะพร้าวที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย นำออกไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง กำจัดให้แน่นพ่นสารฆ่าไร ในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกัน ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดย เลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน - ปล่อยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมระยะหนอนของ หนอนหัวดำ หรือปล่อยแตนเบียนไซทริโครแกรมมา เพื่อ ควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ ใช้สารเคมีอิมามิกติน-เบนโซเอท โดยมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ฉีดเข้าลำต้น และมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร เช่น มะพร้าว น้ำหอม มะพร้าว กะทิ และมะพร้าวที่ทำ น้ำตาลให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ - ตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนาม กัดกินไปเผาทำลาย ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส ควบคุม หนอนแมลงดำหนามมะพร้าว หรือแตนเบียนเตตระสติคัส ควบคุมด้กแด่แมลงดำหนามมะพร้าว และอนุรักษ์ศัตรู ธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ - ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อ โดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงงวงในระยะหนอน และดักแด่ ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชันผสม กับน้ำมันยาง ทาบริเวณแผลโคนต้นหรือลำต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่ของด้วงงวงมะพร้าว - ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ใช้ตาข่ายหรือแหจับปลามาซึ่งวางทิศทางล่อดักจับด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตาไรเซียม อัตรา 800 กรัม/กองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและ มะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะ หนอนและดักแด่ หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารเคมี ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ ไดอะซินอน 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณคอ มะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก
ปาล์ม น้ำมัน	1. หนอนปลอกเล็ก 2. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชลบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 839 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี สกลนคร จันทบุรี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 788 ไร่ <u>การระบาดลดลง 22 ไร่</u>	- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณ ไตใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน - ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม ระยะหนอนของหนอนหัวดำ - ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. ดั้วแรด 4. ดั้วกุหลาบ 5. โรคลำต้นเน่า 6. โรคทะลายเน่า 7. โรคใบจุด 8. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี ชลบุรี นครศรีธรรมราช สตูล กระบี่ ตรัง สงขลา ฉะเชิงเทรา สระบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว และร้อยเอ็ด) จำนวน 1,089 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล สระบุรี ตรัง กระบี่ ตราก สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส และจันทบุรี) จำนวน 484 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ระยอง สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ สตูล พังงา จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 11,667 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตราก สระแก้ว สงขลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 974 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 102 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตรัง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร และนราธิวาส) จำนวน 4,929 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 21 ไร่	เพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอนและดักแด้ - หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7 - 10 วัน ในตอนเย็นก่อนค่ำ - กำจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่น ๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อในธรรมชาติ และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาราดหรือฉีดพ่นบริเวณรอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ - ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ซ่อดอกที่ผ่อ และทะลายที่พบเป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง - ตัดทางใบที่ถูกทำลายแล้วนำไปเผาพูนที่ เก็บเศษซากพืช นำออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ - ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
ยางพารา	1. โรคครากขาว 2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคเส้นดำ 5. อาการเปลือกแห้ง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราก กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,133 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (น่าน นราธิวาส ยะลา นครศรีธรรมราช สงขลา พังงา ปัตตานี พัทลุง ตรัง อุตรธานี หนองคาย สุโขทัย บึงกาฬ กระบี่ นครพนม หนองคาย ลำปาง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต) จำนวน 355,064 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 33,263 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ตรัง ปัตตานี สุราษฎร์ธานี สุโขทัย ตราก หนองคาย ชุมพร ระนอง นครพนม และพังงา) จำนวน 2,751 ไร่ การระบาดลดลง 96 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราก จันทบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา นราธิวาส และสกลนคร) จำนวน 140 ไร่ การระบาดลดลง 14 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตรัง สกลนคร สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตราก และนครศรีธรรมราช) จำนวน 6,669 ไร่ การระบาดคงที่	- คำนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคครากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรังค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ - เมื่อพบอาการโรคเป็นรอยบุ๋มเพียงเล็กน้อย ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราทาบริเวณที่ถูกทำลาย เพื่อรักษาโรค - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง เช่น ต้นยางไหลนานผิดปกติและน้ำยางจางลง หรือน้ำยางหยุดไหลเร็ว หรือน้ำยางหยุดไหลเป็นช่วง ๆ บนหน้ากรีด ควรหยุดกรีด 3 - 6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง
กาแฟ	1. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 9 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการเข้าทำลายของหนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟ-สีแดง ให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลง
มันสำปะหลัง	1. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 37 จังหวัด (นครราชสีมา กาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น อุบลราชธานี อุทัยธานี ชลบุรี ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ ลพบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ สระแก้ว อำนาจเจริญ นครสวรรค์ ระยอง ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร สระบุรี สุรินทร์ ชัยนาท อุตรธานี ร้อยเอ็ดมุกดาหาร ราชบุรี เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ เพชรบุรี สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร จันทบุรี สกลนคร หนองบัวลำภู และนครพนม) จำนวน 1,190,298 ไร่ การระบาดลดลง 39,848 ไร่	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 3. โรคโคนเน่าหัวเน่า 4. โรคพุ่มแจ้ 5. โรแดงมันสำปะหลัง 6. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ชลบุรี ชัยนาท สกลนคร สระแก้ว บุรีรัมย์ จันทบุรี และอุบลราชธานี) จำนวน 1,233 ไร่ การระบาดลดลง 51 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (อุตรดิตถ์ ชลบุรี เพชรบูรณ์ สระแก้ว บุรีรัมย์ และสกลนคร) จำนวน 2,718 ไร่ การระบาดลดลง 455 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี) จำนวน 1,046 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 41 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ขอนแก่น ชลบุรี บุรีรัมย์ ระยอง กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร มหาสารคาม และ สุรินทร์) จำนวน 3,241 ไร่ การระบาดลดลง 819 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชัยนาท ยโสธร อุบลราชธานี และสกลนคร) จำนวน 301 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่	- ควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสฟิไทล-อะลูมิเนียม - โรคใบไหม้ แนะนำใช้พันธุ์ต้านทาน หรือพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค ปานกลาง ในพื้นที่ที่มีโรครุนแรงให้ปลูกพืชหมุนเวียน อายุสั้น เพื่อลดประชากรเชื้อโรคในดิน การใช้สารเคมีเป็นทางเลือก สุดท้าย ควรใช้สารเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นพวกทองแดง- ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและ ดักแด้ในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหาร สามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะ หนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ มล./น้ำ 20 ลิตร เชื้อไวรัส วคอีโอโพลีอีโรวีรัส หรือ เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอม อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm) 2. โรคใบไหม้แผลใหญ่	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา ยะลา เชียงใหม่ จันทบุรี กาฬสินธุ์ สระแก้ว พัทลุง สตูล ขอนแก่น และชลบุรี) จำนวน 3,332 ไร่ การระบาดลดลง 45 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตาก) จำนวน 100 ไร่ การระบาดคงที่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 295 ไร่ การระบาดคงที่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและป่นตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาว 3. โรคเส้ดำ 4. ด่างหนวดยาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 1,401 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุตรดิตถ์ มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ มุกดาหาร และ หนองบัวลำภู) จำนวน 22,404 ไร่ การระบาดลดลง 186 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (อุทัยธานี และบุรีรัมย์) จำนวน 264 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (บุรีรัมย์ และขอนแก่น) จำนวน 167 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก - โรคเส้ดำ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบและฉีดพ่นในเวลายืน
ทุเรียน	1. เพลี้ยแป้ง 2. เพลี้ยไฟ 3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. เพลี้ยหอยเกล็ด	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ยะลา ชุมพร จันทบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่) จำนวน 353 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา ระยอง และกระบี่) จำนวน 865 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช ตราด ยะลา ชุมพร ระยอง สงขลา ตรัง กระบี่ นราธิวาส สตูล พังงา และเพชรบูรณ์) จำนวน 1,287 ไร่ การระบาดลดลง 148 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ยะลา ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระยอง และนราธิวาส) จำนวน 337 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่	- เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการ ควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย - เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโปรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สาร ผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอะมีโทกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอะมีโทกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน - เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไพเพธาไรโธด์ อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ อัตรา 30 มล. หรือเฮกซีไทอะซอกซัธอัตรา 40 มล.

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	5. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร นครศรีธรรมราช และ จันทบุรี)	- โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
	6. โรแดง	จำนวน 75 ไร่ การระบาดคงที่	- เมื่อพบการระบาดของโรคใบติดหรือใบไหม้มากควรพ่นสาร
	7. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตราด และนราธิวาส)	ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม
	8. โรคใบติดหรือใบไหม้	จำนวน 784 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น
	9. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตราด ยะลา ระยอง สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ตรัง นราธิวาส กระบี่ ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ตาก ภูเก็ต และสตูล)	เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบ
	10. เพลี้ยจักจั่นฝอย	จำนวน 4,697 ไร่ การระบาดลดลง 132 ไร่	- เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือ
	11. โรคคราดำ	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา ชุมพร ตราด นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช และเพชรบูรณ์)	ส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรยังคงระบาดพ่นด้วยสาร
	12. โรคคราสีชมพู	จำนวน 511 ไร่ การระบาดลดลง 121 ไร่	ป้องกันกำจัดโรคพืช
	13. มอดเจาะลำต้น	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ยะลา ตราด นครศรีธรรมราช สงขลา นครราชสีมา	- หากพบเพลี้ยหอยเกิดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสม
	14. หนอนกินใบ	กระบี่ นราธิวาส และเพชรบูรณ์)	ไวต์ดอยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาด
	15. โรคกิ่งแห้ง	จำนวน 1,464 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่	รุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ
	16. โรคแอนแทรคโนส	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตราด ระยอง นครศรีธรรมราช สงขลา กระบี่ ยะลา นครราชสีมา พัทลุง และนราธิวาส)	- เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรง
	17. หนอนเจาะเมล็ด	จำนวน 1,023 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	ให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลเฟน อัตรา 50 มล. หรือ
	18. โรคผลเน่าทุเรียน	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา ชุมพร และพังงา)	ไซเพอร์เมทริน/ไพเพธาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้
		จำนวน 127 ไร่ การระบาดคงที่	สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน
		พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตราด สุราษฎร์ธานี สงขลา ภูเก็ต และกระบี่)	- เมื่อพบคราบราสีดำ พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดำ และ
		จำนวน 206 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 15 ไร่	สารเหนียวที่แมลงปากดูดซับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อ
		พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชุมพร จันทบุรี ยะลา ตราด และสงขลา)	สาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง
		จำนวน 139 ไร่ การระบาดคงที่	- ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบ
		พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ชุมพร ระยอง และสุรินทร์)	อาการของโรคที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง
		จำนวน 374 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่	และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์
		พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด จันทบุรี ยะลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี และพังงา)	ผสมน้ำขึ้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด
		จำนวน 453 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่	- ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่น
		พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร ยะลา และจันทบุรี)	เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัด
		จำนวน 428 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่	ด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลบบ์ตา-ไซยาโลทริน
		พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช นราธิวาส และยะลา)	- มอดเจาะลำต้น ควรตัดและเผาทิ้ง สำหรับส่วนของต้น
		จำนวน 516 ไร่ การระบาดลดลง 23 ไร่	ทุเรียนที่ไม่สามารถตัดทิ้งได้
		พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และยะลา)	- หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อน
		จำนวน 19 ไร่ การระบาดคงที่	ให้เขย่ากิ่ง ตัดหนอนคืบจะทิ้งตัวลงที่พื้นดิน สามารถจับ
			ทำลายได้ หรือใช้กับดักแสง ไฟล่อตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืน
			- หมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วง
			ที่มีฝนตกชุก ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ไม่ให้รกทึบ และกำจัด
			วัชพืชในสวนเพื่อลดความชื้น หากพบการระบาดของเพี้ย
			เล็กน้อย ควรตัดส่วนที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกสวน
			- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม
			อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สาร
			ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร
			- หมั่นตรวจตราผลทุเรียนในแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ
			ในช่วงผลใกล้แก่ หากพบอาการผลเป็นจุดเน่า ควรทำการ
			ฉีดพ่นสารเคมี เช่น เมตาแลกซิล 25% WP หรือ เมตาแลก
			ซิลผสมแมนโคเซป หรือ ฟอสเอทิล อะลูมิเนียม 80% WP
			ให้ทั่วทั้งต้น ประมาณ 1-2 ครั้ง
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนครศรีธรรมราช)	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ถูรอบ
	2. โรคใบจุดสาหร่าย	จำนวน 291 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 236 ไร่	โคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง
	3. หนอนคืบกินใบ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนราธิวาส)	- ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่ง
		จำนวน 295 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	ทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์
		พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)	- หมั่นสำรวจและสังเกตถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกร
		จำนวน 187 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	พ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 141 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่	- โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ 4. โรคใบจุด 5. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ระยอง ตรัง สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 203 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 36 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระยอง พังงา และยะลา) จำนวน 506 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 28 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ระยอง และพังงา) จำนวน 355 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และชุมพร) จำนวน 266 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ระยอง นราธิวาส ตรัง และพังงา) จำนวน 583 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่	- การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้ง โดยการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชครบ 3 ครั้ง - เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุด ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 30-80 กรัม - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ - เมื่อเริ่มพบอาการของโรค ให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่ฉลากระบุ - เมื่อพบโรแดงหรือโรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคราดำ 3. โรคพุ่มไม้กวาด 4. หนอนคืบกินใบ 5. โรคโรก้ามะหยี่ 6. หนอนม้วนใบ 7. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 81 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 282 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 191 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 38 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 41 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบตาไซฟลูทรีน อัตรา 40-50 กรัม - หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง - เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักด้ไปทำลายหากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมปีดาไซฮาโลทรีน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบมีการระบาดให้ตัดแต่งกิ่ง และยอดที่ถูกโรทำลายนำไปเผาทั้งนอกแปลงปลูก - หมั่นตรวจ ถ้าพบให้เก็บทำลาย หากระบาดรุนแรงมาก ควรฉีดพ่นด้วยยาโมโนโครโตฟอส ในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือพ่นด้วยไพรีทรอยด์อัตรา 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร - ตัดส่วนที่ถูกทำลายที่มีตัวหนอนแล้วเผาไฟเสียและจับตัวแก่ที่มาเล่นไฟกลางคืนไปทำลาย - จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย หากพบระบาดมาก ใช้ยาฆ่าแมลงพวก โมโนโครโตฟอส ฉีดพ่นในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือยาฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร - การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในช่วงฤดูแล้งขณะที่อยู่ในดอกติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 3 ครั้ง

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 23 - 28 ตุลาคม 2568

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค ทั้งหมด 12 จังหวัด 21 จุด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุตรธานี และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัด ควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้ ทั้งนี้ พบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 3 จุด ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ และจังหวัดอุตรธานี

พื้นที่เฝ้าระวังการเกิดโรค 98 จุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด หนองคาย อุตรธานี น่าน กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา