




รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.




แผนที่อากาศผิวพื้น วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 05:00 น.

ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่าง เนื่องจากเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อน

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 10 ก.พ. 69 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 11 ก.พ. 69



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	นราธิวาส	10.4	ฝนตกปานกลาง
2	อ.เมือง	สงขลา	0.8	ฝนตกเล็กน้อย
3	อ.เมือง	ยะลา	0.7	ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 69)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 60,624 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 36,678 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2568 (54,721 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72) มากกว่าปี 2568 จำนวน 5,903 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 34.80 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 189.92 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 15,885 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 56,452 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 32,913 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2568 (51,278 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72) มากกว่า ปี 2568 จำนวน 5,174 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 25.79 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 169.41 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,478 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	20,757	84	14,012	78	87	1,145	984	86	891	85	95	25,970	21,741	84	14,903	78	4,232
ตอน.	12	8,368	5,722	68	4,070	61	230	2,122	1,575	74	1,407	72	242	10,490	7,297	70	5,477	64	3,194
กลาง	3	1,419	879	62	819	61	27	419	313	75	287	73	30	1,838	1,192	65	1,106	64	646
ตะวันตก	2	26,605	22,328	84	9,051	68	8	164	128	78	117	77	10	26,769	22,456	84	9,168	68	4,312
ตะวันออก	6	1,515	814	54	720	51	52	1,009	665	66	609	64	58	2,524	1,479	59	1,329	56	1,045
ใต้	4	8,194	5,951	73	4,241	66	44	721	508	70	453	68	48	8,916	6,460	72	4,694	66	2,456
รวม	35	70,926	56,452	80	32,913	70	448	5,579	4,172	75	3,764	73	483	76,506	60,624	79	36,678	70	15,885

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แคว้น้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 20,497 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 82 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 13,801 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 8.49 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 83.26 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 4,374 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับ ได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	11,575	86	7,775	80	3.09	5.86	45.00	45.00	1,887
สิริกิตี	7,734	81	4,884	73	5.40	0.58	30.04	29.96	1,776
ภูมิพล+สิริกิตี	19,310	84	12,660	78	8.49	6.44	75.04	74.96	3,662
แคว้น้อยฯ	653	70	610	68	0.00	0.00	4.32	4.32	286
ป่าสักชลสิทธิ์	534	56	531	55	0.00	0.00	3.90	3.91	426
รวมทั้งหมด	20,497	82	13,801	76	8.49	6.44	83.26	83.19	4,374

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จำนวน 6 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (86%) อ่างฯ สิริกิตี (81%) อ่างฯ แม่งัดสมบูรณ์ชล (96%) อ่างฯ แม่กงอุดมธรา (87%) อ่างฯ กิ่วคอหมา (102%) และอ่างฯ ศรีนครินทร์ (90%)
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ คือ อ่างฯ คลองสี่ด (15%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 670 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 684 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.75 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.95 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 210 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 210 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.40 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.40 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +6.77 ม.รทก. (เมื่อวาน +6.77 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 213 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 215 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 159 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 50 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่น ๆ 4 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 12 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 12 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 127 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 133 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 31 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 54 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 247 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 247 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 34 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 11 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 40 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 105 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 57 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำเจ้าพระยา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สถานี C.29B ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,174 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,148 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		5 ก.พ. 69	6 ก.พ. 69	7 ก.พ. 69	8 ก.พ. 69	9 ก.พ. 69	10 ก.พ. 69	11 ก.พ. 69		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	ปกติ	- เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 11 ก.พ. 69	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.37	-10.43
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	3.90	-12.10
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.18	-11.02
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.57	-10.43
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	2.03	-10.47
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.54	-11.96

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2568/69

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2568/69 (วันที่ 1 พ.ย. 68 ถึง 30 เม.ย. 69) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้งานได้ จำนวน 47,516 ล้าน ลบ.ม. โดยวางแผนจัดสรรน้ำชลประทานตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ เพื่อการอุปโภค - บริโภค 2,748 ล้าน ลบ.ม. การรักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ 8,090 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 478 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 18,247 ล้าน ลบ.ม. สำหรับลุ่มน้ำพระยา ปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 17,745 ล้าน ลบ.ม. วางแผนจัดสรรน้ำชลประทานแยกเป็น เพื่ออุปโภค - บริโภค 1,150 ล้าน ลบ.ม. การรักษาระบบนิเวศ และอื่น ๆ 1,305 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 135 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 6,910 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั่วประเทศ (อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแหล่งน้ำอื่น ๆ) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 68 - ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 16,367 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ) วันนี้น้ำใช้ไป 83.26 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 6,983 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2568/69 (1 พ.ย.68 - 30 เม.ย.69)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	2,748	8,090	18,247	478	29,563	16,367	49
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	1,305	6,910	135	9,500	6,983	52



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2568/69

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2568/69

ทั่วประเทศ จำนวน 15.60 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 12.86 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.74 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 8.59 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.80 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.79 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2568/69 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569)

ทั่วประเทศ จำนวน 12.80 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.37 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.43 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 8.09 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.67 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.42 ล้านไร่

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2568/69			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2568/69			% ผลปลูก ข้าวรอบ 2 เทียบกับแผน
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม ทั้งหมด	
ทั่วประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	10.05	0.67	10.72	8.39	0.54	8.93	83
	นอกเขตชลประทาน	2.81	2.07	4.88	2.98	0.89	3.87	106
	รวม	12.86	2.74	15.60	11.37	1.43	12.80	88
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	6.27	0.08	6.35	5.90	0.10	6.00	94
	นอกเขตชลประทาน	1.53	0.71	2.24	1.77	0.32	2.09	116
	รวม	7.80	0.79	8.59	7.67	0.42	8.09	98

5. ผลกระทบด้านการเกษตร

5.1 อุทกภัย (ภาคใต้) ช่วงภัย 11 พ.ย. 68 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 242,791 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 207,948 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 67,372 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 11,981 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 128,595 ไร่ **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 19,483 ราย พื้นที่ 63,120 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 43,214 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 2,938 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 16,968 ไร่ วงเงิน 132,411,502 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 4,664 ราย พื้นที่ 10,657 ไร่ วงเงิน 26,541,848 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 69)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 9,805 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 17,636 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 10,672 ไร่ บ่อกุ้ง 6,964 ไร่ กระชัง 121,838 ตรม. **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 5,849 ราย พื้นที่ 5,636 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 3,672 ไร่ บ่อกุ้ง 1,964 ไร่ กระชัง 121,798 ตรม. วงเงิน 85,152,689 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 710 ราย พื้นที่ 449 ไร่ กระชัง 3,744 ตรม. วงเงิน 3,920,405 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.พ. 69)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 213,567 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 13,975,659 ตัว แบ่งเป็น โค 437,706 ตัว กระบือ 8,145 ตัว สุกร 275,715 ตัว แพะ/แกะ 211,061 ตัว และสัตว์ปีก 13,043,032 ตัว แผลงหญ้า 8,176 ไร่ **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร

2,165 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 303,976 ตัว แบ่งเป็น โค 2,155 ตัว กระบือ 146 ตัว สุกร 2,018 ตัว แพะ/แกะ 457 ตัว สัตว์ปีก 340,730 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 69)

5.2 อุทกภัย ช่วงภัย 23 ส.ค. 68 – 11 พ.ย. 68

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 53 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สมุทรสาคร ราชบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 248,274 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1,696,617 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,367,393 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 314,232 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 14,992 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 167,533 ราย พื้นที่ 1,255,083 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,083,109 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 164,521 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 8,908 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,813,173,860 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 60,315 ราย พื้นที่ 438,816 ไร่ วงเงิน 619,212,615 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 69)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 37 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี ชัยนาท นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 7,380 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 14,788 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 11,773 ไร่ บ่อกุ้ง 3,015 ไร่ กระชัง 6,980 ตรม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 7,380 ราย พื้นที่ 14,788 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 11,773 ไร่ บ่อกุ้ง 3,015 ไร่ กระชัง 6,980 ตรม. วงเงิน 93,261,769 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 2,788 ราย พื้นที่ 3,850 ไร่ กระชัง 3,343 ตรม. วงเงิน 24,342,061 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.พ. 69)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 34 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี ชัยนาท ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกร 40,580 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 9,123,958 ตัว แบ่งเป็น โค 151,883 ตัว กระบือ 29,093 ตัว สุกร 109,713 ตัว แพะ/แกะ 15,567 ตัว และสัตว์ปีก 8,817,702 ตัว แผลงหญ้า 8,271 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 105 ราย สัตว์ตายและสูญหาย 392,196 ตัว แบ่งเป็น โค 59 ตัว กระบือ 14 ตัว สุกร 157 ตัว แพะ/แกะ 35 ตัว และสัตว์ปีก 391,931 ตัว แผลงหญ้า 2 ไร่ วงเงิน 719,920 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 39 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 2,064 ตัว แผลงหญ้า 2 ไร่ วงเงิน 701,920 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 69)

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 68)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กำแพงเพชร พิจิตร พัทลุง ตรัง หนองคาย และยะลา) จำนวน 314 ไร่ การระบาดลดลง 16 ไร่	- หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ กำจัดพืชอาศัย และเมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว และพบใบข้าวถูกทำลายในข้าวอายุ 15-40 วัน ให้ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม
	2. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (พัทลุง ชัยภูมิ ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ สุรินทร์ และอุบลราชธานี) จำนวน 1,198 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่	- ควบคุมระดับน้ำในนาข้าว แบบเปียกสลับแห้ง เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัย จำนวนมากกว่า 10 ตัว/ต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง
	3. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ปราจีนบุรี) จำนวน 180 ไร่ การระบาดคงที่	- กำจัดวัชพืชในนาข้าว เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัยให้หว่านปุ๋ยยูเรียเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว
	4. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ชัยภูมิ กำแพงเพชร บุรีรัมย์ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และสกลนคร) จำนวน 601 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่	- ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ฟันเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร
	5. หนอนกอข้าว	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กำแพงเพชร ขอนแก่น บุรีรัมย์ สกลนคร กาฬสินธุ์ และยะลา)	- เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	6. โรคขอบใบแห้ง 7. โรคใบสีส้ม 8. โรคใบขีดสีน้ำตาล 9. เพลี้ยจักจั่นสีเขียว	จำนวน 55 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 294 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (บุรีรัมย์ กำแพงเพชร และ สงขลา) จำนวน 68 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาฬสินธุ์) จำนวน 9 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สกลนคร และอุบลราชธานี) จำนวน 40 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาฬสินธุ์) จำนวน 3 ไร่ <u>พื้นที่ระบาดคงที่</u>	- ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) หากพบอาการของโรครุนแรงให้พ่น ทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว แนะนำให้ใช้ สารป้องกันกำจัดโรคพืช - กำจัดวัชพืช และพืชอาศัยของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะ นำโรค ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ - สามารถลดความรุนแรงของโรค โดยใช้ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ หากพบโรคระบาดของโรครุนแรงในระยะแตกกอ ให้ฉีดพ่น ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา - ใช้แสงไฟล่อแมลงและทำลายเมื่อมีการระบาดของรบกวน ปลูกข้าวพร้อม ๆ กัน และปล่อยพื้นที่นาว่างไว้ระยะหนึ่ง เพื่อตัดวงจรชีวิตของแมลง
มะพร้าว	1. ดั้วแรด 2. หนอนหัวดำ 3. แมลงดำหนาม 4. โรสซีขามะพร้าว 5. ดั้ววงง	พื้นที่ระบาด 28 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สมุทรสาคร ชุมพร เพชรบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรวต สตูล สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ระยอง สงขลา สมุทรปราการ จันทบุรี นครราชสีมา สระแก้ว พังงา ขอนแก่น นครปฐม ตรัง ภูเก็ต กาญจนบุรี อุตรดิตถ์ ร้อยเอ็ด และระนอง) จำนวน 6,269 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 65 ไร่ พื้นที่ระบาด 38 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ตรวต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สมุทรสงคราม ขอนแก่น ราชบุรี นครราชสีมา ปัตตานี ฉะเชิงเทรา กระบี่ เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ พังงา อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร นครพนม ระยอง จันทบุรี ภูเก็ต อุบลราชธานีหนองคาย สมุทรปราการ กาญจนบุรี สุโขทัย สตูล สุรินทร์ อำนาจเจริญ สระแก้ว ร้อยเอ็ด ชัยนาท และสกลนคร) จำนวน 29,594 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 24 ไร่ พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรวต กระบี่ สงขลา สมุทรสงคราม พังงา สตูล ตรัง เพชรบูรณ์ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง นครพนม ภูเก็ต อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และนครราชสีมา) จำนวน 6,434 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 171 ไร่ พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี ชลบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี กาฬสินธุ์ สงขลา นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ชัยนาท สระแก้ว ชุมพร ตรวต และนครราชสีมา) จำนวน 768 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 18 ไร่ พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด (ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตรวต กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช จันทบุรี ระยอง พังงา เพชรบุรี ราชบุรี อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์	- ตัดทะลายและช่อดอกมะพร้าวที่โรสซีขามะพร้าวเข้าทำลาย นำไปเผาทำลายนอกแปลง ให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะ มะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็ก ห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน - ปล่อยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมระยะหนอนของ หนอนหัวดำ หรือปล่อยแตนเบียนไซโครแกรมมา เพื่อ ควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ ใช้สารเคมีอามาเม็กดิน- เบนโซเอท โดยมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ฉีดเข้าลำต้น และมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร เช่น มะพร้าว น้ำหอม มะพร้าว กะทิ และมะพร้าวที่ทำ น้ำตาลให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ - ตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนาม กัดกินไปเผาทำลาย ปล่อยแตนเบียนอะซิโคเดส ควบคุม หนอนแมลงดำหนามมะพร้าว หรือแตนเบียนเตตระสติคัส ควบคุมด้กแด่แมลงดำหนามมะพร้าว และอนุรักษ์ศัตรู ธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ - ใช้ตาข่ายดักจับด้วงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อ โดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงวงในระยะหนอน และดักแด้ ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชันผสม กับน้ำมันยาง ทาบริเวณแผลโคนต้นหรือลำต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่ของด้วงวงมะพร้าว - ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ใช้ตาข่ายหรือแหจับปลามาซึ่งวางทิศทางลมดักจับด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตาไรเซียม อัตรา 800 กรัม/กองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและ มะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะ หนอนและดักแด้ หากพบการระบาดของโรครุนแรงใช้สารเคมี ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ ไดอะซินอน 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณ คอมะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
		ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา) จำนวน 655 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่	
ปาล์ม น้ำมัน	1. หนอนปลอกเล็ก 2. หนอนหัวดำ 3. ตัวแรด 4. ตัวงูหลาบ 5. โรคลำต้นเน่า 6. โรคทะลายเน่า 7. โรคใบจุด 8. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชลบุรี กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 968 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 39 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชลบุรี สกลนคร และจันทบุรี) จำนวน 552 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่ พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (ชุมพร ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล กระบี่ ฉะเชิงเทรา สงขลา พังงา ระนอง สระบุรี สระแก้ว จันทบุรี ระยอง และ ร้อยเอ็ด) จำนวน 1,019 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง ตรด สงขลา นราธิวาส จันทบุรี สระบุรี นครศรีธรรมราช และกระบี่) จำนวน 404 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ระยอง สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ สตูล พังงา และจันทบุรี) จำนวน 11,608 ไร่ การระบาดลดลง 19 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรด สระแก้ว สงขลา ชุมพร นราธิวาส และยะลา) จำนวน 1,077 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 103 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตรัง สุราษฎร์ธานี พังงา นราธิวาส ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช และยะลา) จำนวน 4,439 ไร่ การระบาดลดลง 30 ไร่	- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณ ใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน - ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม ระยะหนอนของหนอนหัวดำ - ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอนและดักแด้ - หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณ โคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7 - 10 วัน ในตอนเย็นก่อนค่ำ - กำจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่น ๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อ ในธรรมชาติ และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาราดหรือฉีดพ่นบริเวณ รอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ - ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบ เป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบ ที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง - ตัดทางใบที่ถูกทำลายแล้วนำไปเผาในที่ เก็บเศษซากพืช นำออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม ระยะหนอนของหนอนหัวดำ - ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผา ทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้ สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
ยางพารา	1. โรคครากขาว 2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. อาการเปลือกแห้ง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และตรด) จำนวน 2,182 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 52 ไร่ พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (นราธิวาส ยะลา สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี สตูล พังงา พัทลุง น่าน บึงกาฬ กาญจนบุรี สุโขทัย กระบี่ อุตรดิตถ์ แพร่ ระนอง นครพนม พะเยา ลำปาง ภูเก็ต และเลย) จำนวน 5,208,854 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,316 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตรัง สุราษฎร์ธานี สุโขทัย หนองคาย ชุมพร ตรด พังงา และสตูล) จำนวน 2,306 ไร่ การระบาดลดลง 788 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตรัง สกลนคร สุราษฎร์ธานี ชุมพร หนองบัวลำภู นครศรีธรรมราช ตรด และ ชลบุรี) จำนวน 5,750 ไร่ การระบาดลดลง 1,094 ไร่	- กำหนดแนววิธีการป้องกันกำจัดโรคครากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีต 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่ง น้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ - เมื่อพบอาการโรคเป็นรอยบุ๋มเพียงเล็กน้อย ใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดเชื้อราทาบริเวณที่ถูกทำลาย เพื่อรักษาโรค - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง เช่น ต้นยางไหลนานผิดปกติและน้ำยางจางลง หรือน้ำยาง หยุดไหลเร็ว หรือน้ำยางหยุดไหลเป็นช่วง ๆ บนหน้ากรีต ควรหยุดกรีต 3 - 6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง
กาแฟ	1. หนอนกาแฟสีแดง 2. หนอนเจาะกิ่ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 9 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และตาก)	- หากพบการเข้าทำลายของหนอนกาแฟสีแดง/หนอนเจาะกิ่ง ให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลง และฉีดพ่น สารฆ่าแมลงเพนิโตรธอน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. มอดเจาะผลกาแฟ	จำนวน 157 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน ตาก สงขลา ชุมพร เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และเพชรบูรณ์) จำนวน 191 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่	- วางกับดักสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ (เมทิลแอลกอฮอล์ : เอทิลแอลกอฮอล์ อัตรา 1 : 1) เดิมสารล่อทุก ๆ 2 สัปดาห์ ใช้เชื้อราบีเวเรีย DOA B18 ผสมสารจับใบฉีดพ่นอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
มันสำปะหลัง	1. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 3. โรคโคนเน่าหัวเน่า 4. โรคพุ่มแจ้ 5. ไรแดงมันสำปะหลัง 6. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 36 จังหวัด (นครราชสีมา ขอนแก่น กาญจนบุรี อุบลราชธานี กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ ลพบุรี ชลบุรี อุทัยธานี ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ สระแก้วราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ระยอง นครสวรรค์ มหาสารคาม ยโสธร อุดรธานี มุกดาหาร สุรินทร์ ชัยนาท สุพรรณบุรี ร้อยเอ็ด สระบุรี ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ พิจิตร ลพบุรี เพชรบูรณ์ นครพนม สกลนคร จันทบุรี และเลย) จำนวน 928,904 ไร่ การระบาดลดลง 71,017 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ชลบุรี ยโสธร สกลนคร สระแก้ว บุรีรัมย์ จันทบุรี อุดรธานี และกำแพงเพชร) จำนวน 1,626 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 835 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (อุดรดิตถ์ และเพชรบูรณ์) จำนวน 228 ไร่ การระบาดลดลง 2,234 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (นครสวรรค์ กำแพงเพชร สระแก้ว ชลบุรี กาฬสินธุ์ ระยอง กาญจนบุรี อุดรธานี จันทบุรี สกลนคร และอุดรดิตถ์) จำนวน 6,121 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 242 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ชลบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี มหาสารคาม และกำแพงเพชร) จำนวน 36,385 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 15,994 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชัยนาท และสกลนคร) จำนวน 291 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 5 ไร่	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยง การขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคย มีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - ควรกรร่งแปลงปลูกเพื่อไม่ให้ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสฟิไทล-อะลูมิเนียม - โรคใบไหม้ แนะนำใช้พันธุ์ต้านทาน หรือพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค ปานกลาง ในพื้นที่ที่มีโรครุนแรงให้ปลูกพืชหมุนเวียน อายุสั้น เพื่อลดประชากรเชื้อโรคในดิน การใช้สารเคมีเป็นทางเลือก สุดท้าย ควรใช้สารเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นพวกทองแดง- ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและ ดักด้ในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหาร สามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะ หนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ มล./น้ำ 20 ลิตร เชื้อไวรัส วคอีโพลีอีโคโนไวรัส หรือ เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอม อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (อุดรดิตถ์ นครราชสีมา เชียงใหม่ จันทบุรี กาฬสินธุ์ สระแก้ว อุดรธานี ชลบุรี ขอนแก่น และสตูล) จำนวน 100 ไร่ การระบาดลดลง 0.25 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ตราด ราชบุรี ชลบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 283 ไร่ การระบาดคงที่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและป่นตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาว 3. โรคเส้ดำ 4. ด่างหนวดยาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชลบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์) จำนวน 1,386 ไร่ การระบาดลดลง 964 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี มหาสารคาม ชัยภูมิ มุกดาหาร และนครราชสีมา) จำนวน 18,099 ไร่ การระบาดลดลง 1,838 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กำแพงเพชร อุทัยธานี และ บุรีรัมย์) จำนวน 265 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และขอนแก่น) จำนวน 16 ไร่ การระบาดลดลง 903 ไร่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย ปลอ่ยแทนเป็นไนโตรเจนกรรมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก - โรคเส้ดำ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบและฉีดพ่นในเวลายืน
ทุเรียน	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ยะลา ชุมพร จันทบุรี ตราด	- เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. เพลี้ยไฟ	ระยอง นครศรีธรรมราช และกระบี่) จำนวน 302 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร	ส่วนที่ถูกทำลายไปทั้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย
	3. เพลี้ยไก่แจ้	ยะลา กระบี่ ตรดระยอง นครศรีธรรมราช และสตูล) จำนวน 1,297 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 11 ไร่ พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช	- เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด พิโปรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร
	4. หนอนเจาะผล	ยะลา สุราษฎร์ธานี ตรด ชุมพร กระบี่ ระยอง สงขลา ตรัง นราธิวาส พัทลุง และพังงา) จำนวน 1,170 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร จันทบุรี และนราธิวาส)	- เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอเมมีโทกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอเมมีโทกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน
	5. เพลี้ยหอยเกล็ด	จำนวน 64 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ยะลา สุราษฎร์ธานี ตรด จันทบุรี ชุมพร กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช พังงา และนราธิวาส)	- เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไพโรพาร์ไคด์ อัตรา 30 กรัม อะมิพรอส อัตรา 30 มล. หรือเฮกซีไทอะซอกซีคลอ 40 มล.
	6. ไรแดง	จำนวน 377 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระยอง กระบี่ ตรด และ	- โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
	7. โรครากเน่าโคนเน่า	นราธิวาส) จำนวน 1,310 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด (ยะลา จันทบุรี ชุมพร	- เมื่อพบการระบาดของโรคใบดิดหรือใบไหม้มากควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบ
	8. โรคใบดิดหรือใบไหม้	สุราษฎร์ธานี ตรด สงขลา ระยอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส กระบี่ พังงา ปัตตานี ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ตาก ภูเก็ต สตูล และนนทบุรี) จำนวน 4,953 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 117 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (สงขลา จันทบุรี ยะลา	- เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสำหรับให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคยังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช
	9. โรคใบจุดสำหรับ	นครราชสีมา นราธิวาส ชุมพร ตรด สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 1,035 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 328 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ยะลา	- หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวต์ออยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ
	10. เพลี้ยจักจั่นฝอย	สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรด นราธิวาส กระบี่ นครราชสีมา และเพชรบูรณ์) จำนวน 1,317 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 33 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ยะลา สุราษฎร์ธานี ตรด	- เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล. หรือไซเพอร์เมทรินโฟฟาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน
	11. โรคราดำ	จันทบุรี ชุมพร กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช พังงา และนราธิวาส) จำนวน 692 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 30 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา ชุมพร และพังงา)	- เมื่อพบคราบราสีดํา พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดํา และสารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง
	12. โรคราสีชมพู	จำนวน 123 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตรด จันทบุรี กระบี่ ชุมพร	- ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคราที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ผสมน้ำขึ้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด
	13. มอดเจาะลำต้นทุเรียน	นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 189 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชุมพร ยะลา จันทบุรี ตรด	- ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่นเจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
	14. หนอนกินใบ	และนราธิวาส) จำนวน 156 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สุรินทร์ จันทบุรี ชุมพร ตรด	- มอดเจาะลำต้น ควรตัดและเผาทิ้ง สำหรับส่วนของต้นทุเรียนที่ไม่สามารถตัดทิ้งได้
		และนครศรีธรรมราช) จำนวน 278 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สุรินทร์ จันทบุรี ชุมพร ตรด	- หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อนให้เขย่ากิ่ง ตัวหนอนคืบจะทิ้งตัวลงที่พื้นดิน สามารถจับทำลายได้ หรือใช้กับดักแสง ไฟล่อตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืน
			- หมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุก ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ไม่ให้รกทึบ และกำจัดวัชพืชในสวนเพื่อลดความชื้น หากพบการระบาดของเพียงเล็กน้อย ควรตัดส่วนที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกสวน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	15. โรคกิ่งแห้ง 16. โรคแอนแทรคโนส 17. หนอนเจาะเมล็ด 18. โรคผลเน่าทุเรียน	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา ปราชินบุรี ชุมพร ตราด กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 506 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ยะลา ตรัง ชุมพร จันทบุรี และระยอง) จำนวน 497 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 24 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และยะลา) จำนวน 106 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นราธิวาส ชุมพร และจันทบุรี) จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - หมั่นตรวจตราผลทุเรียนในแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงผลใกล้แก่ หากพบอาการผลเป็นจุดเน่า ควรทำการฉีดพ่นสารเคมี เช่น เมตาแลกซิล 25% WP หรือ เมตาแลกซิลผสมแมนโคเซป หรือ ฟอสเอทิล อะลูมิเนียม 80% WP ให้ทั่วทั้งต้น ประมาณ 1-2 ครั้ง
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครศรีธรรมราช และระยอง) จำนวน 244 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี เพชรบูรณ์ และนราธิวาส) จำนวน 242 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 186 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 83 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนซอนใบ 4. โรคใบจุด 5. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ชุมพร นครศรีธรรมราช และพังงา) จำนวน 298 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง ระยอง พังงา และยะลา) จำนวน 623 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร และระยอง) จำนวน 341 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช พังงา และชุมพร) จำนวน 240 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ระยอง นราธิวาส ตรัง และพังงา) จำนวน 572 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่	- การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้ง โดยการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง - เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุด ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 30-80 กรัม - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ - เมื่อเริ่มพบอาการของโรค ให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่ฉลากระบุ - เมื่อพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคราดำ 3. โรคพุ่มไม้กวาด 4. หนอนคืบกินใบ 5. โรคโรก้ามะหยี่	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี สระแก้ว และสมุทรสาคร) จำนวน 103 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 291 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 221 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 27 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 28 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทยอน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบนตาโซฟลูทรีน อัตรา 40-50 กรัม - หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาด ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง - เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักแด้ไปทำลาย หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมปดาไซฮาโลทริน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	6. หนอนมันวอนใบ 7. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 44 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี) จำนวน 13 ไร่ การระบาดคงที่	อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบมีการระบาดให้ตัดแต่งกิ่ง และยอดที่ถูกไรทำลายนำไปเผาทิ้งนอกแปลงปลูก - หมั่นตรวจ ถ้าพบให้เก็บทำลาย หากระบาดรุนแรงมากควรฉีดพ่นด้วยยาโมโนโครโตฟอส ในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือพ่นด้วยไพรีทรอยด์อัตรา 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร - ตัดส่วนที่ถูกทำลายที่มีตัวหนอนแล้วเผาไฟเสียและจับตัวแก่ที่มาเล่นไฟกลางคืนไปทำลาย - จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย หากพบระบาดมากใช้ยาฆ่าแมลงพวก โมโนโครโตฟอส ฉีดพ่นในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือยาฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค ทั้งหมด 18 จังหวัด 31 จุด ได้แก่ จังหวัดระยอง ศรีสะเกษ สงขลา ตรัง สุรินทร์ มุกดาหาร กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระแก้ว นครราชสีมา อุบลราชธานี เลย นครพนม ร้อยเอ็ด หนองคาย และอุดรธานี ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัด ควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้ ทั้งนี้ พบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 2 จุด ในพื้นที่จังหวัดระยอง และนครพนม